



**Landesamt für Landwirtschaft,
Lebensmittelsicherheit und Fischerei
Mecklenburg-Vorpommern**

- Pflanzenschutzdienst -
Graf-Lippe-Straße 1, 18059 Rostock

**Regionaldienst Groß Nemerow
OT Tollenseheim Nr. 6a
17094 Groß Nemerow**

Telefon: 039605/61306
Telefax: 039605/61301
e-mail: as-neubrandenburg@lalff.mvnet.de
Bearbeiter: Lüder, Schreiber, Dressler
Datum: **05.03.2018**

HINWEIS

Ausgabe

04

2018

Kartoffeln

Beizung

Eine Beizung sollte vorrangig dort erfolgen, wo es beim Erntegut auf hohe Qualitäten ankommt. Die bodenbürtigen Schaderreger *Rhizoctonia solani* [Dry Core, Verwachsungen, Sklerotien], *Colletotrichum* und Silberschorf (*Helminthosporium solani*) werden mit der Beizung eingedämmt.

Beizmittel (Auswahl)

Beizmittel/Wirkstoff	AWM/dt Pflanzgut	Anwendung	zugelassen gegen
Monceren G (Pencycuron + Imidacloprid)	60 ml/dt	vor dem Legen, beim Legen 60 - 80 l Wasser/ha	Kartoffelkäfer Blattläuse/Virusvektoren <i>Rhizoctonia solani</i>
Monceren Pro (Prothioconazol + Pencycuron)	60 ml/dt	vor dem Legen, Frühbefall	<i>Rhizoctonia solani</i>
	80 ml/dt	vor dem Legen, Frühbefall	Silberschorf
	1,5 l/ha	beim Legen 60 - 80 l Wasser/ha	<i>Rhizoctonia solani</i>
Proradix (<i>Pseudomonas sp.</i> Stamm DSMZ 13134)	2 g/dt	0,17 - 3,33 l Wasser/dt Keimruhe bis Ende Keimruhe: Keime 2 - 3 mm	<i>Rhizoctonia solani</i> , nur zur Befallsminderung
Ernesto Silver (Penflufen + Prothioconazol)	20 ml/dt	vor dem Legen	<i>Rhizoctonia solani</i> , Silberschorf
Risolex flüssig (Tolclofos-methyl)	60 ml/dt	vor oder beim Pflanzen, max. 80 l Wasser/ha	<i>Rhizoctonia solani</i> nur zur Befallsminderung
MONCUT (Flutolanil)	200 ml/t	beim Legen: 60 - 80 l Wasser/ha vorm Legen: max. 2 - 3 l Wasser/t spritzen oder sprühen	<i>Rhizoctonia solani</i>
Ortiva (Azoxytrobin)	3 l/ha	beim Legen 150 - 200 l Wasser/ha	<i>Colletotrichum</i> <i>coccodes</i> nur zur Befallsminderung, <i>Rhizoctonia solani</i>
Funguran progress (Kupferhydroxid)	9 g/dt	bis Ende der Keimruhe: Keime 2 - 3 mm, vor oder beim Legen in 100 l Wasser/ha	Schwarzbeinigkeits (<i>Erwinia carotovra</i>)

Die Ausbringung von Ortiva beim Legen hat den Vorteil, keine gebeizten Restmengen zu haben, dies trifft auch für MONCUT beim Legen zu. Vorteil bei der Beizung auf dem Rollentisch ist die länger anhaltende Wirkung.

Behandeltes Pflanzgut darf weder verzehrt noch verfüttert werden!
Gebrauchsanleitungen und Kennzeichnungsaufgaben sind einzuhalten!