

Befallsbeurteilung der Nematodenprobe

Befalls- stufe	Eier u. Larven je 100 ml	Verluste in %	Empfehlung für den nächsten Zuckerrübenanbau auf der Parzelle
I	1 – 250	0	Keine Empfehlungen
II	251 – 500	1 - 5	Leichter Befall noch unter der wirtschaftlichen Schadschwelle, regelmäßige Befallskontrollen durchführen
III	501 – 1000	6 – 15	Mittlerer Befall überschreitet die wirtschaftliche Schadschwelle, gezielte Bekämpfung mit hoch resistenten Zwischenfrüchten Ölrettich/Senf vorsehen.
IV	1001 – 2500	16 – 30	Schwerer Nematodenbefall, Bekämpfung mit resistentem Zwischenfruchtanbau Aussaat im Juli/August oder Flächenstilllegung mit resistentem Ölrettich erforderlich, Anbau von nematoden-resistenten Zuckerrüben.
V	über 2500	über 30	Sehr schwerer teils flächiger Nematodenbefall, Fruchtfolge der Nematodenbekämpfung unterordnen, Stilllegung mit resistentem Ölrettich einer Zwischenfrucht vorziehen, Anbau resistenter Zuckerrüben (evtl. nach einer resist. Zwischenfrucht)