Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern

– Abteilung Pflanzenschutzdienst –

LALLF MV • Graf-Lippe-Str. 1 • 18059 Rostock

Telefon: 0381-4035-470
Telefax: 0381-4035-490
E-Mail:
juliane.braun@lallf.mvnet.de
Rostock, 24.02.2021
Bearbeiter: Fr. Braun

Freilandgemüsebau-Hinweis

Ausgabe 02/2021

Rechtliches:

Zulassungserweiterungen / Artikel 51 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009

Präparat Wirkstoff	**Kultur**	**Schad-organismus**	**Anwendung**	**Auflagen**
Flowbrix Kupferoxychlorid, 638 g/l	**Spargel** Freiland	**Pilzliche Scha-derreger**	**max. 2x 3,3 l/ha** Wasser: 300-800 l/ha max. 2x Kultur/Jahr Abstand: mind. 7 Tage **WZ: F**	**B4, GHS 9** NT620-2, NW468, NW605-1, NW606, SF275-2GE, SS2202 SF276-EEGE, SS110-1, SS2101,
	Wurzel- und Knollengemüse Freiland	**Bakterielle Schaderreger, *Alternaria*- und *Cercospora*-Arten**	**Kultur:** BBCH 15-47 **max. 3x 2,6 l/ha** Wasser: 400-600 l/ha max. 3x Kultur/Jahr Abstand: mind. 7 Tage **WZ: 14 Tage**	**B4, GHS 9** NT620-2, NW468, NW605-1, NW606 SF275-2GE, SS110-1, SS2101, SS2202
	Knoblauch, Perlzwiebeln, Schalotte, Silberzwiebel, Speisezwiebel Freiland Nutzung als Trockenzwiebel	**bakterielle Schaderreger, Brennflecken-krankheit, Falscher Mehltau, Purpurflecken-krankheit, Laubkrankheit**	**Kultur:** BBCH 15-47 **max. 3x 2,6 l/ha** Wasser: 400-600 l/ha max. 3x Kultur/Jahr Abstand: mind. 7 Tage **WZ: 3 Tage**	
LS AZOXY Azoxystrobin, 250 g/l	**Knoblauch, Schalotte** Freiland	**Falscher Mehltau**	**Kultur:** BBCH 14-48 **max. 3x 1,0 l/ha** Wasser: 200-300 l/ha max. 3x Kultur/Jahr Abstand: 7-10 Tage **WZ: 14 Tage**	**B4, GHS 9** NG405, NW468, NW605-1, NW606 NW706, SS206, SS2101
	Dicke Bohne Freiland	**Acker-bohnenrost**	**Kultur:** BBCH 17-72 **max. 2x 1,0 l/ha** Wasser: 150-300 l/ha max. 2x Kultur/Jahr Abstand: mind. 14 Tage **WZ: 14 Tage**	
	Buschbohne, Stangenbohne Freiland	**Falscher Mehltau, Brennflecken-krankheit**	**Kultur:** BBCH 17-72 **max. 2x 1,0 l/ha** Wasser: 150-300 l/ha max. 2x Kultur/Jahr Abstand: mind. 14 Tage **WZ: 7 Tage**	

Die obigen Angaben ersetzen nicht die genaue Beachtung der Gebrauchsanleitungen der PSM.
Die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher-, und Umweltschutz sind einzuhalten.
Die Weitergabe des Hinweises -auszugsweise oder im Original- ist nur mit Genehmigung des Herausgebers gestattet.

<u>Zulassungserweiterungen</u> / Artikel 51 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009

Präparat Wirkstoff	**Kultur**	**Schad-organismus**	**Anwendung**	**Auflagen**
POLUX Deltamethrin, 25 g/l	**Kopfkohle** (Weiß-, Rot-, Spitz-, Wirsingkohl), **Rosenkohl** Freiland	**Blattläuse, Kohlerdflöhe, Schmetter-lingsraupen, Weiße Fliegen**	**max. 2x 0,3 l/ha** Wasser: 200-400 l/ha max. 2x Kultur/Jahr Abstand: mind. 14 Tage **WZ: 7 Tage**	**B1, GHS 2/5/7/8/9** NG405, NT103, NW607-1, NW470, SE110, SF276-EEGE, SS110-1, SS206, SS2101, VA263-1
	Dicke Bohne Freiland	**Blattrandkäfer**		
	Blumenkohl Freiland	**Kohlerdflöhe**	**max. 3x 0,3 l/ha** Wasser: 200-400 l/ha max. 3x Kultur/Jahr Abstand: mind. 14 Tage **WZ: 7 Tage**	
	Erbsen Freiland	**Erbsen-gallmücke**	**max. 2x 0,25 l/ha** Wasser: 200-400 l/ha max. 2x Kultur/Jahr Abstand: mind. 14 Tage ausgenommen Blütezeit **WZ: 7 Tage**	
		Blattrandkäfer	**max. 1x 0,3 l/ha** (bis 50 cm Pflanzenhöhe) Wasser: 200-400 l/ha max. 1x Kultur/Jahr ausgenommen Blütezeit **WZ: 7 Tage**	
Target SC Metamitron, 700 g/l	**Beten (Rote, Gelbe, Weiße Beten)** Freiland	**Einjährige 1-/2-keimblättrige Unkräuter**	**Kultur:** BBCH 10-18 **NA, im Frühjahr** **max. 8x 1,0 l/ha** Splittingverfahren, Mittelaufwand: min. 0,5 l/ha, max. 5 l/ha Wasser: 200-400 l/ha max. 8x Kultur/Jahr Abstand: mind. 5 Tage **WZ: F**	**B4, GHS 7/9** NG403, NG404, NW470, NW642-1, SB1904, SS110-1, SS120-1, SS206, SS2101
		Echte Kamille	**Kultur:** bis BBCH 09 **VA, im Frühjahr** **max. 1x 3,0 l/ha** Wasser: 200-400 l/ha max. 1x Kultur/Jahr **WZ: F**	

Wartezeit (WZ) F: Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.

<u>Notfallzulassungen</u> / Artikel 53 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009

Präparat Wirkstoff	**Kultur**	**Schad-organismus**	**Anwendung**	**Anwendungs-bestimmungen**
ATTRACAP *Metarhizium brunneum* Stamm Cb15-III, 16 x 10^9 Sporen/kg	**Spargel** Freiland	**Schnellkäfer-larven** (Drahtwurm)	**max. 1x,** **30 kg/ha** (=1,2 x 10^{10} Sporen/ha) März bis April Anwendungstechnik: Einstreuen auf abgefrästen Spargeldamm mit einem Granulatstreuer **WZ: F**	Gültig: **15.02.-14.06.2021** **B3** NT676, NW642-1, SF184, SS1201, SS2204
Anwendungsbestimmungen ohne Codierung: Die Ausbringung muss mit einem Granulatstreugerät erfolgen: - das mit einer separaten Abschaltvorrichtung der Dosiereinheit versehen ist und - das über einen dicht schließenden Deckel verfügt und - bei dem das Fallrohr in möglichst gerader Linie zum Applikationsschar verlegt ist. Die geeigneten und aktuell gelisteten Geräte sind auf der Homepage des Julius Kühn-Instituts (www.julius-kuehn.de) einzusehen. Das Granulat vollständig in den Boden einbringen. Keine Ausbringung des Granulates bei Wind mit Geschwindigkeiten über 5 m/s. Sollten Granulate auf der Bodenoberfläche zu liegen kommen, so sind diese Granulate umgehend zu entfernen bzw. nachträglich einzuarbeiten.				
Präparat Wirkstoff	**Kultur**	**Schad-organismus**	**Anwendung**	**Anwendungs-bestimmungen**
Maxim 480 FS Fludioxonil, 480 g/l	**Gurken** Freiland Nutzung als Einlegegurken	***Fusarium*-Arten** **Stängelbrand**	**Kultur:** VS Saatgutinkrustierung **max. 1x,** **100 ml/100 kg Saatgut** max. 2,28 ml/ha (= 60.000 Körner/ha) **WZ: F**	Gültig: **11.02.-15.06.2021** **B3** NH677, NH679, NH680, NH681, NW467, SF6142-1, SF6161-1, SF618-1, SS1201, SS2204

Wartezeit (WZ) F: Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.

Die obigen Angaben ersetzen nicht die genaue Beachtung der Gebrauchsanleitungen der PSM.
Die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher-, und Umweltschutz sind einzuhalten.
Die Weitergabe des Hinweises -auszugsweise oder im Original- ist nur mit Genehmigung des Herausgebers gestattet.

Zulassungsende

Präparat Wirkstoff	**Kultur**	**Zulassungsende**	**Abverkaufsfrist**	**Aufbrauchfrist**
Acrobat Plus WG, Valis M Macozeb-haltige Präparate	**verschiedene Kulturen** Freiland	31.01.2021	31.07.2021	04.01.2022
Es besteht eine Entsorgungspflicht für die Präparate nach Ablauf der Aufbrauchfrist.				

Widerruf von Zulassungen

Präparat Wirkstoff	**Kultur**	**Zulassungsende**	**Abverkaufsfrist**	**Aufbrauchfrist**
Gallant Super Haloxyfop-P, 104 g/l	**Möhre, Speisezwiebel** Freiland	31.12.2020	30.06.2021	30.06.2022
Die Zulassung von Gallant Super (034286-00) endet rückwirkend zum 31.12.2020. Das gilt auch für alle Parallelhandelsprodukte. Es besteht eine Entsorgungspflicht für das Präparat nach Ablauf der Aufbrauchfrist.				
Dithane NeoTec, Dithane Vino WG, Manfil 80 WP, Ridomil Gold MZ Macozeb-haltige Präparate	**verschiedene Kulturen** Freiland	04.07.2021	04.01.2022	04.01.2022
Es besteht eine Entsorgungspflicht für die Präparate nach Ablauf der Aufbrauchfrist.				

Zulassungsverlängerungen

Präparat	**Zulassungs-Nr.**	**Zulassung bis**
LS AZOXY	007180-00	**31.12.2025**
MON 76473-SL	008671-00	**15.12.2021**
Polyram WG	033986-00	**31.01.2023**
PRIZE	00A659-00	**31.10.2022**
Signum	025483-00	**31.07.2022**