

Bekämpfungsrichtwerte für Rapsschädlinge

Schaderreger	Termin/Stadium	Bekämpfungsrichtwert
Rapserrdfloh	BBCH 10 - 14 BBCH 14 - 16 bis Vegetationsbeginn	im Bestand: > 10 % Lochfraß am Blatt > 50 - 75 Käfer/GS innerhalb 3 Wochen ¹⁾ 3 - 5 Larven/Pflanze
Rübenblattwespe	Herbst	1 Larve/Pflanze
Erdruppen	Herbst	4 Larven/m ²
Gr. Rapsstängelrüssler	Vegetationsbeginn	> 5 Käfer/GS in 3 Tagen mit Abdeckung
Gefl. Kohltriebbrüssler	Vegetationsbeginn	> 15 Käfer/GS in 3 Tagen mit Abdeckung
Rapsglanzkäfer	BBCH 50 - 60	> 10 Käfer pro Haupttrieb ²⁾
Kohlschotenrüssler	BBCH 61 - 69	1 Käfer/Pflanze bzw. 1 Käfer/2 Pflanzen ³⁾

GS=Gelbschale ¹⁾GS nach der Saat aufstellen; Behandlung nicht vor Ende September notwendig, sofern nicht > 10 % Lochfraß; ²⁾ bei schwachem Bestand > 5 Käfer; ³⁾ Starkbefall Kohlschotenmücke erwartet