

ANHANG I

	Hartweizen	Weichweizen	Gerste	Mais	Sorghum
A. Höchster Feuchtigkeitsgehalt	14,5 %	14,5 %	14,5 %	13,5 %	13,5 %
B. Höchstanteil der Bestandteile, die kein einwandfreies Grundgetreide sind, davon höchstens:	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %
1. Bruchkorn	6 %	5 %	5 %	5 %	5 %
2. Kornbesatz (anderer als unter Nummer 3 genannter) davon:	5 %	7 %	12 %	5 %	5 %
a) Schmachtkorn				—	—
b) Fremdgetreide	3 %		5 %	}	
c) Schädlingsfraß					
d) Keimverfärbung			—		
e) durch Trocknung überhitzte Körner	0,50 %	0,50 %	3 %	0,50 %	0,50 %
3. Fleckige Körner und/oder fusariumbefallene Körner davon:	5 %	—	—	—	—
— fusariumbefallene Körner	1,5 %	—	—	—	—
4. Auswuchs	4 %	4 %	6 %	6 %	6 %
5. Schwarzbesatz davon:	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
a) Fremdkörner:					
— schädliche	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
— andere					
b) verdorbene Körner:					
— durch Selbsterhitzung oder zu starke Trocknung beschädigte Körner	0,05 %	0,05 %			
— andere					
c) Verunreinigungen					
d) Spelzen					
e) Mutterkorn	0,05 %	0,05 %	—	—	—
f) Brandbutten			—	—	—
g) tote Insekten und Insektenteile					
C. Höchstanteil der Körner, die ihr glasiges Aussehen ganz oder teilweise verloren haben	27 %	—	—	—	—
D. Höchstgehalt an Gerbstoff ⁽¹⁾	—	—	—	—	1 %
E. Mindesteigengewicht (kg/hl)	78	73	62	71	—
F. Mindesteigengewicht ⁽¹⁾ :					
— Wirtschaftsjahr 2000/2001	11,5 %	10 %	—	—	—
— Wirtschaftsjahr 2001/2002	11,5 %	10,3 %	—	—	—
— Wirtschaftsjahr 2002/2003 und folgende	11,5 %	10,5 %			
G. Mindestfallzahl nach Hagberg	220	220			
H. Mindestsedimentationswert (ml)	—	22	—	—	—

(¹) Auf den Trockenstoff berechneter Anteil