

5.4.3 Herbizide		5* = Gewässerabstand nach PS-AVO = 5 m unter best. Bedingungen (s. Pkt.1.3.2)										
Mittel (Wirkstoff) Zulassungsnr. Zulassungsende	Wirkung gegen/ Bemerkungen	ab Standjahr	Aufwandmenge in l bzw. kg/ha	max. Anwendungshäufigkeit je Befall/je Jahr	Anwendungszeitpunkt	Wartezeit in Tagen	Bienenschutz	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen Umwelt	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen Gesundheitsschutz	Gefahrensymbole	Wirkung	
Alekto Plus TF (A) (Glyphosat 450 g/l) 027385-00 ► 15.12.2024 Aufbrauchfrist b. 15.06.2026	einkeimbl. + zwei- keimbl.	4	4,0	1/1	Frühjahr bis Sommer	30	B4	NG352, NG404, NT103, NW470, NW642-1 (5*)	SF245-02, SS206	GHS 09	Blatt- herbizid	
ALEKTO TF (A) (Glyphosat 360 g/l) 008270-00 ► 15.12.2024 Aufbrauchfrist b. 15.06.2026	einkeimbl. + zwei- keimbl.	4	5,0	1/1	Frühjahr bis Sommer	30	B4	NG352, NG404, NT103, NW470, NW642-1 (5*)	SF245-02, SS206	GHS 09	Blatt- herbizid	
(G)BELOUKHA (Pelargonsäure 680 g/l) 008528-00 01.12.2027	Stocktriebe (in Junganlagen Pflanzjahr bis 4. Stand- jahr)		16	2/2	Anfang Früh- jahr bis Ende Sommer	F	B4	NT109, NW468, NW642-1 (5*)	SS245-02, SS206, SE110, SS110-1, SS2101	GHS 07	Blatt- herbizid	
	Stocktriebe einj. einkeimbl. + einj. zwei-keimbl.	4 4	16 16	2/2 2/2	während der Vegetations- periode			NT101-1, NW468, NW642-1 (5*)				
Boom Effekt (Glyphosat 360 g/l) 026763-00 ► 15.12.2026	einkeimbl. + zwei- keimbl., ausgenommen Acker- Winde	4	5,0	2/2 im Abstand von 3 Monaten	während der Vegetations- periode	35	B4	NG352-1, NG404, NT103-1, NW470, NW642-1 (5*)	SF275-21WE, SF245-02, SS206		Blatt- herbizid	
CHIKARA (Flazasulfuron 250 g/kg) 034837-00 ► 31.07.2033	einkeimbl. + zwei- keimbl.		0,2	1/1	April-Juni Reihenbe- handlung	90	B4	NG405, NG720, NT102, NW470, NW706, NW607- 1 (50%:15m, 75%: 10m, 90%:5*)	SF245-02, SF275-VEWE, SS206, SS2251	GHS 09	Boden- u. Blatt- herbizid	
Clinic TF (Glyphosat 360 g/l) 006281-00 ► 15.12.2026	einkeimbl. + zwei- keimbl., ausgenommen Acker- Winde	4	5,0	2/2 im Abstand von 3 Monaten	Frühjahr und Sommer	30	B4	NG352, NG404, NT103, NW468, NW642-1 (5*)	SF245-01	GHS 09	Blatther- bizid	

5.4.3 Herbizide		5* = Gewässerabstand nach PS-AVO = 5 m unter best. Bedingungen (s. Pkt.1.3.2)										
Mittel (Wirkstoff) Zulassungsnr. Zulassungsende	Wirkung gegen/ Bemerkungen	ab Standjahr	Aufwandmenge in l bzw. kg/ha	max. Anwendungshäufigkeit je Befall/je Jahr	Anwendungszeitpunkt	Wartezeit in Tagen	Bienenschutz	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen Umwelt	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen Gesundheitsschutz	Gefahrensymbole	Wirkung	
Colzamid (Napropamid 450 g/l) 00B235-00 31.03.2028	einjährige einkeim- + zweikeimblättrige Un- kräuter Junganlagen		2,5	1/1	n. d. Pflanzen, vor Vegetationsbe- ginn, vor d. Austrieb	F	B4	NW470, NW609- 2 (5*)	SF-275-42WE, SS110-1, SS2101, SF245- 02, SS206	GHS 09	Boden- herbizid	
Credit Xtreme (Glyphosat 540 g/l) 00A370-00 ► 15.12.2026	einkeimbl. + zwei- keimbl., ausgenommen Acker- Winde	4	3,33	1/1	während der Vegetations- periode	F	B4	NW470, NG352- 1, NG404, NT140, NT101-1, NW642-1 (5*)	SF275-14WE, SF245-02, SS206	GHS 09	Blatther- bizid	
	einkeimbl. + zwei- keimbl.	4	33 %/1/1	1/1	streichen, Einzelpflan- zenbehand.	F	B4	NW470, NG352- 1, NW642-1 (5*)				
Durano (A) (Glyphosat 360 g/l) 072389-00 ► 15.12.2024 Aufbrauchfrist b. 15.06.2026	einkeimbl. + zwei- keimbl., ausgenommen Acker-Winde	4	5,0	2/2 im Abstand von 3 Monaten	Frühjahr und Sommer	30	B4	NG352, NG404, NT103, NW470, NW642-1 (5*)	SF275-EEWE, SF245-02, SS206	GHS 09	Blatther- bizid	
Durano SL (Glyphosat 360 g/l) 072389-00 ► 15.12.2026	einkeimbl. + zwei- keimbl., ausgenommen Acker-Winde	4	3,0	2/2 im Abstand von 3 Monaten	während der Vegetations- periode	7	B4	NG352-1, NG404, NT102-1, NT140, NW642-1 (5*), NW470	SF245-02, SS206, SS110-1	GHS 09	Blatther- bizid	
Glyfos Dakar (A) (Glyphosat 680 g/kg) 025937-00 ► 15.12.2024 Aufbrauchfrist b. 15.06.2026	ein- + zweikeimbl., aus- gen. Acker-Winde	4	2,65	2/2 im Abstand von 90 Tagen	während der Vegetations- periode	30	B4	NG352, NG404, NT103, NW470, NW642-1 (5*)	SF245-02, SS110-1, SS2101, SS2202, SS526	GHS 07 09	Blatther- bizid	
Focus Ultra (Cycloxydim 100 g/l) 033964-00 31.08.2027	einj. einkeimbl. Unkr. (ausgen. Einj. Rispe)		2	1/1	b. BBCH 60, April bis Juli	42	B4	NW468, NT101-1, NW642-1 (5*)	SE110, SS110- 1, SS2101, SS610, SF245- 02, SS206, SF275-EEWE	GHS 07 08	Blatther- bizid (Gräser)	
	Gemeine Quecke, Hundzahn, Wilde Mohrenhirse		5	1/1	b. BBCH 60, April bis Juli, bei 15-20 cm Unkrauthöhe	42	B4	NW468, NT102-1, NW642-1 (5*)				

5.4.3 Herbizide		5* = Gewässerabstand nach PS-AVO = 5 m unter best. Bedingungen (s. Pkt.1.3.2)									
Mittel (Wirkstoff) Zulassungsnr. Zulassungsende	Wirkung gegen/ Bemerkungen	ab Standjahr	Aufwandmenge in l bzw. kg/ha	max. Anwendungshäufigkeit je Befall/je Jahr	Anwendungszeitpunkt	Wartezeit in Tagen	Bienenschutz	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen Umwelt	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen Gesundheitsschutz	Gefahrensymbole	Wirkung
Fusilade MAX (Fluazifop-P 107 g/l) 024847-00 ► 31.05.2027	einj. einkeimblättrige Unkräuter (ausgenom- men Einj. Rispengras) Gemeine Quecke		1,0	1/1	Frühjahr oder Herbst, nach Austrieb oder nach erneu- tem Austrieb	28	B4	NW470, NT102-1, NT202-30, NW642-1 (5*)	SF275-EEWE, SE110, SF245- 02, SS206, SS110-1, SS2101, SS610	GHS 07 08 09	Blatther- bizid (Gräser)
			2,0	1/1		28	B4	NW470, NT103-1, NT202-30, NW642-1 (5*)			
Kerb FLO (Propyzamid 400 g/l) 006220-00 ► 31.01.2027	einkeimbl. Unkräuter Vogel-Sternmiere Vegetationsruhe	2	6,25	1/1	Winter	F	B4	NT103, NW468, NW642, NW705	SF245-01, SS110, SS120, SS210, SS220, SS610	GHS 08 09	Boden- herbizid
(G)Naprop 450 Napropamid 450 g/l) 00A400-00 31.12.2027	Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einj. zweikeimblättrige Unkräuter (ausgen. Kletten-Labkraut)		2,75	1/1	nach dem Pflanzen, vor dem Austrieb, vor dem Auf- laufen der Unk.	F	B4	NW470, NW609- 2 (5*), VN226	SF275-42WE, SS206, SF245- 02	GHS 09	Boden- herbizid
NASA (Glyphosat 360 g/l) 00B0763-00 15.12.2026	einkeimbl. + zwei- keimbl.	4	4,0	2/2 im Abstand von mind. 90 Tagen	Frühjahr bis Sommer	35	B4	NW470, NG404, NG352-1, NW642-1 (5*)	SE110, SS110- 1, SS2101, SS610, SF275- EEWE, SF245- 02, SS206	GHS 05 07 09	Blatther- bizid
(G)Nozomi (AA) (Flumioxazin 500 g/kg) 024895-00 ► 30.06.2025 Aufbrauchfrist b. 30.12.2026	einjährige zweikeim- blättrige Unkräuter, Junganlagen		0,6	1/1	Anfang Früh- jahr bis Ende Sommer; Rei- henbehand- lung mit Ab- schirmung	F	B4	NW470, NW642- 1 (5*)	SS110-1, SS120-1, SS2101, SS206, SF245-02	GHS 08	Boden- herbizid
	einjährige zweikeim- blättrige Unkräuter, Ta- feltrauben		0,6	1/1		F	NW470, NW642- 1 (5*)				

5.4.3 Herbizide		5* = Gewässerabstand nach PS-AVO = 5 m unter best. Bedingungen (s. Pkt.1.3.2)									
Mittel (Wirkstoff) Zulassungsnr. Zulassungsende	Wirkung gegen/ Bemerkungen	ab Standjahr	Aufwandmenge in l bzw. kg/ha	max. Anwendungshäufigkeit je Befall/je Jahr	Anwendungszeitpunkt	Wartezeit in Tagen	Bienenschutz	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen Umwelt	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen Gesundheitsschutz	Gefahrensymbole	Wirkung
Quickdown (Pyraflufen 24,2 g/l als Ethylester 26 g/l) 005693-00 31.01.2027	Stocktriebe, nur in Riesling und Dornfelder	3	0,4 in Misch. mit 1,0 l/ha Toil	2/2 im Abstand von mind. 10 Tagen	n. Austrieb und erneuten Austrieb bis 15 cm Trieb- länge	F	B4	NW468, NW642-1 (5*)	SE110, SF245- 01, SS110, SS2101, SS610	GHS 05 07 08 09	Blatther- bizid
(G)RANGER (Fluroxypyr 150 g/l + Triclopyr 150 g/l) 007003-00 ► 31.03.2027	Abtötung von Wur- zelschossern BBCH 01-91, nach der Rodung und bei erneu- tem Austrieb		20% in mind. 2 ml Wasser/ Stamm	1/1	streichen, Einzelpflan- zen-/Stamm- behandlung	F	B4	NW468, NW642- 1 (5*)	SF245-01, SE110, SE120, SS110, SS120, SS2101, SS2202, SS620	GHS 07 08 09	Blatther- bizid
			0,4 ml pro Stamm	1/1	injizieren, Einzelpflan- zen-/Stamm- behandlung	F					
	Weinrebe, zur Rodung vorgesehen		20% in mind. 2 ml Wasser/ Stamm	1/1	streichen, Einzelpflan- zen-/Stamm- behandlung	F					
		0,4 ml pro Stamm	1/1	injizieren, Einzelpflan- zen-/Stamm- behandlung	F						
Roundup Future (Glyphosat 500 g/l) 00A042-00 15.12.2026	einkeimbl. + zwei- keimbl., ausgenommen Acker- Winde	4	2,16	2/2 im Abstand von 3 Monaten		35	B4	NG352-1, NG404, NW470, NT140, NW642-1 (5*)	SF245-02, SS206	GHS 09	Blatther- bizid
	Acker-Winde	4	2,16	1/1		35	B4	NG352-1, NW470, NT140, NW642-1 (5*)			

5.4.3 Herbizide		5* = Gewässerabstand nach PS-AVO = 5 m unter best. Bedingungen (s. Pkt.1.3.2)										
Mittel (Wirkstoff) Zulassungsnr. Zulassungsende	Wirkung gegen/ Bemerkungen	ab Standjahr	Aufwandmenge in l bzw. kg/ha	max. Anwendungshäufigkeit je Befall/je Jahr	Anwendungszeitpunkt	Wartezeit in Tagen	Bienenschutz	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen Umwelt	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen Gesundheitsschutz	Gefahrensymbole	Wirkung	
Roundup PowerFlex (A) (Glyphosat 480 g/l) 006149-00 ► 16.11.2024 Aufbrauchfrist bis 16.05.2026	einkeimbl. + zweikeimbl., ausgenommen Acker- Winde	4	3,75	2/2 im Abstand von 3 Monaten	während der Vegetationsperiode	30	B4	NG352, NG404, NT103, NW468, NW642-1 (5*)	SF275-EEWE, SF245-02, SS206	GHS 09	Blattherbizid	
Roundup REKORD (Glyphosat 720 g/kg) 007525-60 ► 31.12.2026	einkeimbl. + zweikeimbl., ausgenommen Acker- Winde	4	2,5	2/2 im Abstand von 3 Monaten		30	B4	NG352, NG404, NT103, NW468, NW642-1 (5*)	SF245-01, SS110, SS2101	GHS 09	Blattherbizid	
Roundup Ultra (A) (Glyphosat 360 g/l) 044142-00 ► 15.12.2024 Aufbrauchfrist bis 16.05.2026	ein- + zweikeimbl., ausgen. Acker-Winde	4	5,0	2/2 im Abstand von 3 Monaten	während der Vegetationsperiode	30	B4	NG352, NG404, NW470, NT103, NW642-1 (5*)	SF275-28WE, SS110-1, SF245-02, SS206	GHS 09	Blattherbizid	
Taifun forte (Glyphosat 360 g/l) 044044-00 ► 15.12.2026	ein- + zweikeimbl., ausgen. Acker-Winde	4	5,0	2/2 im Abstand von 90 Tagen	während der Vegetationsperiode	30	B4	NG352, NG404, NW470, NW642-1 (5*)	SF275-EEWE, SF245-02, SS206		Blattherbizid	
(G)Shark (Carfentrazone 55,92 g/l) 005268-00 31.03.2027	Stocktriebe Spitzschirm, nur in wüchsigen Sorten (Grüner Silvaner, Morio Muskat, Chardonnay, Schwarzriesling und Burgundersorten)	3	1,0	1/1	nach Austrieb bis 15 cm Trieblänge	F	B4	NW468, NW605 (50%:5*, 75%:5*, 90%:5*), NW606 (5*)	SE110, SF245-01, SS110, SS210	GHS 07 09	Blattherbizid	
		3	0,5	2/2	n. Austrieb u. erneutem Austrieb bis 15 cm Triebl.			NW468, NW609 (5*)				