

<b>5.4.3 Herbizide</b>		5* = Gewässerabstand nach PS-AVO = 5 m unter best. Bedingungen (s. Pkt.1.3.2)										
<b>Mittel</b> (Wirkstoff) Zulassungsnr. Zulassungsende	Wirkung gegen/ Bemerkungen	ab Standjahr	Aufwandmenge in l bzw. kg/ha	max. Anwendungshäufigkeit je Befall/je Jahr	Anwendungszeitpunkt	Wartezeit in Tagen	Bienenschutz	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen Umwelt	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen Gesundheitsschutz	Gefahrensymbole	Wirkung	
<b>Alekto Plus TF (A)</b> (Glyphosat 450 g/l) 027385-00 ► 15.12.2024 Abverkaufsfrist 15.06.2025 Aufbrauchfrist b. 15.06.2026	einkeimbl. + zweikeimbl.	4	4,0	1/1	Frühjahr bis Sommer	30	B4	<b>NG352, NG404, NT103, NW470, NW642-1 (5*)</b>	SF245-02, SS206	GHS 09	Blatt-herbizid	
<b>ALEKTO TF (A)</b> (Glyphosat 360 g/l) 008270-00 ► 15.12.2024 Abverkaufsfrist 15.06.2025 Aufbrauchfrist b. 15.06.2026	einkeimbl. + zweikeimbl.	4	5,0	1/1	Frühjahr bis Sommer	30	B4	<b>NG352, NG404, NT103, NW470, NW642-1 (5*)</b>	SF245-02, SS206	GHS 09	Blatt-herbizid	
<b>(G)BELOUKHA</b> (Pelargonsäure 680 g/l) 008528-00 15.12.2025	Stocktriebe (in Junganlagen Pflanzjahr bis 4. Standjahr)		16	2/2	Anfang Frühjahr bis Ende Sommer	F	B4	<b>NT109, NW468, NW642-1 (5*)</b>	SS245-02, SS206, <b>SE110, SS110-1, SS2101</b>	GHS 07	Blatt-herbizid	
	Stocktriebe	4	16	2/2	während der Vegetationsperiode		<b>NT101-1, NW468, NW642-1 (5*)</b>					
	einj. einkeimbl. + einj. zweikeimbl.	4	16	2/2								
<b>Boom Effekt</b> (Glyphosat 360 g/l) 026763-00 ► 15.12.2026	einkeimbl. + zweikeimbl., ausgenommen Acker- Winde	4	5,0	2/2 im Abstand von 3 Monaten	während der Vegetationsperiode	35	B4	<b>NG352-1, NG404, NT103-1, NW470, NW642-1 (5*)</b>	SF275-21WE, SF245-02, SS206		Blatt-herbizid	
<b>CHIKARA</b> (Flazasulfuron 250 g/kg) 034837-00 ► 31.07.2033	einkeimbl. + zweikeimbl.		0,2	1/1	April-Juni Reihenbehandlung	90	B4	<b>NG405, NG720, NT102, NW470, NW706, NW607-1 (50%:15m, 75%: 10m, 90%:5*)</b>	SF245-02, SF275-VEWE, SS206, SS2251	GHS 09	Boden- u. Blatt-herbizid	

<b>5.4.3 Herbizide</b>		5* = Gewässerabstand nach PS-AVO = 5 m unter best. Bedingungen (s. Pkt.1.3.2)										
<b>Mittel</b> (Wirkstoff) Zulassungsnr. Zulassungsende	Wirkung gegen/ Bemerkungen	ab Standjahr	Aufwandmenge in l bzw. kg/ha	max. Anwendungshäufigkeit je Befall/je Jahr	Anwendungszeitpunkt	Wartezeit in Tagen	Bienenschutz	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen Umwelt	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen Gesundheitsschutz	Gefahrensymbole	Wirkung	
<b>Clinic TF</b> (Glyphosat 360 g/l) 006281-00 ► 15.12.2026	einkeimbl. + zweikeimbl., ausgenommen Acker- Winde	4	5,0	2/2 im Abstand von 3 Monaten	Frühjahr und Sommer	30	B4	<b>NG352, NG404, NT103, NW468, NW642-1 (5*)</b>	SF245-01	GHS 09	Blattherbizid	
<b>Colzamid</b> (Napropamid 450 g/l) 00B235-00 31.03.2028	einjährige einkeim- + zweikeimblättrige Unkräuter Junganlagen		2,5	1/1	n. d. Pflanzen, vor Veg.-beginn, v. d. Austrieb	F	B4	<b>NW470, NW609-2 (5*)</b>	<b>SF-275-42WE, SS110-1, SS2101, SF245-02, SS206</b>	GHS 09	Bodenherbizid	
<b>Credit Xtreme</b> (Glyphosat 540 g/l) 00A370-00 ► 15.12.2026	einkeimbl. + zweikeimbl., ausgenommen Acker- Winde	4	3,33	1/1	während der Vegetationsperiode	F	B4	<b>NW470, NG352-1, NG404, NT140, NT101-1, NW642-1 (5*)</b>	<b>SF275-14WE, SF245-02, SS206</b>	GHS 09	Blattherbizid	
	einkeimbl. + zweikeimbl.	4	33 %1/1	1/1	streichen, Einzelpflanzenbehand.	F	B4	<b>NW470, NG352-1, NW642-1 (5*)</b>				
<b>Durano (A)</b> (Glyphosat 360 g/l) 072389-00 ► 15.12.2024 Abverkaufsfrist 15.06.2025 Aufbrauchfrist b. 15.06.2026	einkeimbl. + zweikeimbl., ausgenommen Acker-Winde	4	5,0	2/2 im Abstand von 3 Monaten	Frühjahr und Sommer	30	B4	<b>NG352, NG404, NT103, NW470, NW642-1 (5*)</b>	<b>SF275-EEWE, SF245-02, SS206</b>	GHS 09	Blattherbizid	
<b>Durano SL</b> (Glyphosat 360 g/l) 072389-00 ► 15.12.2026	einkeimbl. + zweikeimbl., ausgenommen Acker-Winde	4	3,0	2/2 im Abstand von 3 Monaten	während der Vegetationsperiode	7	B4	<b>NG352-1, NG404, NT102-1, NT140, NW642-1 (5*), NW470</b>	SF245-02, SS206, <b>SS110-1</b>	GHS 09	Blattherbizid	
<b>Focus Ultra</b> (Cycloxydim 100 g/l) 033964-00 31.12.2025	einj. einkeimbl. Unkr. (ausgen. Einj. Rispe)		2	1/1	b. BBCH 60, April bis Juli	42	B4	<b>NW468, NT101-1, NW642-1 (5*)</b>	<b>SE110, SS110-1, SS2101, SS610, SF245-02, SS206, SF275-EEWE</b>	GHS 07 08	Blattherbizid (Gräser)	
	Gemeine Quecke, Hundzahn, Wilde Mohrenhirse		5	1/1	b. BBCH 60, April bis Juli, bei 15-20 cm Unkrauthöhe	42	B4	<b>NW468, NT102-1, NW642-1 (5*)</b>				

5\* = Gewässerabstand nach PS-AVO = 5 m unter best. Bedingungen  
(s. Pkt.1.3.2)

<b>5.4.3 Herbizide</b>											
<b>Mittel</b> (Wirkstoff) Zulassungsnr. Zulassungsende	Wirkung gegen/ Bemerkungen	ab Standjahr	Aufwandmenge in l bzw. kg/ha	max. Anwendungshäu- figkeit je Befall/je Jahr	Anwendungszeitpunkt	Wartezeit in Tagen	Bienenschutz	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen Umwelt	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen Gesundheitsschutz	Gefahrensymbole	Wirkung
<b>Fusilade MAX</b> (Fluazifop-P 107 g/l) 024847-00 ► 31.05.2027	einj. einkeimblättrige Unkräuter (ausgenom- men Einj. Rispengras)		1,0	1/1	Frühjahr oder Herbst, nach Austrieb oder nach erneu- tem Austrieb	28	B4	<b>NW470, NT102-1, NT202-30, NW642-1 (5*)</b>	<b>SF275-EEWE,</b> SE110, SF245- 02, SS206, SS110-1, SS2101, SS610	GHS 07 08 09	Blatther- bizid (Gräser)
	Gemeine Quecke		2,0	1/1		28	B4	<b>NW470, NT103-1, NT202-30, NW642-1 (5*)</b>			
<b>Glyfos Dakar (A)</b> (Glyphosat 680 g/kg) 025937-00 ► 15.12.2024 Abverkaufsfrist 15.06.2025 Aufbrauchfrist b. 15.06.2026	ein- + zweikeimbl., aus- gen. Acker-Winde	4	2,65	2/2 im Abstand von 90 Tagen	während der Vegetations- periode	30	B4	<b>NG352, NG404, NT103, NW470, NW642-1 (5*)</b>	SF245-02, <b>SS110-1, SS2101, SS2202, SS526</b>	GHS 07 09	Blatther- bizid
<b>Kerb FLO</b> (Propyzamid 400 g/l) 006220-00 ► 31.01.2026	einkeimbl. Unkräuter Vogel-Sternmiere Vegetationsruhe	2	6,25	1/1	Winter	F	B4	<b>NT103, NW468, NW642, NW705</b>	SF245-01, SS110, SS120, SS210, SS220, SS610	GHS 08 09	Boden- herbizid
<b>(G)Naprop 450</b> Napropamid 450 g/l) 00A400-00 31.12.2027	Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einj. zweikeimblättrige Unkräuter (ausgen. Kletten-Labkraut)		2,75	1/1	nach dem Pflanzen, vor dem Austrieb, v. d. Auflau- fen der Unk.	F	B4	<b>NW470, NW609- 2 (5*), VN226</b>	<b>SF275-42WE,</b> SS206, SF245- 02	GHS 09	Boden- herbizid
<b>NASA</b> (Glyphosat 360 g/l) 00B0763-00 15.12.2026	einkeimbl. + zwei- keimbl.	4	4,0	2/2 im Abstand von mind. 90 Tagen	Frühjahr bis Sommer	35	B4	<b>NW470, NG404, NG352-1, NW642-1 (5*)</b>	<b>SE110, SS110- 1, SS2101, SS610, SF275- EEWE, SF245- 02, SS206</b>	GHS 05 07 09	Blatther- bizid
<b>(G)Nozomi</b> (Flumioxazin 500 g/kg) 024895-00 ► 30.06.2025	einjährige zweikeim- blättrige Unkräuter, Junganlagen		0,6	1/1	Anfang Früh- jahr bis Ende	F	B4	<b>NW470, NW642- 1 (5*)</b>	<b>SS110-1, SS120-1,</b>	GHS 08	Boden- herbizid

<b>5.4.3 Herbizide</b>		5* = Gewässerabstand nach PS-AVO = 5 m unter best. Bedingungen (s. Pkt.1.3.2)									
<b>Mittel</b> (Wirkstoff) Zulassungsnr. Zulassungsende	Wirkung gegen/ Bemerkungen	ab Standjahr	Aufwandmenge in l bzw. kg/ha	max. Anwendungshäufigkeit je Befall/je Jahr	Anwendungszeitpunkt	Wartezeit in Tagen	Bienenschutz	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen Umwelt	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen Gesundheitsschutz	Gefahrensymbole	Wirkung
Fortsetzung <b>Nozomi</b>	einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Tafeltrauben		0,6	1/1	Sommer; Reihenbehandlung mit Abschirmung	F		<b>NW470, NW642-1 (5*)</b>	<b>SS2101</b> , SS206, SF245-02		
<b>Quickdown</b> (Pyraflufen 24,2 g/l als Ethylester 26 g/l) 005693-00 31.01.2026	Stocktriebe, nur in Riesling und Dornfelder	3	0,4 in Misch. mit 1,0 l/ha Toil	2/2 im Abstand von mind. 10 Tagen	n. Austrieb und erneuten Austrieb bis 15 cm Trieblänge	F	B4	<b>NW468, NW642-1 (5*)</b>	<b>SE110</b> , SF245-01, <b>SS110, SS2101</b> , SS610	GHS 05 07 08 09	Blattherbizid
<b>(G)RANGER</b> (Fluroxypyr 150 g/l + Triclopyr 150 g/l) 007003-00 ► 15.12.2025	Abtötung von Wurzelschossern BBCH 01-91, nach der Rodung und bei erneutem Austrieb		20% in mind. 2 ml Wasser/Stamm	1/1	streichen, Einzelpflanzen-/Stammbehandlung	F	B4	<b>NW468, NW642-1 (5*)</b>	SF245-01, SE110, SE120, SS110, SS120, SS2101, SS2202, SS620	GHS 07 08 09	Blattherbizid
			0,4 ml pro Stamm	1/1	injizieren, Einzelpflanzen-/Stammbehandlung	F					
	Weinrebe, zur Rodung vorgesehen		20% in mind. 2 ml Wasser/Stamm	1/1	streichen, Einzelpflanzen-/Stammbehandlung	F					
			0,4 ml pro Stamm	1/1	injizieren, Einzelpflanzen-/Stammbehandlung	F					

<b>5.4.3 Herbizide</b>		5* = Gewässerabstand nach PS-AVO = 5 m unter best. Bedingungen (s. Pkt.1.3.2)									
<b>Mittel</b> (Wirkstoff) Zulassungsnr. Zulassungsende	Wirkung gegen/ Bemerkungen	ab Standjahr	Aufwandmenge in l bzw. kg/ha	max. Anwendungshäufigkeit je Befall/je Jahr	Anwendungszeitpunkt	Wartezeit in Tagen	Bienenschutz	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen Umwelt	Anwendungs- bestimmungen/ Auflagen Gesundheitsschutz	Gefahrensymbole	Wirkung
<b>Roundup Future</b> (Glyphosat 500 g/l) 00A042-00 15.12.2026	einkeimbl. + zweikeimbl., ausgenommen Acker- Winde	4	2,16	2/2 im Abstand von 3 Monaten		35	B4	<b>NG352-1, NG404, NW470, NT140, NW642-1 (5*)</b>	SF245-02, SS206	GHS 09	Blattherbizid
	Acker-Winde	4	2,16	1/1		35	B4	<b>NG352-1, NW470, NT140, NW642-1 (5*)</b>			
<b>Roundup PowerFlex (A)</b> (Glyphosat 480 g/l) 006149-00 ► 16.11.2024 Abverkaufsfrist 16.05.2025 Aufbrauchfrist bis 16.05.2026	einkeimbl. + zweikeimbl., ausgenommen Acker- Winde	4	3,75	2/2 im Abstand von 3 Monaten	während der Vegetationsperiode	30	B4	<b>NG352, NG404, NT103, NW468, NW642-1 (5*)</b>	<b>SF275-EEWE,</b> SF245-02, SS206	GHS 09	Blattherbizid
<b>Roundup REKORD</b> (Glyphosat 720 g/kg) 007525-60 ► 31.12.2026	einkeimbl. + zweikeimbl., ausgenommen Acker- Winde	4	2,5	2/2 im Abstand von 3 Monaten		30	B4	<b>NG352, NG404, NT103, NW468, NW642-1 (5*)</b>	SF245-01, SS110, SS2101	GHS 09	Blattherbizid
<b>Roundup Ultra (A)</b> (Glyphosat 360 g/l) 044142-00 ► 15.12.2024 Abverkaufsfrist 16.05.2025 Aufbrauchfrist bis 16.05.2026	ein- + zweikeimbl., ausgen. Acker-Winde	4	5,0	2/2 im Abstand von 3 Monaten	während der Vegetationsperiode	30	B4	<b>NG352, NG404, NW470, NT103, NW642-1 (5*)</b>	<b>SF275-28WE,</b> <b>SS110-1,</b> SF245-02, SS206	GHS 09	Blattherbizid
<b>(G)Shark</b> (Carfentrazone 55,92 g/l) 005268-00 31.03.2025	Stocktriebe Spitzschirm, nur in wüchsigen Sorten (Grüner Silvaner, Morio Muskat, Chardonnay, Schwarzriesling und Burgundersorten)	3	1,0	1/1	nach Austrieb bis 15 cm Trieblänge	F	B4	<b>NW468, NW605 (50%:5*, 75%:5*, 90%:5*), NW606 (5*)</b>	SE110, SF245-01, SS110, SS210	GHS 07 09	Blattherbizid
		3	0,5	2/2	n. Austrieb u. erneutem Austrieb bis 15 cm Triebl.			<b>NW468, NW609 (5*)</b>			
<b>Taifun forte</b> (Glyphosat 360 g/l) 044044-00 ► 15.12.2026	ein- + zweikeimbl., ausgen. Acker-Winde	4	5,0	2/2 im Abstand von 90 Tagen	während der Vegetationsperiode	30	B4	<b>NG352, NG404, NT103, NW470, NW642-1 (5*)</b>	<b>SF275-EEWE,</b> SF245-02, SS206		Blattherbizid