Änderungen der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln

im Bereich Ackerbau aus den letzten 6 Monaten
Stand: 05.12.2025

Das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) übernimmt keine Garantie der sachlichen Richtigkeit; Zulassungsbehörde ist das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL).

Polyversum OD

Das Fungizid hat folgende Zulassungserweiterungen nach Artikel 51 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 jeweils **nur zur Befallsminderung** erhalten:

- In Sommer- und Winterweichweizen gegen Halmbruch und *Puccinia*-Arten ab BBCH 30 bis 69 mit 0,2 l/ha,
  max. 3 x in dieser Anwendung und für die Kultur bzw. je Jahr, Wartezeit: F
- in Sonnenblume gegen *Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinerea*, *Alternaria*-Arten ab BBCH 12 bis 65 mit 0,2 l/ha,
  max. 2 x in dieser Anwendung und für die Kultur bzw. je Jahr, Wartezeit: F
- in Oelrettich gegen *Sclerotinia sclerotiorum*, Wurzelhals- und Stängelfäule ab BBCH 12 bis 39 mit 0,2 l/ha,
  max. 3 x in dieser Anwendung und für die Kultur bzw. je Jahr, Wartezeit: F
- in Raps gegen *Verticillium* ab BBCH 12 bis 39 mit 0,4 l/ha,
  max. 2 x in dieser Anwendung und für die Kultur bzw. je Jahr, Wartezeit: F

Ariane C

Das Herbizid hat folgende Zulassungserweiterungen nach Artikel 51 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 erhalten:

- In Langähriger Quecke zur Nutzung als nachwachsender Rohstoff für techn. Zwecke gegen Ackerkratzdistel und einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ab BBCH 13 bis 31 mit 1,5 l/ha, max. 1 x in dieser Anwendung und für die Kultur bzw. je Jahr, Wartezeit N
- in Gräsern (Bestände zur Saatguterzeugung) gegen Ackerkratzdistel und einjährige zweikeimblättrige Unkräuter ab BBCH 13 bis 29 mit 1,5 l/ha,
  max. 1 x in dieser Anwendung und für die Kultur bzw. je Kalenderjahr, Wartezeit: N

Ortiva

Das Fungizid hat folgende Zulassungserweiterungen nach Artikel 51 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 erhalten:

- In Ackerbohne gegen Falschen Mehltau bei BBCH 13-19 und 51-72 mit 1,0 l/ha,
  max. 2 x in dieser Anwendung und für die Kultur bzw. je Jahr, Wartezeit 35 Tage
- in Wurzelzichorie zur Inulin- und Kaffeersatzproduktion gegen Rost ab BBCH 13 mit 1,0 l/ha, max. 2 x in dieser Anwendung und für die Kultur bzw. je Jahr, Wartezeit 14 Tage
- in Phacelia zur Saatguterzeugung gegen *Botrytis*-Arten ab BBCH 13 bis 39 mit 1,0 l/ha,
  max. 2 x in dieser Anwendung und für die Kultur bzw. je Jahr, Wartezeit: F

Elatus Era

Das Fungizid hat folgende Zulassungserweiterungen nach Artikel 51 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 erhalten:

- In Lein gegen Echten Mehltau ab BBCH 51 bis 72 mit 0,66 l/ha
- in Futtererbse gegen Erbsenrost ab BBCH 51 bis 72 mit 0,66 l/ha
- in Hafer gegen Haferkronenrost ab BBCH 31 bis 61 mit 1,0 l/ha
- in Gräsern zur Saatguterzeugung gegen *Puccinia*-Arten und pilzliche Blattfleckenerreger ab BBCH 31 bis 69 mit 1,0 l/ha
- in Durchwachsener Silphie und Langährige Quecke (Nutzung als nachwachsender Rohstoff für technische Zwecke) ab BBCH 31 bis 69 mit 1,0 l/ha
- in Roggen und Weizen gegen Schwarzrost ab BBCH 31 bis 61 mit 1,0 l/ha

Jeweils max. 1 x in dieser Anwendung und für die Kultur bzw. Kalenderjahr
Wartezeit: Hafer, Roggen, Weizen 42 Tage; Lein, Futtererbse = F; Gräser, Langährige Quecke, Durchwachsene Silpie = N

Carnadine 200

Das Insektizid hat folgende Zulassungserweiterungen nach Artikel 51 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 erhalten:

- In Krambe gegen Blattläuse und Rapsglanzkäfer mit 0,18 l/ha ab BBCH 51 bis 59
- in Oelrettich, Phacelia, Serradella in Beständen zur Saatguterzeugung gegen Blattläuse bei starkem Befallsdruck mit 0,15 l/ha
- in Sommerraps gegen Blattläuse mit 0,18 l/ha ab BBCH 51 bis 59
- in Sommertriticale, Sommerroggen, Einkorn, Emmer gegen Blattläuse mit 0,15 l/ha ab BBH 21 bis 75.

Jeweils max. 1 x in dieser Anwendung und für die Kultur bzw. Kalenderjahr
Wartezeit: Getreide, Sommerraps, Krambe 28 Tage; Oelrettich, Phacelia, Serradella = F

Bandur

Bandur erhielt die Zulassungserweiterung nach Artikel 51 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 zur Anwendung in **Weißer Lupine** (Verwendungs-zweck: Hülsenfrüchte trocken) gegen einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter vor dem Auflaufen (BBCH 00-08) mit 3,0 l/ha; NT108-1, NW607-3, NW701, NW800
max. 1 Anwendung für die Kultur bzw. je Jahr; Wartezeit: F;