

Schadproblem (Erreger)	Präparate (Wirkstoffe)	max. Anwendungshäufigkeit je Befall/je Jahr Vegetationsperiode	WZ (Tage)		Bußgeldbewährte Auflagen	Gefahrensymbole/ Bienengefährlichkeit
			FX	GWH		
Schnittlauch						
Puccinia-Arten	(G) ELATUS PLUS (Benzovindiflupyr) / 008405-00 / 02.03.2027 1x 0,5 l/ha bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome / von Beginn der Verdickung bzw. Verlängerung des Blattgrundes bis 50 % der Pflanzen Schlotten geknickt (BBCH 41–48) der Kultur in 300-600 Wasser/ha	1/1	21	/	NW468; NW642-1; NW605-2 (50% 5 m, 75% 5m, 90% *); NW606 (5m); NW705	GHS05 GHS07 GHS09 B4
Frische Kräuter						
Minierfliegn Thrips spp.	(G) SpinTor (Spinosad) / 005314-00 / 15.03.2026 0,3 l/ha bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome / im Abstand von mindestens 7 Tagen in 200-600 Wasser/ha	2/2	3	/	NW468; SF276-ZB NT108-1; NW607-2 (50% 15 m, 75% 10m, 90% 5m); NW706; SF275-EEGE; SF276-28GE	GHS09 B1