

Gemüsebau 16/2026

Frankfurt (Oder), den 28.04.2026

Zulassungsinformationen

Notfallzulassung nach Art. 53 Verordnung (EG) Nr. 1107/ 2009

Pirimor G (*Pirimicarb*)

Notfallzulassung für 120 Tage gilt vom 27. April 2026 bis zum 24. August 2026

Kultur(en)	Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
Möhre (DAUCA)	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,3 kg/ ha in 200-600 l/ha Wasser,	7	Blattläuse BBCH 10 - 49, bei sichtbarem Befall, nach Warndienstaufruf

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4), NW470, NG405, NW605-2, NW606, NW706, NT101-1, SF276-EEGE, SF555-22, VA268, SF278-10GE, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Orondis VIP (*Metalaxyl-M + Oxathiapiprolin*)

Notfallzulassung für 120 Tage gilt vom 22. April 2026 bis zum 19. August 2026

Kultur(en)	Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
Salat-Arten (NNNSS), ausgenommen Eissalat	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,5 l/ ha in 200-800 l/ha Wasser, im Abstand von 7 Tagen	10	Falscher Mehltau (<i>Bremia lactucae</i>) BBCH 12 - 49, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienstaufruf
Spinat (NNNSA) und verwandte Arten, ausgenommen Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete)			Falsche Mehлтаupilze (<i>Peronosporaceae</i>), BBCH 12 - 49, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienstaufruf

Fortsetzung Orondis VIP			
<i>Kultur(en)</i>	<i>Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit</i>	<i>Wartezeit (Tage)</i>	<i>Anwendungsgebiet/ Bemerkungen</i>
Hülsengemüse (NNNLG), Blatt- und Stielgemüse (NNNVL), Wurzel- und Knollengemüse (NNNVW)	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,5 l/ ha in 200-800 l/ha	10	Falsche Mehltupilze (<i>Peronosporaceae</i>), BBCH 11 - 18, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienstaufruf
Blumenkohle (NNNKL), Kohlrabi (BR SOG), Kopfkohle (NNNKK), ausgenommen Rosenkohl	Wasser, im Abstand von 7 Tagen	21	Falsche Mehltupilze (<i>Peronosporaceae</i>), BBCH 12 - 49, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndienstaufruf

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4), NW470, NG371.0933, SF275-10GE, NW642-1, SF245-02, VV605 für die Anwendung in Kohlrabi, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.
Die Kulturen Chinakohl, Pak Choi und Rosenkohl sind nicht Bestandteil der Notfallzulassung, da für diese Kulturen Überschreitungen der Rückstandshöchstmengen nicht ausgeschlossen werden können.

Zulassungserweiterung nach Art. 51 Verordnung (EG) Nr. 1107/ 2009

Lentagran WP (*Pyridat*)

Zulassungsnummer: 043231-00

Zulassung bis 31.12.2031

<i>Kultur(en)</i>	<i>Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit</i>	<i>Wartezeit (Tage)</i>	<i>Anwendungsgebiet/ Bemerkungen</i>
/03-005 Schnittlauch (ALLSC)	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,75 kg/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser, im Abstand von 7 – 14 Tagen, im Splittingverfahren (2 Behandlungen)	F	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter Kultur: BBCH13 Schadorganismus: BBCH 10-12
/08-001 Spargel (ASPOF)	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 2 kg/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser, Unterblattbehandlung / Reihenbehandlung	F	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, nach der Stechperiode
/01-010 Artischocke (CYUSC) Blatt- und Blütennutzung, Verwendung als teeähnliches Erzeugnis	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 1 kg/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, im Abstand von 7 – 14 Tagen, im Splittingverfahren (2 Behandlungen)	42	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter Kultur: BBCH 13 Schadorganismus: BBCH 10-12

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!

Fortsetzung Lentagran WP			
<i>Kultur(en)</i>	<i>Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit</i>	<i>Wartezeit (Tage)</i>	<i>Anwendungsgebiet/ Bemerkungen</i>
Verwendung als teeähnliches Erzeugnis: /01-011 Baldrian (<i>Valeriana officinalis</i>) (VALOF) Wurzelnutzung, /01-012 Johanniskraut (<i>Hypericum</i>) (HYPSS) Blatt- und Blütennutzung, /01-013 Spitzwegerich (PLALA)	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 1 kg/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, im Abstand von 7 – 14 Tagen, im Splittingverfahren (2 Behandlungen)	42	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter Baldrian: BBCH 31 Johanniskraut: nach dem Austrieb, bei Wuchshöhe 5-10 cm, Spitzwegerich: ab BBCH 11 Schadorganismus: BBCH 10-12
/01-001 Dill (AFEGR), Nutzung als frisches Kraut /01-005 Dill (AFEGR), Samen- und Fruchtnutzung /01-006 Gewürzfenchel (BVL: FOEVD; EPPO: FOEVU), Samen- und Frucht-nutzung /01-008 Kümmel (CRYCA), Samen- und Fruchtnutzung	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,75 kg/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, im Abstand von 7 – 14 Tagen, im Splittingverfahren (2 Behandlungen)	Dill Frisches Kraut: 42, Dill + Gewürz- fenchel + Kümmel Samen/ Frucht: 90	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter Kultur: BBCH 10-14 Schadorganismus: BBCH 10-12
/01-007 Gewürzfenchel (BVL: FOEVD; EPPO: FOEVU), Samen- und Frucht- nutzung /01-009 Kümmel (CRYCA), Samen- und Frucht- nutzung	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,75 kg/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, im Abstand von 7 – 14 Tagen, im Splittingverfahren (2 Behandlungen)	90	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter Kultur: ab 2. Standjahr nach dem Austrieb Schadorganismus: BBCH 10-12

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!

Fortsetzung Lentagran WP			
<i>Kultur(en)</i>	<i>Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit</i>	<i>Wartezeit (Tage)</i>	<i>Anwendungsgebiet/ Bemerkungen</i>
/00-012 Porree (ALLPO), /00-013 Speisezwiebel (ALLCE)	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 1 kg/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser, im Abstand von 10 – 14 Tagen, im Splittingverfahren (2 Behandlungen)	Porree: 28 Speisezwiebel: 56	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter Kultur: BBCH 12-39
/00-014 Porree (ALLPO), /00-09 Speisezwiebel (ALLCE)	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 2 kg/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser	Porree: 28 Speisezwiebel: 56	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter Kultur: BBCH 13-39
/01-004 Schnittlauch (ALLSC) Nutzung als frisches Kraut	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,75 kg/ha in 200 bis 600 l/ha Wasser, im Abstand von 7 – 14 Tagen, im Splittingverfahren (2 Behandlungen)	35	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter Kultur: ab BBCH 13, Schadorganismus: BBCH 10-12

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4), NW470, NT102-1, NW605-2, NW606, SF275-35GE, SS110-1, SS120-1, SS2101, SS526, VA320, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten

BENEVIA (Cyantraniliprole)

Zulassungsnummer: 00A175-00 Zulassung bis 14.09.2027

<i>Kultur(en)</i>	<i>Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit</i>	<i>Wartezeit (Tage)</i>	<i>Anwendungsgebiet/ Bemerkungen</i>
/04-006 Chicorée (CICIF)	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,75 l/ha in 300 bis 800 l/ha Wasser, wenn die Kultur nicht vor der Blüte geerntet wird: letzte Behandlung vor der Blüte spätestens 3 Wochen vor erwartetem Blühbeginn, Anwendung auf derselben Fläche nur alle 2 Jahre, NG372.1182	14	Freifressende Schmetterlingsraupen, Zweiflügler (Fliegen, Mücken, <i>Diptera</i>), Eulenarten (<i>Noctuidae</i>), Thrips spp. BBCH 40-89, bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!

Fortsetzung Benevia			
<i>Kultur(en)</i>	<i>Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit</i>	<i>Wartezeit (Tage)</i>	<i>Anwendungsgebiet/ Bemerkungen</i>
/04-002 Wurzel- und Knollengemüse (NNNVW)	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,75 l/ha in 300 bis 800 l/ha Wasser, wenn die Kultur nicht vor der Blüte geerntet wird: letzte Behandlung vor der Blüte spätestens 3 Wochen vor erwartetem Blühbeginn, Anwendung auf derselben Fläche nur alle 2 Jahre, NG372.1182	14	Kohlweißlings-Arten, Eulenarten (Noctuidae), Thrips spp., BBCH 41-89, bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
/04-001 Wurzel- und Knollengemüse (NNNVW)	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,5 l/ha in 300 bis 800 l/ha Wasser, wenn die Kultur nicht vor der Blüte geerntet wird: letzte Behandlung vor der Blüte spätestens 3 Wochen vor erwartetem Blühbeginn, Anwendung auf derselben Fläche nur alle 2 Jahre, NG372.1182	14	Mamestra-Arten BBCH 41-89, bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome,

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6611 (B1), NG371.1182, NT108-1, NW605-2, NW606,
weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten

Starship (Mesotrione)

Zulassungsnummer: 00B256-00 Zulassung bis 31.05.2033

<i>Kultur(en)</i>	<i>Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit</i>	<i>Wartezeit (Tage)</i>	<i>Anwendungsgebiet/ Bemerkungen</i>
/01-005 Zuckermais (ZEAMS)	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 1 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser	F	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter Kultur: BBCH 00-09, NT108-1
/01-006 Zuckermais (ZEAMS)	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,5 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser, im Splittingverfahren	F	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter Kultur: BBCH 00-18, NT103-1 1. Behandlung BBCH 00-09, 2. Behandlung BBCH 10-18

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!

Fortsetzung Starship			
<i>Kultur(en)</i>	<i>Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit</i>	<i>Wartezeit (Tage)</i>	<i>Anwendungsgebiet/ Bemerkungen</i>
/01-007 Zuckermais (ZEAMS)	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 1 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser	F	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter Kultur: BBCH 10-18, NT108-1
/01-008 Zuckermais (ZEAMS)	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,5 l/ha in 200 bis 400 l/ha Wasser, im Splittingverfahren	F	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter Kultur: BBCH 10-18, NT103-1

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6611 (B1), NW642-1, NW606, SF276-EEGE, SF644-21, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten

NeemAzal-T/S (Azadirachtin)

Zulassungsnummer: 0204436-00 Zulassung bis 31.01.2028

<i>Kultur(en)</i>	<i>Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit</i>	<i>Wartezeit (Tage)</i>	<i>Anwendungsgebiet/ Bemerkungen</i>
/13-001 Blattgemüse (NNNVB)		3	Beißende und Saugende Insekten BBCH 11
/13-002 Blattgemüse (NNNVB) Jungpflanzenanzucht		F	
/13-003 Blatt- und Stielgemüse (NNNVB), Wurzel- und Knollengemüse (NNNVW), Hülsengemüse (3LEVC) Nutzung als Baby-Leaf-Salat		3	

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4), NW609-2, NW800, für Indikation /13-01 und /13-03, **NW468,** weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!