

Tabelle 2.4.5: Fungizide Hafer (Wirkung mit Indikation = schwarz, Wirkung ohne Indikation = grau)

PSM Zulassung bis	Wirkstoff	WSG (g/kg o. l)	FRAC-Einstufung	AWM (l o. kg/ha)	Abstand (m)				Anwenderschutz	BBCH	Halmbruch ¹⁾	Mehltau	Haferkronrost	Kosten (€/ha)	
					Gewässer										
					Hang	ADM (%)									
						-	50	75							90
Azole/ Azol-haltige Fungizide															
Flexure/ Padelli 08/2026 ▶	Spiroxamine Prothioconazol	300 160	5 3	1,25	20	■	20	15	15	◆	30-61	+	++(+)	++(+)	60
Protendo/ Pecari 250 EC ²⁾ 08/2026 ▶	Prothioconazol	250	3	0,8	20	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	◆	30-61	+	+	++(+)	22
Spector ³⁾ 08/2027	Tebuconazol	250	3	1,0	10	10	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	◆	31-69		+	++(+)	
Strobilurine/Strobilurin-haltige Fungizide															
Azbany 05/2028 ▶	Azoxystrobin	250	11	1,0	-	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ		31-59		R	+++	25
Tomec 09/2026 ▶	Pyraclostrobin	200	11	1,25	-	15	10	Ⓢ	Ⓢ		25-59		R	+++	
Carboxamide/Carboxamid-haltige Fungizide															
Ascra Xpro 03/2028	Bixafen Fluopyram Prothioconazol	65 65 130	7 7 3	1,2	-	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	◆	30-61	+	++	++(+)	75
Elatus Era 08/2026	Benzovindiflupyr Prothioconazol	75 150	7 3	1,0	-	15	10	Ⓢ	Ⓢ		31-61	+	++	++(+)	68
Revytrex 10/2028	Fluxapyroxad Mefentrifluconazol	67 67	7 3	1,125	-	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	◆	30-61	+	++	++(+)	60
Siltra Xpro 03/2028	Bixafen Prothioconazol	60 200	7 3	1,0	-	10	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	◆	31-59	+	++	++(+)	

¹⁾ Anwendung der Indikation Halmbruch nur zw. BBCH 30-32 (Ausnahmen möglich, Gebrauchsanweisung beachten)

²⁾ NW800, NT850; ³⁾ NT101; R = Resistenz vorhanden; Produkte ohne Azolwirkstoff nur in Kombination mit Azolen empfohlen, Indikation: schwarze Schrift +++ = zugelassen, graue Schrift +++ = keine Zulassung aber zwangsläufig eintretende Nebenwirkung
Einstufung der Wirkung: + = Teil-; ++ = mittlere; ++(+) = gute; +++ = sehr gute; leeres Kästchen = keine Wirkung bzw. keine Informationen