

Ackerbau 44/2026


Frankfurt (Oder), den 12.06.2026

Aktuelles zu Kartoffeln

Mittlerweile sind auch die letzten Kartoffeln aufgelaufen, die weitesten Kartoffelschläge befinden sich maximal in BBCH 65.

Nutzen Sie die Entscheidungshilfe **SIMBLIGHT 1** unter www.isip.de, um den Termin für den Spritzstart gegen **Krautfäule (*Phytophthora infestans*)** festzulegen. Weitere Infos zur Nutzung dieser Entscheidungshilfe finden Sie auch im **Hinweis Ackerbau 41/2026**.

Aktuell wird für die Kartoffelschläge in Brandenburg der Behandlungsbeginn für PR und OPR



bis 13.06.2026 vorhergesagt bzw. wurde schon erreicht (gilt nicht für Berechnungsflächen!). Dennoch kann, je nach Sorte, Anbaudichte u.a., das Risiko für Infektionen gegeben sein und durch **SIMBLIGHT1** für einzelne Schläge schon eher eine Behandlung ausgerufen werden. Ebenso können Regenereignisse der letzten Tage, sowie angekündigte Niederschläge in den nächsten Tagen, das Infektionsrisiko erhöhen.

Für den Spritzstart sollte ein systemisches Mittel ausgewählt werden, dies verhindert effektiv das Hochwachsen des Pilzes von der

Knolle zum Stängel. Für die Auswahl des optimalen Spritzabstandes nutzen Sie das Prognosemodell **SIMPHYT3**. Hierfür benötigt das Modell Angaben zu Sorte, Krautwachstum, das Datum der letzten Behandlung und ob sporulierender Befall auftrat. Insgesamt hängen die Mittelwahl und der Spritzabstand vom Infektionsdruck sowie vom Krautwachstum ab.

Beobachtungen auf den Praxisflächen des Pflanzenschutzdienstes (PSD) zeigen noch keinen Befall mit Pilzkrankheiten.

Kartoffelkäfer sind weiterhin in den Beständen aktiv, so sind neben Eiablagen auch die ersten Larven auf den Pflanzen zu finden. Kontrollieren Sie ihre Bestände!

Alle Informationen zur aktuellen Situation u.v.m. unter www.isip.de/psd-bb.