

Gemüsebau 31/2026

Frankfurt (Oder), den 23.06.2026

Zulassungsinformationen

Zulassungserweiterung nach Art. 51 Verordnung (EG) Nr. 1107/ 2009

Lentagran (Pyridat)

Zulassungsnummer: 043231-00

Zulassung bis 31.12.2031

<i>Kultur(en)</i>	<i>Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit</i>	<i>Wartezeit (Tage)</i>	<i>Anwendungsgebiet/ Bemerkungen</i>
/06-011 Blumenkohl (BRSOB), Brokkoli (BRSOK) /06-007 Grünkohl (BRSOC) /06-009 Rosenkohl (BRSOF), /06-005 Rotkohl (BRSOR), Weißkohl (BRSOL), Wirsing (BRSOS),	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 2 kg/ha in 200-400 l/ha Wasser	F	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, nach dem Auflaufen oder 3-4 Wochen nach dem Pflanzen, ab Frühjahr, BBCH16-39 Grün-/ Rosenkohl: Sommer, BBCH16-39
im Splittingverfahren: /06-014 Blumenkohl (BRSOB), Brokkoli (BRSOK) /06-010 Grünkohl (BRSOC) /06-008 Rosenkohl (BRSOF), /06-006 Rotkohl (BRSOR), Weißkohl (BRSOL), Wirsing (BRSOS)	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 1 kg/ha in 200-400 l/ha Wasser im Abstand von 7-14 Tagen	F	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, nach dem Auflaufen oder 3-4 Wochen nach dem Pflanzen, ab Frühjahr, BBCH14-39 Grün-/ Rosenkohl: Sommer, BBCH14-39

Fortsetzung Lentagran			
<i>Kultur(en)</i>	<i>Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit</i>	<i>Wartezeit (Tage)</i>	<i>Anwendungsgebiet/ Bemerkungen</i>
/06-019 Melisse (MLSOF), Minze-Arten (MENSS), Verwendung als teeähnliches Erzeugnis, Verwendung von Blättern und Blüten, im Splittingverfahren	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 1 kg/ha in 200-400 l/ha Wasser im Abstand von 7-14 Tagen	42	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter , Kultur: BBCH11-13 Schaderreger: BBCH10-12, nach dem Austrieb, bei 10-15 cm Wuchshöhe, ab Frühjahr
/06-015 Schwarzwurzel (SCVHI),	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,5 kg/ha in 200-400 l/ha Wasser im Abstand von 5-7Tagen, im Splittingverfahren	F	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter , nach dem Auflaufen, ab Frühjahr, BBCH14-19
/06-013 Spargel (ASPOF), in Junganlagen	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 1 kg/ha in 200-400 l/ha Wasser, im Abstand von 7-14 Tagen, im Splittingverfahren	F	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter , nach dem Auflaufen, ab Frühjahr, ab BBCH21
/06-001 Zuckermais (ZEAMS),	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 2 kg/ha in 200-600 l/ha Wasser	42	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter , nach dem Auflaufen, ab Frühjahr, BBCH12-18
/06-003 Zuckermais (ZEAMS),	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 1 kg/ha in 200-600 l/ha Wasser, im Abstand von 7-14 Tagen, im Splittingverfahren	42	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter , nach dem Auflaufen, ab Frühjahr, BBCH12-18
/06-012 Zwiebelgemüse (NNNSZ), Nutzung als Bundzwiebeln	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 2 kg/ha in 200-400 l/ha Wasser	35	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter , nach dem Auflaufen, ab Frühjahr, BBCH13-39

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4), NT102-1, NW605-2, NW606, SF275-35GE, SS526, VA320, LM121, SF245-02, VH301-3, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Bandur (Aclonifen)

Zulassungsnummer: 0434145-00

Zulassung bis 31.10.2027

Kultur(en)	Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
/08-006 Anis (PIMAN)	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,5 l/ha in 200-400 l/ha Wasser im Abstand von 7-10 Tagen, im Splittingverfahren	70	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Ackerfuchsschwanz (<i>Alopecurus myosuriodes</i>), Einjähriges Rispengras (<i>Poa annua</i>), nach dem Auflaufen, Schaderreger: BBCH10-11 Grün-/ Rosenkohl: Sommer, BBCH16-39

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4), NW706, NW206, NW264, NW265, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Susteed (*Bacillus amyloliquefaciens* Stamm QST713, vorm. *B. subtilis*)

Zulassungsnummer: 00B556-00

Zulassung bis 30.06.2039

Kultur(en)	Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
/02-021 Aubergine (SOLME) /02-025 Futtererbse (PIBSA), Kichererbse (CIFAR), Sojabohne (GLXMA), Speiselinse (LENCU), Stangenbohne (PHSVV), Weißer Lupine (LUPAL), Zuckererbse (PIBSZ)	Freiland, Saatgutbehandlung, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 6,6 ml/kg Saatgut: Erbsen, Bohnen, Lupine: max. Mittelaufwand 1.650 ml/ha (entsprechend max. 250 kg Saatgut pro ha), Aubergine, Tomate: max. Mittelaufwand 1,98 ml/ha (entsprechend max. 0,3 kg Saatgut pro ha)	F	Rhizoctonia solani ab BBCH 00, vor der Saat

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!

Fortsetzung Susteed			
Kultur(en)	Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
/02-038 Gemüsefenchel (FOEVA) /02-023 Gemüsepaprika (incl. Peperoni und Chili) (CPSAN) /02-028 Gurke (CUMSA) /02-032 Melone (CUMME) /02-033 Wassermelone (CITLA) /02-030 Patisson (CUUPM), Zucchini (CUUPG), /02-036 Möhre (DAUCA) /02-037 Salat-Arten (NNNSS) ausgenommen Salate /02-022 Tomate (LYPES) /02-035 Zwiebelgemüse (NNNSZ)	Fenchel: max. Mittelaufwand 198 ml/ha (entsprechend max. 30 kg Saatgut pro ha), Paprika: max. Mittelaufwand 7,26 ml/ha (entsprechend max. 1,1 kg Saatgut pro ha), Gurke, Melonen, Patisson, Zucchini: max. Mittelaufwand 16,5 ml/ha (entsprechend max. 2,5 kg Saatgut pro ha), Möhre: max. Mittelaufwand 39,6 ml/ha (entsprechend max. 6 kg Saatgut pro ha), Salat-Arten: max. Mittelaufwand 264 ml/ha (entsprechend max. 40 kg Saatgut pro ha), Zwiebel: max. Mittelaufwand 46,2 ml/ha (entsprechend max. 7 kg Saatgut pro ha)	F	Rhizoctonia solani ab BBCH 00, vor der Saat

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!

Fortsetzung Susteed			
Kultur(en)	Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
/02-007 Blumenkohl (BRSOB) /02-009 Brokkoli (BRSOK) /02-016 Chinakohl (BRSPK) /02-018 Grünkohl (BRSOC) /02-005 Rosenkohl (BRSOB) /02-003 Weißkohl (BR SOL) /02-012 Radieschen (RAPS R) /02-014 Rettich (RAPS N)	Freiland, Saatgutbehandlung, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 6,6 ml/kg Saatgut, Kohl: max. Mittelaufwand 16,5 ml/ha (entsprechend maximal 2,5 kg Saatgut pro ha), Radieschen: max. Mittelaufwand 198 ml/ha (entsprechend max. 30 kg Saatgut pro ha), Rettich: max. Mittelaufwand 66 ml/ha (entsprechend max. 10 kg Saatgut pro ha),	F	Wurzelhals- und Stängelfäule <i>(Leptosphaeria maculans),</i> Rhizoctonia solani ab BBCH 00, vor der Saat
/02-008 Blumenkohl (BRSOB) /02-010 Brokkoli (BRSOK) /02-017 Chinakohl (BRSPK) /02-019 Grünkohl (BRSOC) /02-006 Rosenkohl (BRSOB) /02-004 Weißkohl (BR SOL) /02-013 Radieschen (RAPS R) /02-015 Rettich (RAPS N)	Freiland, Saatgutbehandlung, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 6,6 ml/kg Saatgut, Kohl: max. Mittelaufwand 16,5 ml/ha (entsprechend maximal 2,5 kg Saatgut pro ha), Radieschen: max. Mittelaufwand 198 ml/ha (entsprechend max. 30 kg Saatgut pro ha), Rettich: max. Mittelaufwand 66 ml/ha (entsprechend max. 10 kg Saatgut pro ha),	F	Rapserrfloh <i>(Psylliodes chrysocephala),</i> ab BBCH 00, vor der Saat

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB663, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!