

Ackerbau 56/2026

Frankfurt (Oder), 10. Juli 2026

***Cercospora* in Zuckerrüben**

Kontrollieren Sie Ihre Bestände!

Im Hinweis 53/2026 (7. Juli) berichteten wir von einem Erstaufreten in mehreren Landkreisen. Erneute Bonituren zeigen z.B. in HVL, dass der Bekämpfungsrichtwert überschritten ist, schlagweise wurden bis zu 90 % Befallshäufigkeit von *Cercospora*-Blattflecken bonitiert. Die Befallsstärke ist noch gering, aber über erste Behandlungen muss jetzt entschieden werden. Die Ergebnisse des Blattkrankheitenmonitorings sind in ISIP abrufbar, beachten Sie aber das Veröffentlichungsdatum. Eine Aktualisierung erfolgt erst am Ende der nächsten Woche. Verbreitet ist auch *Alternaria* in den Beständen zu sehen.

Beachten Sie die aktuellen Meldungen unter:

<https://www.isip.de/brandenburg/pflanzenschutzdienst/secure-ackerbau> (Zuckerrüben)

Wir weisen noch einmal darauf hin, dass in den Pflanzenschutzinformationen (wie im Hinweis 53/2026) oft nur eine Auswahl von PSM aufgelistet wird. Hier wurden bereits Fungizide wie Kupfer-Präparate genannt. Dennoch sei hier auch noch auf ein weiteres kupferhaltiges Mittel hingewiesen: Grifon® SC (229,79 g/l Kupferoxychlorid + 208,26 g/l Kupferhydroxid). In der Ackerbaubroschüre (Redaktionsschluss November 2025) sind Kupferpräparate nicht gelistet.

Aktuelles zum Maiszünsler

Der Einsatz von Trichogramma (Hinweis 49/2026) wurde ab dem 04. Juli empfohlen.

Für eine Insektizidapplikation ist es noch zu früh!

Ein erster Larvenschlupf konnte in MOL und OPR jeweils an einem Standort registriert werden. In anderen Regionen konnten noch keine Larven beobachtet werden. Insektizidapplikationen sind erst zum Hauptschlupf der Larven sinnvoll.

Beachten Sie die aktuellen Informationen und Ergebnisse der Pheromonfallenfänge/
Eiablagetermine/Larvenschlupf unter:

<https://www.isip.de/brandenburg/pflanzenschutzdienst/secure-ackerbau> (Mais)

Aktuelle Informationen unter www.isip.de/psd-bb.