

Gemüsebau 36/2026

Frankfurt (Oder), den 15.07.2026

Zulassungsinformationen

Notfallzulassung nach Art. 53 Verordnung (EG) Nr. 1107/ 2009

Closer (*Sulfoxaflor*)

Zulassungsnummer: 008447-00

Zulassung bis 18.08.2029

Notfallzulassung für 120 Tage gilt vom 6. Juli 2026 bis zum 2. November 2026

Kultur(en)	Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
Salate (LACSS) (Jungpflanzenanzucht)	Gewächshaus, Gießen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 2 ml/ ha in 1 l/ m ² Wasser, max. 100.000 Pflanzen/ha, bis einen Tag vor dem Pflanzen	3	Blattläuse BBCH 11 – 16, nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6611 (B1), NW468, NZ113, (ohne Kodierung): Zum Schutz von Wildbienen und anderen Bestäuberinsekten darf das Auspflanzen der behandelten Jungpflanzen ausschließlich auf Flächen erfolgen, auf denen keine blühenden Pflanzen stehen oder im weiteren Verlauf zur Blüte kommen. Dies gilt entsprechend für Pflanzen, die aus anderen Gründen attraktiv für Bienen sein könnten (z. B. Honigtau). weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Fonganil Gold (*Metalaxyl-M*)

Zulassungsnummer: 00A680-00

Zulassung bis 31.05.2036

Notfallzulassung für 120 Tage gilt vom 28. Juli 2026 bis zum 24. November 2026

Kultur(en)	Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
Petersilie (PARCR) (Schnittpetersilie)	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,2 l/ ha in 400- 600 l/ha Wasser	21	Falscher Mehltau (<i>Plasmopara crustosa</i>) ab BBCH 43, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB663 (B3), SF275-21GE, VA263-1, NW642-1, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Orondis Evo (Azoxystrobin + Oxathiapiprolin)

Zulassungsnummer:

00A973-00

Zulassung bis 03.03.2028

Notfallzulassung für 120 Tage gilt vom 13. Juli 2026 bis zum 9. November 2026

Kultur(en)	Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
Tomate (LYPES)	Gewächshaus, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 1 l/ ha in 200-800 l/ha Wasser im Abstand von 7 Tagen	3	Kraut- und Braunfäule (<i>Phytophthora infestans</i>) ab BBCH 12-89, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4), NW470, NW262, NW264, NW265, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Zulassungserweiterung nach Art. 51 Verordnung (EG) Nr. 1107/ 2009

Fonganil Gold (Metalaxyl-M)

Zulassungsnummer: 00A680-00

Zulassung bis 31.05.2036

Notfallzulassung für 120 Tage gilt vom 28. Juli 2026 bis zum 24. November 2026

Kultur(en)	Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
/01-001 Tomate (LYPES) Jungpflanzenanzucht	Gewächshaus, Gießen, max.1x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,25 ml/ m ² in min. 2 l/m ² Wasser	F	Phytophthora-Arten , ab BBCH 12, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis
Jungpflanzenanzucht von /01-002 Salat-Arten (NNNSS) /01-003 Frische Kräuter (NNNKE)		21	Falsche Mehltäupilze , ab BBCH 12, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis
/01-004 Kohlgemüse (BRSOX) (ausgenommen Chinakohl) /01-005 Gurke (CUMSA)		F	

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB663 (B3), NZ113, SF276-EVGE NW642-1, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!

Kultur(en)	Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
/01-001 Gurke (CUMSA)	Freiland, Spritzen, max. 6x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,5 l/ha in 400-1200 l/ha	3	Falscher Mehltau (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), ab BBCH 21, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, NW609-2
/01-002 Tomate (LYPES)	Wasser im Abstand von 7 - 10 Tagen	3	Kraut- und Braunfäule (<i>Phytophthora infestans</i>), ab BBCH 21, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, NT102-1, NW605-2, NW606
/01-003 Zucchini (CUUPG), Patisson (CUUPM), /01-005 Flaschenkürbis (LGNSI), Garten-Kürbis (CUUPE)), Moschus-Kürbis (CUUMO), Riesenkürbis (CUUMX) Verwendung mit Schale, auch bei Arten und Sorten mit normalerweise ungenießbarer Schale bei vorzeitiger Ernte	Freiland, Spritzen, max. 6x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,5 l/ha in 400-1200 l/ha Wasser im Abstand von 7 - 10 Tagen	3	Falscher Mehltau (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) ab BBCH 21, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, NW609-2
/02-001 Tomate (LYPES), Aubergine (SOLME)	Gewächshaus, Spritzen, max. 6x pro Jahr/ Kultur, AWM: bis 50 cm: 0,25 l/ha in 600l/ha Wasser,	3	Kraut- und Braunfäule (<i>Phytophthora infestans</i>), ab BBCH 21, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis,
/02-003 Zucchini (CUUPG), /02-004 Gurke (CUMSA)	50-125 cm: 0,375 l/ha in 900l/ha Wasser, über 125 cm: 0,5 l/ha in 1200 l/ha Wasser, im Abstand von 7 – 10 Tagen	3	Falscher Mehltau (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>) ab BBCH 21, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4), NG300, NG371.1012, NG372.1012, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Algisure Bio Schutz (Kaliumphosphit)
31.01.2027

Zulassungsnummer: 007839-00

Zulassung bis

Kultur(en)	Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
/17-002 Spinat und verwandte Arten (NNNSA), ausgenommen Spinat	Gewächshaus, Spritzen, max. 4x pro Jahr/ Kultur, AWM 4 l/ha in 400-600 l/ha Wasser, im Abstand von 7 – 10 Tagen	7	Falsche Mehltaupilze ab BBCH 14, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4), SF275-1GE, NW468, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Belanty (Mefentrifluconazole)

Zulassungsnummer: 00A480-00

Zulassung bis 20.03.2030

Kultur(en)	Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
/03-016 /03-017 /03-018 Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) (NNNKO)	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 1,5 l/ha in 200-1000 l/ha Wasser, im Abstand von min. 10 Tagen	14	Alternaria-Arten, Ringfleckkrankheit (<i>Mycosphaerella brassicola</i>), Echter Mehltau (<i>Erysiphe cruciferarum</i>), BBCH 14-49, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4), SF275-EEGE, SF282 NW470, SS530, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!