

Gemüsebau 38/2026

Frankfurt (Oder), den 22.07.2026

Zulassungsinformationen

Zulassungserweiterung nach Art. 51 Verordnung (EG) Nr. 1107/ 2009

Stomp Aqua (*Pendimethalin*) Zulassungsnummer: 035958-00 Zulassung bis 15.01.2028

Indikation: Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter

Ausgenommen:

Acker-Hundskamille, Kamille-Arten, Klettenlabkraut), Gemeines Kreuzkraut, Franzosenkraut-Arten

<i>Kultur(en)</i>	<i>Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit</i>	<i>Wartezeit (Tage)</i>	<i>Anwendungsgebiet/ Bemerkungen</i>
/07-002 Knollensellerie (APUGR) /07-003 Knollensellerie (APUGR) Nutzung als Bundsellerie	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 2,6 l/ha in 300-400 l/ha Wasser	F	Kultur: bis BBCH 13 Schadorganismus: bis BBCH 11, nach dem Pflanzen
/07-005 Pastinak (PAVSA), Wurzelpetersilie (PARCT) /04-010 Dill (AFEGR) Nutzung als frisches Kraut	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 2,6 l/ha in 300-400 l/ha Wasser	42	Kultur: vor dem Auflaufen, Schadorganismus: bis BBCH 11
/07-001 Schwarzwurzel (SCVHI) /04-011 Dill (AFEGR) Nutzung als Gewürz, Verwendung von Früchten und Samen		F	
/07-006 Baldrian (VALOF) Wurzelnutzung	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 2,6 l/ha in 300-400 l/ha Wasser	F	Kultur: BBCH 13-14, Schadorganismus: bis BBCH 11

Fortsetzung Stomp Aqua: Indikation: Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter Ausgenommen: Acker-Hundskamille, Kamille-Arten, Klettenlabkraut), Gemeines Kreuzkraut, Franzosenkraut-Arten			
<i>Kultur(en)</i>	<i>Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit</i>	<i>Wartezeit (Tage)</i>	<i>Anwendungsgebiet/ Bemerkungen</i>
/07-007 Möhre (DAUCA), /07-008 Schwarzwurzel (SCVHI) /07-009 Pastinak (PAVSA), Wurzelpetersilie (PARCT)	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 1,3 l/ha in 300-400 l/ha Wasser im Abstand von 2 – 5 Wochen, im Splittingverfahren	42	Kultur: Voraufbau (VA) BBCH 00 und Nachaufbau (NA) BBCH 12-13, Schadorganismus: bis BBCH 11
/04-001 /04-002 Salate (LACSS), Endivien (CICEN)	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 2,6 l/ha in 300-400 l/ha Wasser, flache Einarbeitung (ca. 5 cm tief)	F	Schaderreger: BBCH 01-08 Pflanzkultur, vor dem Pflanzen, WP747
/04-003 /04-004 Rucola-Arten (NNNRA)	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 2 l/ha in 300-400 l/ha Wasser, flache Einarbeitung (ca. 5 cm tief)		
/04-005 Schnittlauch (ALLSC) Nutzung als frisches Kraut	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 2,5 l/ha in 300-400 l/ha Wasser	42	Kultur: vor dem Auflaufen, Stadium Schadorganismus: bis BBCH 11, WP747
/04-006 Schnittlauch (ALLSC) Nutzung als frisches Kraut	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 2,6 l/ha in 300-400 l/ha Wasser	42	Kultur: BBCH 12-15 Pflanzkultur, nach dem Anwachsen, Stadium Schadorganismus: bis BBCH 11, WP747
/04-007 Schnittlauch (ALLSC) Bulbenanzucht	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 2,6 l/ha in 300-400 l/ha Wasser	F	Kultur: BBCH 12-15, nach dem Anwachsen, Stadium Schadorganismus: bis BBCH 01-08, WP747
/04-012 Melisse (MLSOF) Verwendung von Blättern und Blüten, Nutzung als teeähnliches Erzeugnis	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 2,6 l/ha in 300-400 l/ha Wasser	56	Kultur: ab 2. Standjahr, vor dem Austrieb, Stadium Schadorganismus: bis BBCH 11, WP747

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!

Fortsetzung Stomp Aqua Indikation: Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter Ausgenommen: Acker-Hundskamille, Kamille-Arten, Klettenlabkraut), Gemeines Kreuzkraut, Franzosenkraut-Arten			
<i>Kultur(en)</i>	<i>Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit</i>	<i>Wartezeit (Tage)</i>	<i>Anwendungsgebiet/ Bemerkungen</i>
/04-013 Kümmel (CRYCA) Gewürzfenchel (FOEVD) Verwendung von Blättern und Blüten, Nutzung als teeähnliches Erzeugnis	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 2,6 l/ha in 300-400 l/ha Wasser	F	Kultur: BBCH 00-12 vor oder nach dem Auflaufen, Stadium Schadorganismus: bis BBCH 11, WP747
/04-014 /04-015 Johanniskraut (HYPSS) Verwendung von Blättern und Blüten	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 2,6 l/ha in 300-400 l/ha Wasser	56	Schadorganismus: bis BBCH 11, WP747 im Pflanzjahr, nach dem Anwachsen, bei 5-10 cm Neutrieb, und Kultur ab 2. Standjahr nach dem Austrieb bis BBCH 23
/04-016 /04-017 Echte Kamille (MATCH) Verwendung von Blättern und Blüten Nutzung als teeähnliches Erzeugnis	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 2,6 l/ha in 300-400 l/ha Wasser	56	Schadorganismus: bis BBCH 11, WP747 Nach dem Auflaufen, Herbst und Frühjahr bis BBCH 23
/03-005 Blattkohle (NNNKB) /03-009 Blumenkohle (NNNKL) /03-006 Kohlrabi (BRSOG), /03-007 Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) (NNNKO), /03-008 Rosenkohl (BRSOE)	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 2,6 l/ha in 300-400 l/ha Wasser, Verwendung einer Pflanzmaschine mit Räumvorrichtung zur Räumung des Herbizidfilms in der Pflanzreihe, keine Anwendung in frühem Anbau mit Abdeckvlies oder Abdeckfolie	F Kohlrabi: 21	Schadorganismus: bis BBCH 11, WP747, vor dem Pflanzen
/07-004 Meerrettich (ARWLA)	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 2,6 l/ha in 300-400 l/ha Wasser, beim Durchstoßen, vor dem Austrieb, nach dem Pflanzen	F	Schadorganismus: bis BBCH 11, WP747, Kultur: bis BBCH09

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!

Fortsetzung Stomp Aqua Indikation: Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter Ausgenommen: Acker-Hundskamille, Kamille-Arten, Klettenlabkraut), Gemeines Kreuzkraut, Franzosenkraut-Arten			
<i>Kultur(en)</i>	<i>Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit</i>	<i>Wartezeit (Tage)</i>	<i>Anwendungsgebiet/ Bemerkungen</i>
03-012 Dicke Bohne (VICFJ) /03-011 Stangenbohne (PHSVV) Hülsengemüse (frisch)	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 2,6 l/ha in 300-400 l/ha Wasser	F	Nach dem Auflaufen Schadorganismus: bis BBCH 11, WP747
/03-010 Feuerbohne (PHSCO), Stangenbohne (PHSVV) (Hülsenfrüchte trocken)	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 2,6 l/ha in 300 l/ha Wasser	F	
/03-013 Flaschenkürbis (LGNSI), Garten-Kürbis (CUUPE), Gurke (CUMSA), Melone (CUMME), Moschuskürbis (CUUMO), Patisson (CUUMP), Riesenkürbis (CUUMX), Zucchini (CUUPG) Anbau auf Mulchfolie	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 2,6 l/ha in 300-600 l/ha Wasser, Anwendungstechnik mit Abschirmung Anwendungstechnik Zwischenreihenbehandlung	F	Schadorganismus: bis BBCH 11, WP747, vor dem Auflaufen oder vor dem Pflanzen
/03-014 Zwiebelgemüse (NNNSZ),	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM: VA BBCH 00-14/ NA BBCH 10-14 je 1,3 l/ha in 300-400 l/ha Wasser, im Abstand von 2-8 Wochen, im Splittingverfahren	F	Schadorganismus: bis BBCH 11, WP747 Kultur: BBCH 00-14 VA BBCH 10-14 NA
/03-015 Zwiebelgemüse (NNNSZ),	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM: VA: 0,9 l/ha in 300 bis 400 l/ha Wasser BBCH 11: 0,8 l/ha in 300 bis 400 l/ha Wasser, BBCH 13 – 14: 0,9 l/ha in 300 bis 400 l/ha Wasser, im Abstand von 1-6 Wochen	F	Schadorganismus: bis BBCH 11, WP747

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!

Fortsetzung Stomp Aqua Indikation: Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter Ausgenommen: Acker-Hundskamille, Kamille-Arten, Klettenlabkraut), Gemeines Kreuzkraut, Franzosenkraut-Arten			
<i>Kultur(en)</i>	<i>Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit</i>	<i>Wartezeit (Tage)</i>	<i>Anwendungsgebiet/ Bemerkungen</i>
/03-003 /03-004 Grünkohl (BRSOC), /03-001 /03-002 Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) (NNNKO)	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 2,6 l/ha in 300-400 l/ha Wasser, keine Anwendung in frühem Anbau mit Abdeckvlies oder Abdeckfolie	F	Schadorganismus: bis BBCH 11, WP747, Kultur: bis BBCH16 nach dem Anwachsen, Saatkultur: BBCH12-16 nach dem Auflaufen

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4), NT145-1, NT146, NT170, NW607-2, NW706, NW800, SF275-EEGE, WP747, NT120, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

ORONDIS VIP (*Metalaxyl-M + Oxathiapiprolin*) Zulassungsnummer: 00B074-00 Zulassung bis 03.03.2028

<i>Kultur(en)</i>	<i>Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit</i>	<i>Wartezeit (Tage)</i>	<i>Anwendungsgebiet/ Bemerkungen</i>
/02-019 Kohlgemüse (BRSOX) ausgenommen Chinakohl und Kohlrabi	Freiland, Spritzen, max. 2x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,5 l/ha in 200-800 l/ha Wasser im Abstand von 7-10 Tagen	21	Falscher Mehltau (<i>Pseudoperonospora parasitica</i>) BBCH 12-49, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4), NW470, NG371.0933, SF275-10GE, NW642-1, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!

Kultur(en)	Aufwandmenge Anwendungshäufigkeit	Wartezeit (Tage)	Anwendungsgebiet/ Bemerkungen
/04-003 Buschbohne (PHSVN) /04-002 Erbse (PIBST) Nutzung ohne Hülse /04-002 Zuckerbse (PIBSZ)	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,2 l/ha in 400-600 l/ha Wasser	7	Beißende Insekten, Blattläuse (Aphidae) ab BBCH 59, bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen
/04-005 Hülsengemüse (NNNLG) Verwendung als Trockengemüse	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,2 l/ha in 400-600 l/ha Wasser	14	Beißende Insekten, Blattläuse (Aphidae) bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen
/04-007 Melone (CUMME)	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,2 l/ha in 400-600 l/ha Wasser	14	Beißende Insekten, Blattläuse (Aphidae) ab BBCH 69, bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen
/04-003 Stangenbohne (PHSVN)	Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM: bis 50 cm: 0,1 l/ha in 400-600 l/ha Wasser, 50-125cm: 0,15l/ha in 600-900l/ha Wasser, über 125 cm: 0,2 l/ha in 900-1200l/ha Wasser	7	Beißende Insekten, Blattläuse (Aphidae) ab BBCH 59, bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/ Schadorganismen

Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4)/ NB6623 (B2), NT103-1, NW607-2, NW468, NW262, NW264, SB193, SB199, SF1891, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.