

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
<i>Wirkstoff(e)</i>	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
<i>Wirkungsmechanismen</i>	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	<i>Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen</i>	
Bienenschutz	<i>Wiederbetretungsauflagen</i>	
1a. Jungpflanzen (Freiland)		
Akarizide und Insektizide		
Spruzit Neu	Beißende Insekten	F
<i>Pyrethrine</i>	6 l/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 5 Tage	
<i>Rapsöl</i>		
<i>IRAC-Code 3A</i>	Stellflächen (Freiland), Jungpflanzen in Anzuchtgefäßen; bei Befallsbeginn bzw.	
<i>IRAC-Code UNE</i>	Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen; Das eingesetzte Rapsöl muss Lebensmittelqualität haben (VH319); Schäden bei Sonneneinstrahlung nach Anwendung möglich (WP732)	
024780-60	NW607-1 (75% 15m, 90% 10m)	
31.03.2027	SF245-02	
B4, NB6641, NN410		
Raptol HP	Blattläuse	F
<i>Pyrethrine</i>	0,6 l/ha; max. 2/2; Abstand: 5 Tage	
<i>IRAC-Code 3A</i>	Jungpflanzenanzucht auf Stellflächen (FX); spritzen; Stadium Kultur: BBCH 11-16; Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen	
00A122-60	NW605-1 (50% 5m, 75% *, 90% *); NW606 (5m); NW701	
30.04.2029	SF245-02	
B2, NB6621		
Raptol HP	Freifressende Schmetterlingsraupen	F
<i>Pyrethrine</i>	0,6 l/ha; max. 2/2; Abstand: 5 Tage	
<i>IRAC-Code 3A</i>	Jungpflanzenanzucht auf Stellflächen (FX); spritzen; Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen; Stadium, Kultur: BBCH 11-16	
00A122-60	NW605-1 (50% 5m, 75% *, 90% *); NW606 (5m); NW701	
30.04.2029	SF245-02	
B2, NB6621		
Spruzit Neu	Saugende Insekten	F
<i>Pyrethrine</i>	6 l/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 7 Tage	
<i>Rapsöl</i>		
<i>IRAC-Code 3A</i>	Jungpflanzen; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster	
<i>IRAC-Code UNE</i>	Symptome/Schadorganismen; Das eingesetzte Rapsöl muss Lebensmittelqualität haben (VH319); Schäden bei Sonneneinstrahlung nach Anwendung möglich (WP732)	
024780-60	NW607-1 (75% 15m, 90% 10m)	
31.03.2027	SF245-02	
B4, NB6641, NN410		

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
<i>Wirkstoff(e)</i>	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
<i>Wirkungsmechanismen</i>	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	<i>Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen</i>	
Bienenschutz	<i>Wiederbetretungsauflagen</i>	
1a. Jungpflanzen (Freiland)		
Akarizide und Insektizide		
Raptol HP	Thripse	F
<i>Pyrethrine</i>	0,6 l/ha; max. 2/2; Abstand: 5 Tage	
<i>IRAC-Code 3A</i>	Jungpflanzenanzucht auf Stellflächen (FX); spritzen; Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen; Stadium Kultur: BBCH 11-16	
00A122-60	<i>NW605-1 (50% 5m, 75% *, 90% *); NW606 (5m); NW701</i>	
30.04.2029	<i>SF245-02</i>	
B2, NB6621		

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
<i>Wirkstoff(e)</i>	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
<i>Wirkungsmechanismen</i>	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	<i>Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen</i>	
Bienenschutz	<i>Wiederbetretungsauflagen</i>	

1b. Jungpflanzen (Gewächshaus)

Akarizide und Insektizide

Spruzit Neu	Beißende Insekten, Saugende Insekten	F
<i>Pyrethrine</i>	6 l/ha; max. 4/4; Abstand: mind. 7 Tage	
<i>Rapsöl</i>		
<i>IRAC-Code 3A</i>	Gewächshaus; Jungpflanzen; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster	
<i>IRAC-Code UNE</i>	Symptome/Schadorganismen; Das eingesetzte Rapsöl muss Lebensmittelqualität	
	haben (VH319); Schäden bei Sonneneinstrahlung nach Anwendung möglich (WP732)	
024780-60		
31.03.2027	SF245-02	
B4, NB6641, NN410		
Neudosan Neu	Blattläuse	F
<i>Fettsäure-Kaliumsalze</i>	Pflanzengröße bis 50cm: 18 l/ha; max. 5/5; Abstand: 5-7 Tage	
<i>(Kali-Seife)</i>		
<i>IRAC-Code UN</i>	Jungpflanzenanzucht (Gewächshaus); spritzen; behandeln bis zur sichtbaren	
	Benetzung; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster	
	Symptome/Schadorganismen; Bei Sonneneinstrahlung nach Anwendung Schäden an	
	Kulturpflanzen möglich (WP732)	
034207-60		
01.12.2027	SF245-02	
B4, NB6641, NN410		
Raptol HP	Blattläuse	F
<i>Pyrethrine</i>	0,6 l/ha; max. 2/2; Abstand: 7 Tage	
<i>IRAC-Code 3A</i>	Jungpflanzenanzucht; spritzen; Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster	
	Symptome/Schadorganismen; Stadium Kultur: BBCH 11-16; Anwendung nur in	
	Gewächshäusern bzw. Folientunneln, alle Seitenwände müssen während Anwendung	
	geschlossen sein (NZ115)	
00A122-60		
30.04.2029	SF245-02	
B2, NB6621		
Raptol HP	Freifressende Schmetterlingsraupen	F
<i>Pyrethrine</i>	0,6 l/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 7 Tage	
<i>IRAC-Code 3A</i>	Jungpflanzenanzucht; spritzen; Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster	
	Symptome/Schadorganismen; Stadium Kultur: BBCH 11-16; Anwendung nur in	
	Gewächshäusern bzw. Folientunneln, alle Seitenwände müssen während Anwendung	
	geschlossen sein (NZ115)	
00A122-60		
30.04.2029	SF245-02	
B2, NB6621		

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
<i>Wirkstoff(e)</i>	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
<i>Wirkungsmechanismen</i>	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	<i>Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen</i>	
Bienenschutz	<i>Wiederbetretungsauflagen</i>	

1b. Jungpflanzen (Gewächshaus)

Akarizide und Insektizide

Raptol HP	Thripse	F
<i>Pyrethrine</i>	0,6 l/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 7 Tage	
<i>IRAC-Code 3A</i>	Jungpflanzenanzucht; spritzen; Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen; Stadium Kultur: BBCH 11-16; Anwendung nur in Gewächshäusern bzw. Folientunneln, alle Seitenwände müssen während Anwendung geschlossen sein (NZ115)	
00A122-60		
30.04.2029	<i>SF245-02</i>	
B2, NB6621		
Gnatrol SC	Trauermücken	F
<i>Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (Serotyp H-14) AM 65-52</i>	10 ml/m ² ; max. 3/3; Abstand: 4-7 Tage	
<i>IRAC-Code 11A</i>	Jungpflanzenanzucht (Gewächshaus); gießen; vor der Saat und nach dem Auflaufen (2. + 3. Behandlung); Stadium Kultur: bis BBCH 14; Stadium Schadorg.: ab Larve	
008500-00		
15.08.2027	<i>EO005-2</i>	
B4, NB6641		

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
Wirkstoff(e)	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
Wirkungsmechanismen	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen	
Bienenschutz	Wiederbetretungsauflagen	
1b. Jungpflanzen (Gewächshaus)		
Fungizide		
Serifel	Botrytis cinerea	F
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Stamm MBI 600 FRAC-Code BM02	0,5 kg/ha; max. 3/6; Abstand: 5 Tage	
008934-00 16.09.2027 B4, NB6641	Jungpflanzenanzucht (Gewächshaus); bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: BBCH 10-16; nur zur Befallsminderung und bei schwachem Befallsdruck	
	SF245-02	
Previcur Energy	Pythium-Arten (Pythium spp.)	F
Fosetyl Propamocarb FRAC-Code P07 FRAC-Code 28	3 ml/m ² ; max. 2/2; Abstand: 7-10 Tage	
006219-00 31.10.2027 B4, NB6641	Jungpflanzenanzucht (Gewächshaus); Jungpflanzen; gießen; nach der Saat	
	EO005-1	
Serifel	Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.)	F
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> Stamm MBI 600 FRAC-Code BM02	0,5 kg/ha; max. 3/6; Abstand: 5 Tage	
008934-00 16.09.2027 B4, NB6641	Jungpflanzenanzucht (Gewächshaus); bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: BBCH 10-16; nur zur Befallsminderung und bei schwachem Befallsdruck	
	SF245-02	

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
Wirkstoff(e)	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
Wirkungsmechanismen	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen	
Bienenschutz	Wiederbetretungsauflagen	
Freiland		
Akarizide und Insektizide		
Karate Zeon	Beißende Insekten	F
<i>lambda-Cyhalothrin</i>	0,075 l/ha; max. 2/2; Abstand: 10-14 Tage	
IRAC-Code 3A	Ertragsanlagen; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen; Stadium Kultur: nach der Ernte	
024675-00	NW607 (50% 10m, 75% 5m, 90% 5m), NT108	
30.09.2026	SF1891	
B4, NB6641, NB6623, NN410		
Karate Zeon	Beißende Insekten	F
<i>lambda-Cyhalothrin</i>	0,075 l/ha; max. 2/2; Abstand: 10-14 Tage	
IRAC-Code 3A	Junganlagen; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen; Erntegut nicht verzehren (VV600)	
024675-00	NW607 (50% 10m, 75% 5m, 90% 5m), NT108	
30.09.2026	SF1891	
B4, NB6641, NB6623, NN410		
Spruzit Neu	Beißende Insekten	F
<i>Pyrethrine</i>	Pflanzengröße bis 50cm: 6 l/ha, 50-125cm: 9 l/ha, über 125cm: 12 l/ha; max. 2/2;	
<i>Rapsöl</i>	Abstand: mind. 7 Tage	
IRAC-Code 3A	spritzen; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen;	
IRAC-Code UNE	Das eingesetzte Rapsöl muss Lebensmittelqualität haben (VH319); Schäden bei Sonneneinstrahlung nach Anwendung möglich (WP732)	
024780-60	NW607-1 (90% 20m), NT101	
31.03.2027	SF245-02	
B4, NB6641, NN410		
Spruzit Neu	Beißende Insekten (ausgenommen: Minierfliegen, verstecktfressende Schmetterlingsraupen)	3 Tage
<i>Pyrethrine</i>	Pflanzengröße bis 50cm: 6 l/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 7 Tage	
<i>Rapsöl</i>		
IRAC-Code 3A	nur Grünspargel; Jung- und Ertragsanlagen; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome; Stadium Kultur: ab BBCH 09; Das eingesetzte Rapsöl muss Lebensmittelqualität haben (VH319); Schäden bei Sonneneinstrahlung nach Anwendung möglich (WP732)	
IRAC-Code UNE		
024780-60	NW607-1 (75% 15m, 90% 10m)	
31.03.2027	SF245-02	
B4, NB6641, NN410		

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
<i>Wirkstoff(e)</i>	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
<i>Wirkungsmechanismen</i>	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	<i>Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen</i>	
Bienenschutz	<i>Wiederbetretungsauflagen</i>	
Freiland		
Akarizide und Insektizide		
NeemAzal-T/S	Beißende Insekten, Saugende Insekten	F
<i>Azadirachtin</i>	3 l/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 7 Tage	
<i>IRAC-Code UN</i>	Ertrags- und Junganlagen; spritzen; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen, nach der Ernte	
024436-00	<i>NW609-1 (5m)</i>	
31.01.2028	<i>SF245-01</i>	
B4, NB6641		
Eradicoat Max	Blattläuse	1 Tag
<i>Maltodextrin</i>	60 l/ha (max. 20 ml Produkt/L Wasser); max. 20/20; Abstand: 3 Tage; Reduzierter Wasseraufwand führt zur Reduktion der Aufwandmenge u. kann die Wirksamkeit verringern	
<i>IRAC-Code UN</i>	spritzen; nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf oder nach Befallsbeginn	
00A541-00	<i>SF245-02</i>	
28.02.2027		
B2, NB6621, NB506		
Micula	Blattläuse	F
<i>Rapsöl</i>	Pflanzengröße bis 50cm: 12 l/ha, 50-125cm: 18 l/ha, über 125cm: 24 l/ha; max. 3/3; Abstand: 7-10 Tage	
<i>IRAC-Code UNE</i>	spritzen; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	
043743-00	<i>NW642-1</i>	
31.12.2027	<i>SF245-01</i>	
B4, NB6641		
Mospilan SG	Blattläuse	F
<i>Acetamiprid</i>	0,25 kg/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 7 Tage; Keine Anwendung in Kombination mit Netzmitteln (VV553)	
<i>IRAC-Code 4A</i>	spritzen; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	
005655-00	<i>NW605-1 (50% 5m, 75%*, 90%*), NW606 (5m), NW706, NT103</i>	
28.02.2027	<i>EO005-1, SF245-01</i>	
B4, NB6641, NB6612, NN410		

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
<i>Wirkstoff(e)</i>	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
<i>Wirkungsmechanismen</i>	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	<i>Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen</i>	
Bienenschutz	<i>Wiederbetretungsauflagen</i>	
Freiland		
Akarizide und Insektizide		
Neudosan Neu	Blattläuse (ausgenommen: Grüne Salatblattlaus/ Große Johannisbeerblattlaus)	F
<i>Fettsäure-Kaliumsalze (Kali-Seife)</i>	Pflanzengröße bis 50cm: 18 l/ha, 50-125cm: 27 l/ha; max. 5/5; Abstand: 5-7 Tage	
<i>IRAC-Code UN</i>	spritzen; behandeln bis zur sichtbaren Benetzung; bei Befallsbeginn und bei Befall unter Beachtung der Schadensschwelle; Stadium Kultur: für kopfbildende Salate nur bis BBCH 41	
034207-60	NW605-1 (50% 5m, 75% 5m, 90%*), NW606 (10m), NW706	
01.12.2027	SF245-02	
B4, NN410		
Eradicoat/Kantaro	Blattläuse, Weiße Fliegen	F
<i>Maltodextrin</i>	37,5 l/ha; max. 20/20; Abstand: mind. 3 Tage; max. Anwendungskonz. darf 25 ml/l Wasser nicht überschreiten	
<i>IRAC-Code UN</i>	spritzen; bei Befallsbeginn; nur zur Befallsminderung; Schäden an Blüten möglich (WP746)	
00A156-00	NW642-1	
28.02.2027	SF245-02	
B2, NB6621, NB506		
Karate Zeon	Erdräupen	F
<i>lambda-Cyhalothrin</i>	0,075 l/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 10 Tage	
<i>IRAC-Code 3A</i>	Ertragsanlagen; nach der Ernte und bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	
024675-00	NW607-1 (50% 10m, 75% 5m, 90% 5m), NT108	
30.09.2026	SF1891	
B4, NB6641, NB6623, NN410		
Karate Zeon	Erdräupen	F
<i>lambda-Cyhalothrin</i>	0,075 l/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 10 Tage	
<i>IRAC-Code 3A</i>	Junganlagen; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen; Stadium Kultur: ab BBCH 11	
024675-00	NW607-1 (50% 10m, 75% 5m, 90% 5m), NT108	
30.09.2026	SF1891	
B4, NB6641, NB6623, NN410		

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
Wirkstoff(e)	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
Wirkungsmechanismen	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen	
Bienenschutz	Wiederbetretungsauflagen	
Freiland		
Akarizide und Insektizide		
XenTari	Eulenarten (Noctuidae)	9 Tage
<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>subsp. aizawai</i> Stamm ABTS-1857	1 kg/ha; max. 5/5; Abstand: 5-7 Tage	
IRAC-Code 11A	spritzen; nach Befallsbeginn oder ab Warndienstaufruf, ab Schlüpfen der ersten Larven, Stadium Kultur: ab BBCH 11; Stadium Schadorg.: Larvenstadium L1-L2; Nicht mit UV-Stabilisatoren anwenden (VA302)	
024426-00	NW642-1	
30.04.2027	SF245-01	
B4, NB6641		
DiPel DF	Freifressende Schmetterlingsraupen	F
<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>subsp. kurstaki</i> Stamm ABTS-351 (Stamm HD-1)	1 kg/ha; max. 8/8; Abstand: mind. 7 Tage	
IRAC-Code 11A	spritzen; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen; Stadium Schadorg.: ab Larvenstadium L1	
00A304-00	NW642-1	
15.08.2027	SF245-02	
B4, NB6641		
Raptol HP	Freifressende Schmetterlingsraupen	Grünspargel: 3 Tage, Spargel: F
<i>Pyrethrine</i>	max. 1,2 l/ha (pro Behandl.); max. 2,4 l/ha (pro Kalenderj.); max. 0,6 l/10000 m² LWF; max. 2/2; Abstand: mind. 5 Tage	
IRAC-Code 3A	spritzen; Stadium Kultur: BBCH 11-34; Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen	
00A122-60	NW605-1 (50% 10m, 75% 5m, 90% 5m); NW606 (15m); NW701	
30.04.2029	SF245-02	
B2, NB6621		

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
Wirkstoff(e)	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
Wirkungsmechanismen	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen	
Bienenschutz	Wiederbetretungsauflagen	
Freiland		
Akarizide und Insektizide		
XenTari	Freifressende Schmetterlingsraupen (ausgenommen Eulenarten (Noctuidae))	9 Tage
<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>subsp. aizawai</i> Stamm ABTS-1857	0,6 kg/ha; max. 5/5; Abstand: 5-7 Tage	
IRAC-Code 11A	spritzen; nach Befallsbeginn oder ab Warndienstaufruf, ab Schlüpfen der ersten Larven, Stadium Kultur: ab BBCH 11; Stadium Schadorg.: Larvenstadium L1-L2; Nicht mit UV-Stabilisatoren anwenden (VA302)	
024426-00	NW642-1	
30.04.2027	SF245-01	
B4, NB6641		
Dipel ES	Freifressende Schmetterlingsraupen (ausgenommen: Eulenarten (Noctuidae))	F
<i>Bacillus thuringiensis</i> <i>subsp. kurstaki</i> Stamm ABTS-351 (Stamm HD-1)	0,3 l/ha; max. 2/2; Abstand: 5-7 Tage	
IRAC-Code 11A	spritzen; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen; Stadium Kultur: ab BBCH 11; Nicht mit UV-Stabilisatoren anwenden (VA302)	
024080-00	NW642-1	
15.08.2027	SF245-02	
B4, NB6641		
Raptol HP	Käfer	Grünspargel: 3 Tage, Spargel: F
<i>Pyrethrine</i>	max. 1,2 l/ha (pro Behndl.); max. 2,4 l/ha (pro Kalenderj.); max. 0,6 l/10000 m ² LWF; max. 2/2; Abstand: mind. 5 Tage	
IRAC-Code 3A	spritzen; Stadium Kultur: BBCH 11-34; Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen	
00A122-60	NW605-1 (50% 10m, 75% 5m, 90% 5m); NW606 (15m); NW701	
30.04.2029	SF245-02	
B2, NB6621		

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
<i>Wirkstoff(e)</i>	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
<i>Wirkungsmechanismen</i>	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	<i>Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen</i>	
Bienenschutz	<i>Wiederbetretungsauflagen</i>	
Freiland		
Akarizide und Insektizide		
Spruzit Neu	Saugende Insekten	3 Tage
<i>Pyrethrine</i>	Pflanzengröße bis 50cm: 6 l/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 7 Tage	
<i>Rapsöl</i>		
<i>IRAC-Code 3A</i>	nur Grünspargel; Jung- und Ertragsanlagen; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden	
<i>IRAC-Code UNE</i>	erster Symptome; Stadium Kultur: ab BBCH 09; Das eingesetzte Rapsöl muss	
	Lebensmittelqualität haben (VH319); Schäden bei Sonneneinstrahlung nach Anwendung	
	möglich (WP732)	
024780-60	<i>NW607-1 (75% 15m, 90% 10m)</i>	
31.03.2027	<i>SF245-02</i>	
B4, NB6641, NN410		
BENEVIA	Spargelfliege	F
<i>Cyantraniliprole</i>	750 ml/ha; max. 1/1	
<i>IRAC-Code 28</i>	(Ertragsanlagen); spritzen, Bandbehandlung (max. 20% der Fläche behandeln,	
	Mittelaufwand/ha bezieht sich auf die tatsächlich zu behandelnde Fläche in der Reihe o.	
	im Band, NG722); nach dem Stechen und bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster	
	Symptome/Schadorganismen, späteste Behandlung 3 Wochen vor dem zu erwartenden	
	Blühbeginn; Stadium Kultur: BBCH 09-55; Anw. nur erlaubt wenn auf derselben Fläche	
	im vorhergehenden Jahr kein Mittel mit Cyantraniliprole ausgebracht wurde	
	(NG372.1182)	
00A175-00	<i>NW605-2 (50% 5m, 75% 5m, 90% *), NW606 (10m), NT108-1</i>	
14.09.2027	<i>SF245-02</i>	
B1, NB6611		
BENEVIA	Spargelfliege	F
<i>Cyantraniliprole</i>	750 ml/ha; max. 1/1	
<i>IRAC-Code 28</i>	(Junganlagen); spritzen, Bandbehandlung (max. 20% der Fläche behandeln,	
	Mittelaufwand/ha bezieht sich auf die tatsächlich zu behandelnde Fläche in der Reihe o.	
	im Band, NG722); nach dem Austrieb und bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster	
	Symptome/Schadorganismen, späteste Behandl. 3 Wochen vor dem zu erwartenden	
	Blühbeginn; Stadium Kultur: BBCH 09-55; Anw. nur erlaubt wenn auf derselben Fläche	
	im vorhergehenden Jahr kein Mittel mit Cyantraniliprole ausgebracht wurde	
	(NG372.1182); Erntegut nicht verzehren (VV600)	
00A175-00	<i>NW605-2 (50% 5m, 75% 5m, 90% *), NW606 (10m), NT108-1</i>	
14.09.2027	<i>SF245-02</i>	
B1, NB6611		

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
<i>Wirkstoff(e)</i>	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
<i>Wirkungsmechanismen</i>	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	<i>Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen</i>	
Bienenschutz	<i>Wiederbetretungsauflagen</i>	
Freiland		
Akarizide und Insektizide		
Mospilan SG	Spargelhähnchen bzw. Spargelkäfer	F
<i>Acetamiprid</i>	0,325 kg/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 7 Tage; Keine Anwendung in Kombination mit Netzmitteln (VV553)	
<i>IRAC-Code 4A</i>	spritzen; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	
005655-00	NW605-1 (50% 5m, 75% 5m, 90%*), NW606 (5m), NW706, NT103	
28.02.2027	EO005-1, SF245-01	
B4, NB6641, NB6612, NN410		
Eradicoat/Kantaro	Spinnmilben	F
<i>Maltodextrin</i>	37,5 l/ha; max. 20/20; Abstand: mind. 3 Tage; max. Anwendungskonz. darf 25 ml/l Wasser nicht überschreiten	
<i>IRAC-Code UN</i>	spritzen; bei Befallsbeginn; nur zur Befallsminderung; Schäden an Blüten möglich (WP746)	
00A156-00	NW642-1	
28.02.2027	SF245-02	
B2, NB6621, NB506		

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
<i>Wirkstoff(e)</i>	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
<i>Wirkungsmechanismen</i>	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	<i>Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen</i>	
Bienenschutz	<i>Wiederbetretungsaufgaben</i>	
Freiland		
Fungizide		
Polyversum	Auflaufkrankheiten	F
<i>Pythium oligandrum M1</i>	0,05 kg/ha; max. 1/1	
FRAC-Code NC	Saatgutbehandlung; vor der Saat; nur zur Befallsminderung	
008470-00		
30.04.2025	SF245-01	
B4, NB6641	Abverkaufsfrist: 30.10.2025, Aufbrauchfrist: 30.10.2026, Neuzulassung mit Zul.-Nr.: 028470-00	
SWITCH	Bodenpilze	F
<i>Cyprodinil</i>	15 Minuten tauchen 0,2%; max. 1/1; Anwendungs- u. Restflüssigkeiten über	
<i>Fludioxonil</i>	Auffangsysteme fachgerecht gemäß KrWG entsorgen (NZ114)	
FRAC-Code 9	Basispflanzgut; tauchen; vor dem Pflanzen	
FRAC-Code 12		
034419-00		
31.12.2026	SF1891	
B4, NB6641		
Luna Sensation	Botrytis cinerea	F
<i>Fluopyram</i>	0,8 l/ha; max. 2/2; Abstand: 10 Tage	
<i>Trifloxystrobin</i>		
FRAC-Code 7	spritzen; nach der Ernte; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Syptome	
FRAC-Code 11		
007214-00	NW607-2 (50% 15m, 75% 10m, 90% 5m)	
30.06.2027	SF1891, SF245-02	
B4, NB6641		
Signum	Botrytis cinerea	F
<i>Boscalid</i>	1,5 kg/ha; max. 2/2; Abstand: 14-21 Tage	
<i>Pyraclostrobin</i>		
FRAC-Code 7	Ertrags- und Junganlagen; spritzen; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der	
FRAC-Code 11	ersten Symptome; Stadium Kultur: ab BBCH 69	
025483-00	NW605 (50% 5m, 75% 5m, 90%*), NW606 (5m), NW604	
15.09.2026	SF245-02	
B4, NB6641		

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
<i>Wirkstoff(e)</i>	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
<i>Wirkungsmechanismen</i>	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	<i>Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen</i>	
Bienenschutz	<i>Wiederbetretungsauflagen</i>	
Freiland		
Fungizide		
VitiSan	Botrytis cinerea	F
<i>Kaliumhydrogencarbonat</i>	5 kg/ha; max. 6/6; Abstand: 5-7 Tage	
<i>FRAC-Code NC</i>	Ertragsanlagen; spritzen; nach der Ernte; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome; nur zur Befallsminderung; Einstufung des BVL als Mittel mit geringem Risiko	
027593-00	NW642-1	
31.10.2037	SF245-02	
B4, NB6641		
VitiSan	Botrytis cinerea	F
<i>Kaliumhydrogencarbonat</i>	5 kg/ha; max. 6/6; Abstand: 5-7 Tage	
<i>FRAC-Code NC</i>	Junganlagen; spritzen; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome; nur zur Befallsminderung; Einstufung des BVL als Mittel mit geringem Risiko	
027593-00	NW642-1	
31.10.2037	SF245-02	
B4, NB6641		
Vacciplant	Botrytis cinerea, Echter Mehltau (Podosphaera aphanis)	1 Tag
<i>Laminarin</i>	1,5 l/ha; max. 7/7; Abstand: 7 Tage	
<i>FRAC-Code P04</i>	spritzen; Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: BBCH 12-93	
00B457-00	NW642-1	
28.02.2034	SF245-02	
B4, NB6641		
Kenja	Botrytis cinerea, Laubkrankheit (Stemphylium vesicarium)	F
<i>Isofetamid</i>	1 l/ha; max. 2/2; Abstand: 14 Tage	
<i>FRAC-Code 7</i>	spritzen; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: BBCH 35-87; Keine Anwendung auf gedrahten Flächen zwischen 1. Nov. und 15. Mrz. (NG403)	
008662-00	NW642-1	
15.09.2027	SF245-02	
B4, NB6641		
SWITCH	Botrytis cinerea, Laubkrankheit (Stemphylium vesicarium)	F
<i>Cyprodinil</i>	1 kg/ha; max. 1/1	
<i>Fludioxonil</i>		
<i>FRAC-Code 9</i>	spritzen; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome; Stadium Kultur:	
<i>FRAC-Code 12</i>	BBCH 55-81	
034419-00	NW605-1 (50% 10m, 75% 5m, 90% 5m), NW606 (15m), NW706, NT102	
31.12.2026	SF1891	
B4, NB6641		

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
Wirkstoff(e)	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
Wirkungsmechanismen	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen	
Bienenschutz	Wiederbetretungsauflagen	
Freiland		
Fungizide		
SWITCH	Botrytis cinerea, Laubkrankheit (Stemphylium vesicarium)	F
Cyprodinil	0,7 kg/ha; max. 2/2; Abstand: 10-14 Tage	
Fludioxonil		
FRAC-Code 9	spritzen; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome; Stadium Kultur:	
FRAC-Code 12	BBCH 55-81	
034419-00	NW605-1 (50% 10m, 75% 5m, 90% 5m), NW606 (15m), NW706, NT102	
31.12.2026	SF1891	
B4, NB6641		
Serenade ASO	Botrytis-Arten (Botrytis spp.), Sclerotium spp.	1 Tag
Bacillus	8 l/ha; max. 6/6; Abstand: 5 Tage	
amyloliquefaciens		
Stamm QST 713		
(vormals B. subtilis)		
FRAC-Code BM02	spritzen; bei Befallsgefahr; nur zur Befallsminderung; Stadium Kultur: BBCH 12-49	
007918-00	NW642-1	
15.08.2027	SF245-02	
B4, NB6641		
Belanty	Botrytis-Arten (Botrytis spp.), Spargelrost (Puccinia asparagi), Stemphylium sp.	F
Mefentrifluconazole	1,5 l/ha (max. für die Kultur bzw. das Jahr: 4,5 l/ha); max. 3/3; Abstand: 14 Tage	
FRAC-Code 3	spritzen; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: BBCH 51-89	
00A480-00	NW609-2 (5m)	
20.03.2030	SF245-02, SF275-EEGE	
B4, NB6641		
UPSIDE	Falsche Mehltupilze (Peronosporaceae)	1 Tag
ABE-IT 56	6 l/ha; max. 8/8; Abstand: 7 Tage	
FRAC-Code BM02	spritzen; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: BBCH 13-48	
00A891-00	NW642-1	
20.05.2035	SF245-02	
B4, NB6641		

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
Wirkstoff(e)	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
Wirkungsmechanismen	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen	
Bienenschutz	Wiederbetretungsauflagen	
Freiland		
Fungizide		
Previcur Energy	Falsche Mehltupilze (Peronosporaceae)	21 Tage
Fosetyl Propamocarb	2,5 l/ha; max. 1/1	
	spritzen; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden erster Symptome; Stadium Kultur: BBCH 12-18	
	NW642-1	
15.09.2026	SF245-02, SF275-EEGE, SF276-42GE	
B4, NB6641	Zulassung nach Art.53 VO (EG) Nr.1107/2009 vom 19.05.2026-15.09.2026	
AZOFIN	Laubkrankheit (Stemphylium botryosum)	F
Azoxystrobin	1 l/ha; max. 2/2; Abstand: 8-12 Tage	
FRAC-Code 11	spritzen; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	
00A065-00	NW605-2 (50% 5m, 75%*, 90%*), NW606 (5m), NW706	
31.05.2028	SF245-02	
B4, NB6641		
Chamane	Laubkrankheit (Stemphylium botryosum)	F
Azoxystrobin	1 l/ha; max. 2/2; Abstand: 8-12 Tage	
FRAC-Code 11	spritzen; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome; Stadium Kultur: BBCH 51-91; Keine Anwendung auf drainierten Flächen (NG405)	
008316-00	NW605-1 (50% 5m, 75% 5m, 90%*), NW606 (5m), NW706	
31.05.2028	SF245-02	
B4, NB6641		
Cuprozin progress	Laubkrankheit (Stemphylium botryosum)	F
Kupferhydroxid	2 l/ha; max. 6/6; Abstand: 7-14 Tage; bei niedrigerer Dosierung kann max. Behandlungsanzahl erhöht werden, sofern Gesamtmittelaufwand eingehalten wird; max. 3.000g Reinkupfer/ha/Jahr (NT620-1)	
FRAC-Code M01	spritzen; nach der Ernte; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: BBCH 31-93	
006895-00	NW605-1 (50% 5m, 75% 5m, 90%*), NW606 (10m)	
30.09.2026	SF245-02	
B4, NB6641		

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
Wirkstoff(e)	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
Wirkungsmechanismen	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen	
Bienenschutz	Wiederbetretungsauflagen	
Freiland		
Fungizide		
Delan WG	Laubkrankheit (<i>Stemphylium botryosum</i>)	F
<i>Dithianon</i>	0,75 kg/ha; max. 3/3; Abstand: 7-10 Tage	
FRAC-Code M09	Ertrags- und Junganlagen; spritzen; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: ab BBCH 51; Keine Anwendung mit handgeführten Geräten im Freiland (VA263-1)	
024424-00	NW605-2 (50% 10m, 75% 5m, 90% 5m), NW606 (15m), NW706	
31.01.2028	SF245-02, SF275-EV	
B4, NB6641		
Delan WG	Laubkrankheit (<i>Stemphylium botryosum</i>)	F
<i>Dithianon</i>	0,8 kg/ha; max. 3/3; Abstand: 7-10 Tage	
FRAC-Code M09	Ertrags- und Junganlagen; spritzen; bei Befallsgefahr bzw. nach Warndiensthinweis; Stadium Kultur: ab BBCH 51	
004424-00	NW604, NW605 (50% 5m, 75% 5m, 90%*), NW606 (10m)	
31.08.2025	SF1891	
B4, NB6641	Abverkaufsfrist: 28.02.2026, Aufbrauchfrist: 28.02.2027, Neuzulassung mit Zul.-Nr.: 024424-00	
Kumar	Laubkrankheit (<i>Stemphylium botryosum</i>)	F
<i>Kaliumhydrogencarbonat</i>	3 kg/ha; max. 6/6; Abstand: 7-10 Tage	
FRAC-Code NC	spritzen; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: BBCH 39-93	
007547-00	NW642-1	
31.08.2026	SF245-01	
B4, NB6641		
Kumar	Laubkrankheit (<i>Stemphylium botryosum</i>)	F
<i>Kaliumhydrogencarbonat</i>	3 kg/ha; max. 6/6; Abstand: 7-10 Tage	
FRAC-Code NC	spritzen; Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: BBCH 39-93; Einstufung des BVL als Mittel mit geringem Risiko	
027547-00	NW642-1	
31.10.2037	SF245-02	
B4, NB6641		
Kumulus WG	Laubkrankheit (<i>Stemphylium botryosum</i>)	F
<i>Schwefel</i>	3,2 kg/ha; max. 8/8; Abstand: 7-10 Tage	
FRAC-Code M02	Ertrags- und Junganlagen; spritzen; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: ab BBCH 51	
052273-00	NW609-1 (5m)	
31.07.2028	SF245-01	
B4, NB6641		

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
<i>Wirkstoff(e)</i>	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
<i>Wirkungsmechanismen</i>	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	<i>Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen</i>	
Bienenschutz	<i>Wiederbetretungsauflagen</i>	
Freiland		
Fungizide		
ORTIVA	Laubkrankheit (<i>Stemphylium botryosum</i>)	F
<i>Azoxystrobin</i>	1 l/ha; max. 2/2; Abstand: 12 Tage	
<i>FRAC-Code 11</i>	spritzen; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome; Stadium Kultur: BBCH 55-89; Keine Anwendung auf drainierten Flächen (NG405); Ausreichende Bekämpfung nicht in allen Fällen zu erwarten ggf. anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden (WW750, WW764)	
034560-00	NW605-2 (50% 5m, 75% 5m, 90% *), NW606 (10m), NW706	
31.05.2028	SF245-02	
B4, NB6641		
SCORE	Laubkrankheit (<i>Stemphylium botryosum</i>)	F
<i>Difenoconazol</i>	0,4 l/ha; max. 1/1	
<i>FRAC-Code 3</i>	spritzen; nach der Ernte, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	
024353-00	NW604, NW605 (50% 5m, 75%*, 90%*), NW606 (5m)	
15.03.2027	SF245-02	
B4, NB6641		
Pablo	Laubkrankheit (<i>Stemphylium botryosum</i>) Spargelrost (<i>Puccinia asparagi</i>)	F
<i>Azoxystrobin</i>	1 l/ha; max. 2/2; Abstand: 10 Tage	
<i>FRAC-Code 11</i>	spritzen, bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome; Stadium Kultur: BBCH 41-89	
00B003-00	NW605-1 (50% 5m, 75% 5m, 90% *), NW606 (5m), NW706	
31.05.2028	SF245-02	
B4, NB6641		
AZOSHY	Laubkrankheit (<i>Stemphylium botryosum</i>), Spargelrost (<i>Puccinia asparagi</i>)	F
<i>Azoxystrobin</i>	1 l/ha; max. 2/2; Abstand: 10 Tage	
<i>FRAC-Code 11</i>	spritzen; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome; Stadium Kultur: BBCH 51-89; keine Anwendung mit handgeführten Geräten (VA263)	
00A150-00	NW605-1 (50% 5m, 75% 5m, 90%*), NW606 (5m), NW706	
31.05.2028	SF245-02	
B4, NB6641		

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
<i>Wirkstoff(e)</i>	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
<i>Wirkungsmechanismen</i>	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	<i>Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen</i>	
Bienenschutz	<i>Wiederbetretungsauflagen</i>	
Freiland		
Fungizide		
CLAYTON AUGUSTA	Laubkrankheit (<i>Stemphylium botryosum</i>), Spargelrost (<i>Puccinia asparagi</i>)	F
<i>Azoxystrobin</i>	1 l/ha; max. 2/2; Abstand: 10 Tage	
<i>FRAC-Code 11</i>	spritzen, bei Befallsbeginn oder Sichtbarwerden erster Symptome; Stadium Kultur: BBCH 41-89	
00A894-00	NW605-01 (50% 5m, 75% 5m, 90%*), NW606 (5m), NW706	
31.05.2028	SF245-02	
B4, NB6641		
DITTO 25 EC	Laubkrankheit (<i>Stemphylium botryosum</i>), Spargelrost (<i>Puccinia asparagi</i>)	F
<i>Difenoconazol</i>	0,4 l/ha; max. 1/1	
<i>FRAC-Code 3</i>	spritzen; nach der Ernte, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	
00A317-00	NW605-1 (50% 5m, 75% 5m, 90%*), NW606 (10m), NW705	
15.03.2027	SF245-02	
B4, NB6641		
HILL-STAR	Laubkrankheit (<i>Stemphylium botryosum</i>), Spargelrost (<i>Puccinia asparagi</i>)	F
<i>Azoxystrobin</i>	1 l/ha; max. 2/2; Abstand: 10 Tage	
<i>FRAC-Code 11</i>	spritzen; nach der Ernte; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome; max. Anwendungsanzahl ist eingeschränkt (WW750); im Wechsel mit anderen Wirkstoffgruppen verwenden (WW764)	
00A584-00	NW605-1 (50% 5m, 75%*, 90%*), NW606 (5m), NW706	
31.05.2028	SF245-02	
B4, NB6641		
LS AZOXY	Laubkrankheit (<i>Stemphylium botryosum</i>), Spargelrost (<i>Puccinia asparagi</i>)	F
<i>Azoxystrobin</i>	1 l/ha; max. 2/2; Abstand: 10 Tage	
<i>FRAC-Code 11</i>	spritzen; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome; nur zur Befallsminderung; Stadium Kultur: BBCH 41-89	
007180-00	NW605-1 (50% 5m, 75% 5m, 90%*), NW606 (5m), NW706	
31.05.2028	SF245-01	
B4, NB6641		

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
Wirkstoff(e)	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
Wirkungsmechanismen	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen	
Bienenschutz	Wiederbetretungsauflagen	
Freiland		
Fungizide		
PANTHA	Laubkrankheit (<i>Stemphylium botryosum</i>), Spargelrost (<i>Puccinia asparagi</i>)	F
Azoxystrobin	1 l/ha; max. 2/2; Abstand: 10 Tage	
FRAC-Code 11	spritzen; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome; Stadium Kultur: BBCH 41-89; Keine Anw. auf drainierten Flächen (NG405); Ausreichende Bekämpfung nicht in allen Fällen zu erwarten ggf. deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden (WW750, WW764)	
00B242-00	NW605-2 (50% 5m, 75% *, 90% *), NW606 (5m), NW706	
31.05.2028	SF245-02	
B4, NB6641		
ROUBAIX	Laubkrankheit (<i>Stemphylium botryosum</i>), Spargelrost (<i>Puccinia asparagi</i>)	F
Azoxystrobin	1 l/ha; max. 2/2; Abstand: 10 Tage	
FRAC-Code 11	spritzen; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: BBCH 41-89; Ausreichende Bekämpfung nicht in allen Fällen zu erwarten ggf. anschließend oder im Wechsel mit anderen Wirkstoffen verwenden (WW750)	
00B023-00	NW605-1 (50% 5m, 75% 5m, 90% *), NW606 (5m), NW706	
31.05.2028	SF245-02	
B4, NB6641		
FOLPAN 500 SC	Laubkrankheit (<i>Stemphylium botryosum</i>, <i>Stemphylium vesicarium</i>)	F
Folpet	1,5 l/ha; max. 2/2; Abstand: 7-10 Tage	
FRAC-Code M04	spritzen; Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome; Stadium Kultur: BBCH 60-81	
024256-00	NW607-2 (75% 15m, 90% 5m), NW706	
15.02.2028	SF276-EVGE	
B4, NB6641		
Revytrex	Laubkrankheit (<i>Stemphylium botryosum</i>, <i>Stemphylium vesicarium</i>)	F
Fluxapyroxad	1 l/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 14 Tage	
Mefentrifluconazole		
FRAC-Code 7	spritzen; nach der Ernte, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium	
FRAC-Code 3	Kultur: BBCH 51-81	
00A272-00	NW605-1 (50% 5m, 75% 5m, 90% *), NW606 (10m)	
31.10.2028	SF245-02, SF276-EEGE	
B4, NB6641		

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
<i>Wirkstoff(e)</i>	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
<i>Wirkungsmechanismen</i>	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	<i>Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen</i>	
Bienenschutz	<i>Wiederbetretungsauflagen</i>	
Freiland		
Fungizide		
ZOXIS SUPER	Laubkrankheit (<i>Stemphylium vesicarium</i>), Spargelrost (<i>Puccinia asparagi</i>)	F
<i>Azoxystrobin</i>	1 l/ha; max. 2/2; Abstand: 14 Tage; Behälter vor Gebrauch schütteln (VA800)	
<i>FRAC-Code 11</i>	spritzen; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: BBCH 51-93; Keine Anwendung auf drainierten Flächen (NG405)	
00A124-00	NW605-1 (50% 5m, 75% 5m, 90%*), NW606 (5m), NW706	
31.05.2028	SF245-02	
B4, NB6641		
Flowbrix	Pilzliche Schaderreger	F
<i>Kupferoxychlorid</i>	3,3 l/ha; max. 2/2; Abstand: 7 Tage; max. 3.000g Reinkupfer/ha/Jahr auf derselben Fläche (NT620-2)	
<i>FRAC-Code M01</i>	spritzen; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	
008886-00	NW605-1 (50% 10m, 75% 5m, 90% 5m), NW606 (15m)	
30.06.2027	SF245-02, SF275-2GE, SF276-EEGE	
B4, NB6641		
Polyversum OD	Pilzliche Schaderreger	F
<i>Pythium oligandrum</i>	0,05%; max. 1/1	
<i>M1 (1.0E+09 Sporen je l)</i>		
<i>FRAC-Code NC</i>	tauchen des Wurzelballens - durchdringend; Vor dem Pflanzen; nur zur Befallsminderung; Mittel nicht über 20 °C lagern	
00B479-00	NW642-1	
28.02.2039	SF245-02	
B4, NB6641		
PROBLAD	Puccinia-Arten	1 Tag
<i>Lupinus albus L.</i>	3,2 l/ha; max. 3/3; Abstand: 8 Tage	
<i>Samen Extrakt</i>		
<i>FRAC-Code BM01</i>	spritzen; Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: BBCH 21-89	
00A852-00	NW642-1	
27.04.2037	SF245-02	
B4, NB6641		

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
Wirkstoff(e)	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
Wirkungsmechanismen	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen	
Bienenschutz	Wiederbetretungsauflagen	
Freiland		
Fungizide		
LALSTOP CONTANS WG	Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.), Verminderung der Bodenverseuchung	F
<i>Coniothyrium minitans</i>	4 kg/ha bis 10cm Einarbeitungstiefe, 8 kg/ha bis 20cm Einarbeitungstiefe; max. 1/2	
Stamm CON/M/91-08		
FRAC-Code BM02	spritzen, anschl. Einarbeiten in den Boden; bei Befallsgefahr, vor der Pflanzung bzw. Saat, jedoch mind. 2 Monate vor einer möglichen Sclerotinia-Infektion; vor der Pflanzung bzw. Saat keine wendende Bodenbearbeitung durchführen, die über die Einarbeitungstiefe des Mittels hinausgeht; Einstufung des BVL als Mittel mit geringem Risiko	
034346-00	NW642-1	
31.07.2033	SF184	
B3, NB663	ehemaliger Mittelname Contans WG	
LALSTOP CONTANS WG	Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.), Verminderung der Bodenverseuchung	F
<i>Coniothyrium minitans</i>	2 kg/ha; max. 1/2	
Stamm CON/M/91-08		
FRAC-Code BM02	spritzen; nach der Ernte; Ernterückstände müssen nach Behandlung in den Boden eingearbeitet werden; Einstufung des BVL als Mittel mit geringem Risiko	
034346-00	NW642-1	
31.07.2033	SF184	
B3, NB663	ehemaliger Mittelname Contans WG	
ASKON	Spargelrost (Puccinia asparagi)	F
<i>Azoxystrobin</i>	1 l/ha; max. 1/1	
<i>Difenoconazol</i>		
FRAC-Code 11	spritzen; nach der Ernte; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	
FRAC-Code 3		
006902-00	NW605-1 (50% 10m, 75% 10m, 90%*), NW606 (15m), NW701	
15.03.2027	SF245-02	
B4, NB6641		
AZOFIN	Spargelrost (Puccinia asparagi)	F
<i>Azoxystrobin</i>	1 l/ha; max. 2/2; Abstand: 8-12 Tage	
FRAC-Code 11	spritzen; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome	
00A065-00	NW605-2 (50% 5m, 75%*, 90%*), NW606 (5m), NW706	
31.05.2028	SF245-02	
B4, NB6641		

Zulassungsstand Spargel

Mittel		Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
<i>Wirkstoff(e)</i>		Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
<i>Wirkungsmechanismen</i>		(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.		Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende		<i>Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen</i>	
Bienenschutz		<i>Wiederbetretungsauflagen</i>	
Freiland			
Fungizide			
Elatus Plus / Hypontus		Spargelrost (<i>Puccinia asparagi</i>)	F
<i>Benzovindiflupyr</i>		0,5 l/ha; max. 1/1; max. Aufwandmenge u. max. Anzahl der Behandlungen von Benzovindiflupyr pro ha/Fläche nicht überschreiten (NG371.1200); Anw. nur, wenn im Vorjahr kein Benzovindiflupyr-haltiges Mittel auf derselben Fläche eingesetzt wurde (NG372.1200)	
<i>FRAC-Code 7</i>		spritzen; Nach der Ernte bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome	
008405-00		NW605-2 (50% 5m, 75% 5m, 90% *), NW606 (15m)	
02.03.2027		SF245-02	
B4, NB6641			
ORTIVA		Spargelrost (<i>Puccinia asparagi</i>)	F
<i>Azoxystrobin</i>		1 l/ha; max. 2/2; Abstand: 12 Tage	
<i>FRAC-Code 11</i>		spritzen; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome; Stadium Kultur: BBCH 55-89; Keine Anwendung auf drainierten Flächen (NG405)	
034560-00		NW605-2 (50% 5m, 75% 5m, 90% *), NW606 (10m), NW706	
31.05.2028		SF245-02	
B4, NB6641			
Revytrex		Spargelrost (<i>Puccinia asparagi</i>)	F
<i>Fluxapyroxad</i>		1 l/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 14 Tage	
<i>Mefentrifluconazole</i>			
<i>FRAC-Code 7</i>		spritzen; nach der Ernte, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium	
<i>FRAC-Code 3</i>		Kultur: BBCH 51-81	
00A272-00		NW605-1 (50% 5m, 75% 5m, 90%*), NW606 (10m)	
31.10.2028		SF245-02, SF276-EEGE	
B4, NB6641			
SCORE		Spargelrost (<i>Puccinia asparagi</i>)	F
<i>Difenoconazol</i>		0,4 l/ha; max. 1/1	
<i>FRAC-Code 3</i>		spritzen; nach der Ernte, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	
024353-00		NW604, NW605 (50% 5m, 75%*, 90%*), NW606 (5m)	
15.03.2027		SF245-02	
B4, NB6641			
Funguran progress		Spargelrost (<i>Puccinia asparagi</i>)	F
<i>Kupferhydroxid</i>		1,4 kg/ha; max. 2/2; Abstand: 7-14 Tage; max. 3.000g Reinkupfer/ha/Jahr auf derselben Fläche (NT620)	
<i>FRAC-Code M01</i>		spritzen; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: BBCH 12-95	
006896-00		NW605-1 (50% 5m, 75% 5m, 90%*), NW606 (10m)	
30.09.2026		SF245-02	
B4, NB6641			

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
<i>Wirkstoff(e)</i>	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
<i>Wirkungsmechanismen</i>	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	<i>Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen</i>	
Bienenschutz	<i>Wiederbetretungsauflagen</i>	
Freiland		
Herbizide		
LONTREL 720 SG	Acker-Kratzdistel	F
<i>Clopyralid</i>	0,167 kg/ha; max. 1/1	
<i>HRAC/WSSA-Code 4</i>	spritzen mit Abschirmung; nach dem Stechen; Stadium Schadorg.: BBCH 31-33	
006851-00	<i>NW642-1, NT101</i>	
31.12.2026	<i>SF245-01</i>	
B4, NB6641		
LONTREL 720 SG	Acker-Kratzdistel	F
<i>Clopyralid</i>	0,167 kg/ha; max. 1/1	
<i>HRAC/WSSA-Code 4</i>	Junganlagen; spritzen mit Abschirmung; nach dem Durchstoßen; Stadium Schadorg.: BBCH 31-33	
006851-00	<i>NW642-1, NT101</i>	
31.12.2026	<i>SF245-01</i>	
B4, NB6641		
LONTREL 720 SG	Acker-Kratzdistel	F
<i>Clopyralid</i>	167 g/ha; max. 1/1	
<i>HRAC/WSSA-Code 4</i>	spritzen mit Abschirmung; Nach dem Stechen; Stadium Kultur: BBCH 99; Stadium Schadorg.: BBCH 31-33	
036851-00	<i>NW642-1, VN290</i>	
30.09.2037	<i>SF245-02</i>	
B4, NB6641		
FLEXIDOR	Acker-Senf, Gemeines Hirtentäschel, Gemeines Kreuzkraut, Vogel-Sternmiere	F
<i>Isoxaben</i>	0,4 l/ha; max. 1/1	
<i>HRAC/WSSA-Code 29</i>	Junganlagen mit Sämlingspflanzen; spritzen; im Pflanzjahr, nach dem Pflanzen, vor dem Auflaufen der Unkräuter; Stadium Kultur: ab BBCH 11; Keine Anwendung auf gedrahten Flächen zwischen 1. November und 15. März (NG403)	
043673-00	<i>NW609-1 (5m), NW706, NT102</i>	
31.12.2027	<i>SF245-02</i>	
B4, NB6641		

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
<i>Wirkstoff(e)</i>	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
<i>Wirkungsmechanismen</i>	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	<i>Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen</i>	
Bienenschutz	<i>Wiederbetretungsauflagen</i>	
Freiland		
Herbizide		
Spectrum	Amarant-, Kamille-Arten, Schadhirsen	F
<i>Dimethenamid-P</i>	1,4 l/ha; max. 1/1	
<i>HRAC/WSSA-Code 15</i>	Junganlagen; spritzen, im Pflanzjahr BIS nach den Durchstoßen, vor Ausbildung der Phyllokladien am 1.Trieb; Stadium Schadorg.: BBCH 00-12; Bei Anwendung zu angrenzenden Flächen ein Abstand von mind. 5m einhalten alternativ kann die Anwendung mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen (VA271)	
024803-00	NW605 (50% 10m, 75% 5m, 90% 5m), NW606 (20m), NT101	
30.04.2026	SF143	
B4, NB6641	Abverkaufsfrist: 30.10.2026, Aufbrauchfrist: 30.10.2027, Neuzulassung mit Zul.-Nr.: 044803-00 (Achtung: Nicht alle Indikationen verfügbar)	
Spectrum	Amarant-, Kamille-Arten, Schadhirsen	F
<i>Dimethenamid-P</i>	1,4 l/ha; max. 1/1	
<i>HRAC/WSSA-Code 15</i>	Ertragsanlagen; nach dem Stechen BIS nach dem Durchstoßen, vor Ausbildung der Phyllokladien am 1.Trieb; Stadium Schadorg.: BBCH 00-12; Bei Anwendung zu angrenzenden Flächen ein Abstand von mind. 5m einhalten alternativ kann die Anwendung mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen (VA271)	
024803-00	NW605 (50% 10m, 75% 5m, 90% 5m), NW606 (20m), NT101	
30.04.2026	SF143	
B4, NB6641	Abverkaufsfrist: 30.10.2026, Aufbrauchfrist: 30.10.2027, Neuzulassung mit Zul.-Nr.: 044803-00 (Achtung: Nicht alle Indikationen verfügbar)	
Spectrum	Amarant-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen	21 Tage
<i>Dimethenamid-P</i>	0,7 l/ha; max. 1/1	
<i>HRAC/WSSA-Code 15</i>	Nur in Grünspargel; spritzen; Vor dem Durchstoßen; Keine Anwendung mit handgeführten Geräten (VA263-1); Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen 01. Nov. und 15. Mrz. (NW800); Zu angrenzenden Flächen ein Abstand von mind. 5m einhalten alternativ kann die Anwendung mit verlustmindernden Gerät erfolgen (mind. Abdriftminderungsklasse 50%, Bundesanzeigerveröffentlichung des BVL, VA271)	
044803-00	NW609-2 (5m), NW705, NT102-1	
31.08.2035	SF275-2GE, SF274-1, SF555-1	
B4, NB6641		

Zulassungsstand Spargel

Mittel		Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
Wirkstoff(e)		Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
Wirkungsmechanismen		(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.		Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende		Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen	
Bienenschutz		Wiederbetretungsauflagen	
Freiland			
Herbizide			
Spectrum		Amarant-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen	F
<i>Dimethenamid-P</i>		max. pro Behandlung: 0,7 l/ha, 0,5 l/ha; max. in der Kultur oder im Jahr: 1,2 l/ha; max. 2/2; Abstand: 7 Tage; im Splittingverfahren / Bandbehandlung	
HRAC/WSSA-Code 15		(Ertragsanlagen); spritzen; Nach dem Stechen; Keine Anwendung mit handgeführten Geräten (VA263-1); Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen 01. Nov. und 15. Mrz. (NW800); Zu angrenzenden Flächen ein Abstand von mind. 5m einhalten alternativ kann die Anwendung mit verlustmindernden Gerät erfolgen (mind. Abdriftminderungsklasse 50%, Bundesanzeigerveröffentlichung des BVL, VA271)	
044803-00		NW609-2 (5m), NW706, NT103-1	
31.08.2035		SF275-2GE, SF274-1, SF555-1	
B4, NB6641			
Spectrum		Amarant-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen	F
<i>Dimethenamid-P</i>		max. pro Behandlung: 0,7 l/ha, 0,5 l/ha; max. in der Kultur oder im Jahr: 1,2 l/ha; max. 2/2; Abstand: 7 Tage; im Splittingverfahren	
HRAC/WSSA-Code 15		(Junganlagen); spritzen; Ab Pflanzjahr, bis einschließlich 3. Standjahr, nach dem Durchstoßen; Keine Anwendung mit handgeführten Geräten (VA263-1); Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen 01. Nov. und 15. Mrz. (NW800); Zu angrenzenden Flächen ein Abstand von mind. 5m einhalten alternativ kann die Anwendung mit verlustmindernden Gerät erfolgen (mind. Abdriftminderungsklasse 50%, Bundesanzeigerveröffentlichung des BVL, VA271)	
044803-00		NW609-2 (5m), NW706, NT103-1	
31.08.2035		SF275-2GE, SF274-1, SF555-1	
B4, NB6641			
Spectrum		Amarant-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen	F
<i>Dimethenamid-P</i>		1,2 l/ha; max. 1/1	
HRAC/WSSA-Code 15		Junganlagen; spritzen; im Pflanzjahr nach dem Durchstoßen vor Ausbildung der Phyllokladien am 1. Trieb; Stadium Schadorg.: bis BBCH 12; Pflanzenverträglichkeit prüfen (WP747); Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen 01. Nov. und 15. Mrz. (NW800); Keine Anwendung mit handgeführten Geräten (VA263-1); Bei Anwendung ein Abstand von mind. 5m zu angrenzenden Flächen von unbeteiligten Dritten einhalten, alternativ kann die Anwendung mit einem verlustmindernden Gerät (Abdriftminderungsklasse 50%) erfolgen (VA271)	
044803-00		NW609-2 (5m), NW706, NT103-1	
31.08.2035		SF274-1, SF275-2GE, SF555-1	
B4, NB6641			

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
Wirkstoff(e)	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
Wirkungsmechanismen	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen	
Bienenschutz	Wiederbetretungsaufgaben	
Freiland		
Herbizide		
ARRODIM	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter	F
<i>Clethodim</i>	0,75 l/ha; max. 1/1; vorgeschriebene Mischung mit ARROACTIVE (00B251-00) 1 l/ha	
HRAC/WSSA-Code 1	spritzen; Unterblattbehandlung; ab Pflanzjahr, nach der Ernte; Stadium Schadorg.: BBCH 12-29	
00B059-00	NW642-1, NT108-1	
31.05.2027	SF245-02, SF275-EEGE	
B4, NB6641		
Select 240 EC	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter	F
<i>Clethodim</i>	0,75 l/ha; max. 1/1; Mischung mit RADIAMIX (00A791-00) 1 l/ha	
HRAC/WSSA-Code 1	spritzen; Unterblattbehandlung; ab Pflanzjahr, nach der Stechperiode; Stadium Kultur: BBCH 12-29; Stadium Schadorg.: BBCH 12-29	
024366-00	NW642-1, NT108	
31.08.2027	SF245-01	
B4, NB6641		
Focus Ultra	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Einjähriges Rispengras)	F
<i>Cycloxydim</i>	2,5 l/ha; max. 1/1	
HRAC/WSSA-Code 1	Junganlagen; spritzen; im Pflanzjahr, nach dem Durchstoßen; Stadium Schadorg.: BBCH 12-29	
033964-00	NW642-1, NT101	
31.08.2027	SF245-02	
B4, NB6641		
Focus Ultra	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Einjähriges Rispengras)	F
<i>Cycloxydim</i>	2,5 l/ha; max. 1/1	
HRAC/WSSA-Code 1	Junganlagen mit Sämlingspflanzen; spritzen; im Pflanzjahr, nach dem Pflanzen; Stadium Schadorg.: BBCH 12-29	
033964-00	NW642-1, NT101	
31.08.2027	SF245-02	
B4, NB6641		
Focus Ultra	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Einjähriges Rispengras)	F
<i>Cycloxydim</i>	2,5 l/ha; max. 1/1	
HRAC/WSSA-Code 1	Ertragsanlagen; spritzen; nach der Ernte, nach dem Stechen; Stadium Schadorg.: BBCH 12-29	
033964-00	NW642-1, NT101	
31.08.2027	SF245-02	
B4, NB6641		

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
<i>Wirkstoff(e)</i>	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
<i>Wirkungsmechanismen</i>	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	<i>Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen</i>	
Bienenschutz	<i>Wiederbetretungsauflagen</i>	
Freiland		
Herbizide		
Fusilade MAX	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Einjähriges Rispengras)	F
<i>Fluazifop-P</i>	1 l/ha; max. 1/1	
<i>HRAC/WSSA-Code 1</i>	Junganlagen; spritzen; nach dem Auflaufen; Stadium Kultur: ab BBCH 09; Stadium Schadorg.: BBCH 12-21; Erntegut nicht verzehren (VV600)	
024847-00	NW642-1, NT102	
31.05.2027	SF245-02	
B4, NB6641		
Fusilade MAX	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Einjähriges Rispengras)	F
<i>Fluazifop-P</i>	1 l/ha; max. 1/1	
<i>HRAC/WSSA-Code 1</i>	Ertragsanlagen; spritzen; nach der Ernte, nach dem Stechen; Stadium Schadorg.: BBCH 12-21	
024847-00	NW642-1, NT102	
31.05.2027	SF245-02	
B4, NB6641		
BELOUKHA	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	F
<i>Pelargonsäure</i>	16 l/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 7 Tage; Spritzflüssigkeit unter ständigem Rühren ausbringen (VA551)	
<i>HRAC/WSSA-Code Ø</i>	spritzen, Zwischenreihenbehandlung mit Spritzschirm; nach dem Auflaufen bzw. Pflanzen	
008528-00	NW642-1	
01.12.2027	SF245-02	
B4, NB6641		
Centium 36 CS	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	F
<i>Clomazone</i>	0,25 l/ha; max. 1/1	
<i>HRAC/WSSA-Code 13</i>	Junganlagen; im Pflanzjahr, vor dem Durchstoßen; Stadium Schadorg.: BBCH00-09	
024798-00	NW642-1, NT102-1, NT127, NT149	
30.09.2027	SF245-02	
B4, NB6641		
Centium 36 CS	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	21 Tage
<i>Clomazone</i>	0,15 l/ha; max. 1/1	
<i>HRAC/WSSA-Code 13</i>	nur Grünspargel; vor dem Austrieb; Stadium Kultur: BBCH 00-08; Stadium Schadorg.: BBCH 05-09	
024798-00	NW642-1, NT101, NT127, NT149	
30.09.2027	SF245-02	
B4, NB6641		

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
Wirkstoff(e)	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
Wirkungsmechanismen	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen	
Bienenschutz	Wiederbetretungsaufgaben	
Freiland		
Herbizide		
Centium 36 CS	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	F
Clomazone	0,25 l/ha; max. 1/1	
HRAC/WSSA-Code 13	Ertragsanlagen; nach der Stechperiode ODER nach Einebnen der Dämme, vor dem Durchstoßen; Stadium Schadorg.: BBCH 00-09	
024798-00	NW642-1, NT102-1, NT127, NT149	
30.09.2027	SF245-02	
B4, NB6641		
Cresendo	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	F
Clomazone	0,25 l/ha; max. 1/1	
HRAC/WSSA-Code 13	Junganlagen; spritzen; im Pflanzjahr 7-10 Tage nach dem Pflanzen bis kurz vor dem Durchstoßen; Erntegut nicht verzehren (VV600); Schäden an Kulturpflanze, benachbart wachsenden Kulturpfl. und Gehölzen möglich (WP734, WP740, WP744)	
00B264-00	NW642-1, NT102-1, NT127, NT149	
30.09.2027	SF245-02	
B4, NB6641		
Cresendo	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	F
Clomazone	0,25 l/ha; max. 1/1	
HRAC/WSSA-Code 13	Ertragsanlagen; spritzen; nach dem Stechen bis vor dem Austrieb; Schäden an Kulturpflanze, benachbart wachsenden Kulturpfl. und Gehölzen möglich (WP734, WP740, WP744)	
00B264-00	NW642-1, NT102-1, NT127, NT149	
30.09.2027	SF245-02	
B4, NB6641		
FLEXIDOR	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	F
Isoxaben	0,5 l/ha; max. 1/1	
HRAC/WSSA-Code 29	Ertragsanlagen; spritzen mit Abschirmung, Reihenbehandlung, Unterblattbehandlung; auf unkrautfreien Boden; nach der Ernte, vor dem Auflaufen der Unkräuter; Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen 1. Nov. und 15. Mrz. (NG403)	
043673-00	NW605-2 (50% 5m, 75% *, 90% *), NW606 (5m), NW706, NT103-1	
31.12.2027	SF245-02	
B4, NB6641		
Lentagran WP	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	F
Pyridat	2 kg/ha; max. 1/1	
HRAC/WSSA-Code 6	spritzen; nach der Stechperiode als Unterblattbehandlung	
033231-00	NW642, NT103	
28.02.2026	SF1891	
B4, NB6641	Abverkaufsfrist: 28.08.2026, Aufbrauchsfrist: 28.08.2027, Neuzulassung mit Zul.-Nr.: 043231-00 (Achtung: Nicht alle Indikationen verfügbar)	

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
Wirkstoff(e)	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
Wirkungsmechanismen	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen	
Bienenschutz	Wiederbetretungsauflagen	
Freiland		
Herbizide		
Lentagran WP	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	F
<i>Pyridat</i>	1 kg/ha (max. 2 kg/ha in der Kultur oder im Jahr); max. 2/2; Abstand: 7-14 Tage; Splittingverfahren (2 Behandlungen)	
HRAC/WSSA-Code 6	Junganlagen; spritzen als Unterblattbehandlung; Nach dem Auflaufen, ab Frühjahr; Stadium Kultur: ab BBCH 21; Verfallsdatum darf 12 Monaten nach Produktion nicht überschreiten (VH301-3); Anwendung muss in einer Breite von mind. 20m zu angrenzenden Flächen mit abdriftmindernden Geräten erfolgen (mind. Abdriftminderungsklasse 90%, VA320)	
043231-00	NW605-2 (50% 5m, 75% 5m, 90% *), NW606 (5m), NT101-1	
31.12.2031	SF245-02, SF275-35GE	
B4, NB6641		
Lentagran WP	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	F
<i>Pyridat</i>	2 kg/ha; max. 1/1	
HRAC/WSSA-Code 6	Ertragsanlagen; spritzen; Unterblattbehandlung / Reihenbehandlung; Nach der Stechperiode; Verfallsdatum darf 12 Monaten nach Produktion nicht überschreiten (VH301-3); Anwendung muss in einer Breite von mind. 20m zu angrenzenden Flächen mit abdriftmindernden Geräten erfolgen (mind. Abdriftminderungsklasse 90%, VA320)	
043231-00	NW605-2 (50% 5m, 75% 5m, 90% *), NW606 (10m), NT102-1	
31.12.2031	SF245-02, SF275-35GE	
B4, NB6641		
Lentagran WP	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	F
<i>Pyridat</i>	2 kg/ha; max. 1/1	
HRAC/WSSA-Code 6	spritzen; vor der Stechperiode	
033231-00	NW642, NT103	
28.02.2026	SF1891	
B4, NB6641	Abverkaufsfrist: 28.08.2026, Aufbrauchfrist: 28.08.2027, Neuzulassung mit Zul.-Nr.: 043231-00 (Achtung: Nicht alle Indikationen verfügbar)	

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
Wirkstoff(e)	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
Wirkungsmechanismen	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen	
Bienenschutz	Wiederbetretungsauflagen	
Freiland		
Herbizide		
Stomp Aqua	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Acker-Hundskamille, Franzosenkraut-, Kamille- Arten, Gemeines Kreuzkraut, Kletten-Labkraut)	F
<i>Pendimethalin</i>	1.Behandlung: 1,75 l/ha, 2.Behandl.: 1,75 l/ha, im Splittingverfahren; max. 2/2; Abstand: 9-28 Tage	
HRAC/WSSA-Code 3	Junganlagen mit Sämlingspflanzen; spritzen im Splittingverfahren (2 Behandlungen); im Pflanzjahr, bis 2 Tage vor dem Pflanzen UND nach dem Anwachsen 7-10 Tage nach dem Pflanzen; Stadium Schadorg.: bis BBCH 11; Bei der Ausbringung darf Fahrgeschwindigkeit 7,5 km/h und Windgeschwindigkeit 3 m/s nicht überschreiten (NT146, NT170); Mittel mit verlustminderndem Gerät (mind. Abdriftminderungsklasse 90%) und mit Wasseraufwand von mind. 300 l/ha ausbringen (NT145)	
005958-00	NT145, NW605-1 (90% 5m), NW705, NT112	
30.06.2026	SF245-02	
B4, NB6641	Abverkaufsfrist: 30.12.2026, Aufbrauchfrist: 30.12.2027, Neuzulassung mit Zul.-Nr.: 035958-00	
Stomp Aqua	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Acker-Hundskamille, Franzosenkraut-, Kamille- Arten, Gemeines Kreuzkraut, Kletten-Labkraut)	F
<i>Pendimethalin</i>	3,5 l/ha; max. 1/1	
HRAC/WSSA-Code 3	Ertrags- und Junganlagen; vor der Stechperiode; Stadium Kultur: bis BBCH 08, Stadium Schadorg.: bis BBCH 11; Bei der Ausbringung darf Fahrgeschwindigkeit 7,5 km/h und Windgeschwindigkeit 3 m/s nicht überschreiten (NT146, NT170); Mittel mit verlustminderndem Gerät (mind. Abdriftminderungsklasse 90%) und mit Wasseraufwand von mind. 300 l/ha ausbringen (NT145)	
005958-00	NT145, NW605-1 (90% 5m), NW705, NT112	
30.06.2026	SF245-02	
B4, NB6641	Abverkaufsfrist: 30.12.2026, Aufbrauchfrist: 30.12.2027, Neuzulassung mit Zul.-Nr.: 035958-00	
Stomp Aqua	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse	F
<i>Pendimethalin</i>	3,5 l/ha; max. 1/1	
HRAC/WSSA-Code 3	Ertragsanlagen; nach der Stechperiode, nach Einebnen der Dämme; Bei der Ausbringung darf Fahrgeschwindigkeit 7,5 km/h und Windgeschwindigkeit 3 m/s nicht überschreiten (NT146, NT170); Mittel mit verlustminderndem Gerät (mind. Abdriftminderungsklasse 90%) und mit Wasseraufwand von mind. 300 l/ha ausbringen (NT145)	
005958-00	NT145, NW605-1 (90% 5m), NW705, NT112	
30.06.2026	SF245-02	
B4, NB6641	Abverkaufsfrist: 30.12.2026, Aufbrauchfrist: 30.12.2027, Neuzulassung mit Zul.-Nr.: 035958-00	

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
Wirkstoff(e)	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
Wirkungsmechanismen	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen	
Bienenschutz	Wiederbetretungsauflagen	
Freiland		
Herbizide		
Stomp Aqua	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse	F
<i>Pendimethalin</i>	3,5 l/ha; max. 1/1	
HRAC/WSSA-Code 3	Junganlagen; im Pflanzjahr, 7-10 Tage nach dem Pflanzen, vor dem Austrieb; Bei der Ausbringung darf Fahrgeschwindigkeit 7,5 km/h und Windgeschwindigkeit 3 m/s nicht überschreiten (NT146, NT170); Mittel mit verlustminderndem Gerät (mind. Abdriftminderungsklasse 90%) und mit Wasseraufwand von mind. 300 l/ha ausbringen (NT145)	
005958-00	NT145, NW605-1 (90% 5m), NW705, NT112	
30.06.2026	SF245-02	
B4, NB6641	Abverkaufsfrist: 30.12.2026, Aufbrauchfrist: 30.12.2027, Neuzulassung mit Zul.-Nr.: 035958-00	
Stomp Aqua	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse	F
<i>Pendimethalin</i>	3,5 l/ha; max. 1/1	
HRAC/WSSA-Code 3	Ertragsanlagen; vor dem Austrieb, nach Aufrichten der Dämme; Bei der Ausbringung darf Fahrgeschwindigkeit 7,5 km/h und Windgeschwindigkeit 3 m/s nicht überschreiten (NT146, NT170); Mittel mit verlustminderndem Gerät (mind. Abdriftminderungsklasse 90%) und mit Wasseraufwand von mind. 300 l/ha ausbringen (NT145)	
005958-00	NT145, NW605-1 (90% 5m), NW705, NT112	
30.06.2026	SF245-02	
B4, NB6641	Abverkaufsfrist: 30.12.2026, Aufbrauchfrist: 30.12.2027, Neuzulassung mit Zul.-Nr.: 035958-00	
Saracen	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Knöterich-Arten, Kamille-Arten	F
<i>Florasulam</i>	0,15 l/ha; max. 1/1	
HRAC/WSSA-Code 2	nur Grünspargel; spritzen, Unterblattbehandlung; nach der Ernte; Stadium Kultur: BBCH 51-89	
027767-00	NW642-1, NT109-1	
31.12.2031	SF245-02	
B4, NB6641		
Saracen	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Knöterich-Arten, Kamille-Arten	F
<i>Florasulam</i>	0,15 l/ha; max. 1/1	
HRAC/WSSA-Code 2	Junganlagen; Unterblattbehandlung, spritzen; Ab 1. Standjahr und bis einschließlich 3. Standjahr; Stadium Kultur: BBCH 51-89; Erntegut nicht verzehren (VV600)	
027767-00	NW642-1, NT109-1	
31.12.2031	SF245-02	
B4, NB6641		

Zulassungsstand Spargel

Mittel		Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
Wirkstoff(e)		Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
Wirkungsmechanismen		(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.		Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende		Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen	
Bienenschutz		Wiederbetretungsauflagen	
Freiland			
Herbizide			
Stomp Aqua		Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras	F
<i>Pendimethalin</i>		2,6 l/ha; max. 1/1	
HRAC/WSSA-Code 3		Junganlagen; spritzen; im Pflanzjahr 7-10 Tage nach dem Pflanzen, vor dem Austrieb; Erntegut nicht verzehren (VV600)	
035958-00		NW607-2 (90% 5m), NW706, NT103-1	
15.01.2028		SF245-02, SF275-EEGE	
B4, NB6641			
Stomp Aqua		Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras	F
<i>Pendimethalin</i>		2,6 l/ha; max. 1/1	
HRAC/WSSA-Code 3		Ertragsanlagen; spritzen; nach der Stechperiode und nach Einebnen der Dämme	
035958-00		NW607-2 (90% 5m), NW706, NT103-1	
15.01.2028		SF245-02, SF275-EEGE	
B4, NB6641			
FRESCO		Einjähriges Rispengras, Franzosenkraut-Arten, Vogel- Sternmiere	F
<i>Metobromuron</i>		3,75 l/ha; max. 1/1	
HRAC/WSSA-Code 5		nach der Ernte, Juli bis August; kein Nachbau von zweikeimblättrigen Zwischenfrüchten sowie Winterraps (WP720), Schäden an Kulturpflanze möglich (WP734)	
008443-00		NG412; NW642-1, NT101	
31.05.2028		SF245-02	
B4, NB6641			
Proman		Einjähriges Rispengras, Franzosenkraut-Arten, Vogel- Sternmiere	F
<i>Metobromuron</i>		1,5 l/ha (in Ausnahmefällen bis zu 3 l/ha); max. 1	
		spritzen; nach der Ernte, Juli bis August; Schäden an der Kultur nicht auszuschließen daher Pflanzenverträglichkeit prüfen; Keine Anwendung mit handgeführten Geräten (VA263-1); Anwendung muss mit verlustmindernden Gerät erfolgen (mind. Abdriftminderungsklasse 75%, VA269); Blattgemüse, Getreide und Beten frühestens 4 Monate nach Anwendung anbauen. Wurzel- und Knollengemüse (außer Beten) gelten keine Restriktionen. Alle anderen Kulturen frühestens 12 Monaten nach Anwendung anbauen (VN288)	
		NG404, NW609-2 (5m), NT102-1	
28.10.2026		SF245-02	
B4, NB6641		Zulassung nach Art.53 VO (EG) Nr.1107/2009 vom 01.07.2026-28.10.2026	

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
<i>Wirkstoff(e)</i>	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
<i>Wirkungsmechanismen</i>	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	<i>Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen</i>	
Bienenschutz	<i>Wiederbetretungsauflagen</i>	
Freiland		
Herbizide		
Roundup REKORD	Einkeimblättrige Unkräuter, schwer bekämpfbare Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter	F
<i>Glyphosat</i>	33% (max. Mittelaufwand 5 kg/ha); max. 1/1; 40 Tage Abstand zwischen Spritzungen einhalten, wenn der Gesamtaufwand 2,9 kg Glyphosat/ha überschreitet (NG352)	
<i>HRAC/WSSA-Code 9</i>	streichen; zur gezielten Einzelpflanzenbehandlung; während der Vegetationsperiode	
007525-60	NW642-1	
15.12.2026	SF245-01	
B4, NB6641		
Credit Xtreme	Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter	F
<i>Glyphosat</i>	2 l/ha; max. 1/1; 75 Tage zwischen Spritzanwendungen einhalten, wenn Gesamtaufwand von zwei aufeinanderfolgenden Spritzanwendungen Summe von 2,4 kg Glyphosat/ha überschreitet (NG352-1)	
<i>HRAC/WSSA-Code 9</i>	spritzen; nach der Saat vor dem Auflaufen	
00A370-00	NW642-1, NT140	
15.12.2026	SF245-02	
B4, NB6641		
Finalsan Unkrautfrei	Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter	F
<i>Pelargonsäure</i>	62,5 l/ha; max. 6/6; Abstand: 3-10 Tage; Mittelaufwand bezieht sich auf die zu behandelnde Fläche	
<i>HRAC/WSSA-Code Ø</i>	spritzen als Einzelpflanzenbehandlung mit optischer Unkrauterkenennung; nach Vegetationsbeginn	
024645-00	NW642-1	
01.12.2027	SF245-02	
B4, NB6641		
Roundup Future	Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter	F
<i>Glyphosat</i>	2,16 l/ha; max. 1/1; 75 Tage zwischen Spritzanwendungen einhalten, wenn Gesamtaufwand von zwei aufeinanderfolgenden Spritzanwendungen die Summe von 2,4 kg Glyphosat/ha überschreitet (NG352-1)	
<i>HRAC/WSSA-Code 9</i>	spritzen mit Abschirmung; nach dem Stechen	
00A042-00	NW642-1, NT140	
15.12.2026	SF245-02	
B4, NB6641		

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
<i>Wirkstoff(e)</i>	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
<i>Wirkungsmechanismen</i>	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	<i>Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen</i>	
Bienenschutz	<i>Wiederbetretungsauflagen</i>	
Freiland		
Herbizide		
Focus Ultra	Gemeine Quecke	F
<i>Cycloxydim</i>	5 l/ha; max. 1/1	
<i>HRAC/WSSA-Code 1</i>	Ertragsanlagen; spritzen; nach der Ernte, nach dem Stechen, bei Unkrauthöhe bis ca. 25 cm	
033964-00	<i>NW642-1, NT102</i>	
31.08.2027	<i>SF245-02</i>	
B4, NB6641		
Focus Ultra	Gemeine Quecke	F
<i>Cycloxydim</i>	5 l/ha; max. 1/1	
<i>HRAC/WSSA-Code 1</i>	Junganlagen; spritzen; im Pflanzjahr, nach dem Durchstoßen, bei Unkrauthöhe bis ca. 25 cm	
033964-00	<i>NW642-1, NT102</i>	
31.08.2027	<i>SF245-02</i>	
B4, NB6641		
Focus Ultra	Gemeine Quecke	F
<i>Cycloxydim</i>	5 l/ha; max. 1/1	
<i>HRAC/WSSA-Code 1</i>	Junganlagen mit Sämlingspflanzen; spritzen; im Pflanzjahr, nach dem Pflanzen, bei Unkrauthöhe bis ca. 25 cm	
033964-00	<i>NW642-1, NT102</i>	
31.08.2027	<i>SF245-02</i>	
B4, NB6641		
Fusilade MAX	Gemeine Quecke	F
<i>Fluazifop-P</i>	2 l/ha; max. 1/1	
<i>HRAC/WSSA-Code 1</i>	Ertragsanlagen; spritzen; nach der Ernte, nach dem Stechen; Stadium Schadorg.: BBCH 12-14	
024847-00	<i>NW609-1 (5m), NT103</i>	
31.05.2027	<i>SF245-02</i>	
B4, NB6641		
Fusilade MAX	Gemeine Quecke	F
<i>Fluazifop-P</i>	2 l/ha; max. 1/1	
<i>HRAC/WSSA-Code 1</i>	Junganlagen; spritzen; nach dem Auflaufen; Stadium Kultur: ab BBCH 09; Stadium Schadorg.: BBCH 12-14; Erntegut nicht verzehren (VV600)	
024847-00	<i>NW609-1 (5m), NT103</i>	
31.05.2027	<i>SF245-02</i>	
B4, NB6641		

Zulassungsstand Spargel

Mittel	Schadorganismus/Zwec	Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)
<i>Wirkstoff(e)</i>	Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit	
<i>Wirkungsmechanismen</i>	(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)	
Zulassungs-Nr.	Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen	
Zulassungsende	<i>Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen</i>	
Bienenschutz	<i>Wiederbetretungsauflagen</i>	

Freiland

Herbizide

Vorox F	Schwarzer Nachtschatten	F
<i>Flumioxazin</i>	0,3 kg/ha (auf unkrautfreien Boden); max. 1/1	
<i>HRAC/WSSA-Code 14</i>	Ertragsanlagen; spritzen; Unterblattbehandlung mit Abschirmung; nach der Ernte; Stadium Kultur: ab BBCH 67	
024895-60	<i>NW609-1 (5m)</i>	
30.06.2025	<i>SF245-02</i>	
B4, NB6641	Abverkaufsfrist: 30.12.2025, Aufbrauchsfrist: 30.12.2026	

U 46 D Fluid	Zweikeimblättrige Unkräuter	F
<i>2,4-D</i>	0,015 l/100 m ² ; max. 1/1	
<i>HRAC/WSSA-Code 4</i>	spritzen mit Rückenspritze, mit Abschirmung, Einzelpflanzenbehandlung, nach dem Stechen, nach der Ernte	
034066-00	<i>NW706</i>	
31.12.2031	<i>SF245-02</i>	
B4, NB6641		

Nicht aufgeführt sind Totalherbizide, Molluskizide, Rodentizide und Repellents, sowie Desinfektions- und Bodenentseuchungsmittel. Für diese Anwendungen gibt es jeweils separate Listen.

Bitte die "Erläuterungen zu den Zulassungslisten" beachten!