

Aktuelle Notfallzulassungen im Herbst 2026

Rapserrdfloh-Bekämpfung

Minecto Gold (400 g/kg Cyantraniliprole)

- Vom **14.08.2026** bis **11.12.2026** zum **Bekämpfen von Rapserrdfloh in Raps (BRSNN)**
- Anwendung mit **100 g/ha in 200-400 l Wasser/ha**
- **Anwendungszeitpunkt: nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf**
- **Stadium der Kultur: BBCH 10-19**
- Maximal 1 Anwendung in der Anwendung und max. 2 pro Kultur/Jahr
- Die Notfallzulassung gilt für 39.300 kg

In den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und Sachsen-Anhalt ist zu oben genannter Anwendung eine zweite, zusätzliche Behandlung zulässig:

- **Anwendungszeitpunkt: nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf**
- **Stadium der Kultur: bis BBCH 19**
- Maximal 1 Anwendung in der Anwendung und max. 2 pro Kultur/Jahr
- Min. Abstand zur ersten Behandlung: 21 Tage

Exirel (100 g/kg Cyantraniliprole)

- Vom **14.08.2026** bis **11.12.2026** zum **Bekämpfen von Rapserrdfloh in Raps (BRSNN)**
- Anwendung mit **0,4 l/ha in 200-600 l Wasser/ha**
- **Anwendungszeitpunkt: nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf**
- **Stadium der Kultur: ab BBCH 10**
- Maximal 1 Anwendung in der Anwendung und max. 2 pro Kultur/Jahr
- Die Notfallzulassung gilt für 157.200 l

In den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und Sachsen-Anhalt ist zu oben genannter Anwendung eine zweite, zusätzliche Behandlung zulässig:

- **Anwendungszeitpunkt: nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf**
- **Stadium der Kultur: ab BBCH 16**
- Maximal 1 Anwendung in der Anwendung und max. 2 pro Kultur/Jahr
- Min. Abstand zur ersten Behandlung: 14 Tage

Ackerfuchsschwanz-Bekämpfung

Luxinum (750 g/L Cinmethylin)

- Vom **01.09.2026** bis **29.12.2026** zum **Bekämpfen von Acker-Fuchsschwanz** in **Winterweichweizen (TRZAW)**
- Die Notfallzulassung gilt für 266.800 L bzw. 400.000 ha
- Anwendung mit **0,667 l/ha in 100-400 l Wasser/ha**
- **Anwendungszeitpunkt: Vor dem Auflaufen oder Nach dem Auflaufen**
- **Stadium der Kultur: BBCH 00 – 09 oder 10 - 29**
- Maximal 1 Anwendung pro Kultur/Jahr

Das Mittel Luxinum darf nur 1x in der Kultur angewendet werden. Dies kann aber entweder im Voraufbau geschehen, oder im Nachauflaufen von BBCH 10 - 29.