



Landessortenversuche

Ackerbau / Information vom 19.08.2026

Vorläufige Ergebnisse der Landessortenversuche mit Wintertriticale 2024-2026

Anbaubereich Verwitterungsböden

Relativer Ertrag: Korn (%)

Sorte	(B)	Typ	ohne Fungizid- und ohne bzw. mit reduziertem Wachstumsreglereinsatz			mit ortsüblichem Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz		
			2024 n = 4	2025 n = 5	2026 n = 5	2024 n = 4	2025 n = 5	2026 n = 5
Lombardo	x	k	95	101	104	98	102	103
Rivolt	x	k	98	100	98	102	102	100
Trias	x	k	102	100	99	104	99	100
Tributo	x	k	109	104	104	101	102	101
Fantastico	x	k	103	97	99	99	98	101
RGT Zigzac		k			100			100
Lumaco	x	l	96	100	94	99	98	97
Bicross	x	l	96	99	101	96	98	98
Trimobe		l			98			96
Rugiro		l			104			101
RGT Comebac		l			104			102
Mittel (B) dt/ha			85,4	84,7	81,8	97,1	90,1	89,3

(B) = Sorten der Bezugsbasis

Typ: Pflanzenlänge k = kurz, l = lang

Wintertriticale wird in den ostdeutschen Bundesländern länderübergreifend für das Anbaubereich der Verwitterungsböden ausgewertet. An der Prüfung von Wintertriticale beteiligten sich Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Thüringer Landessortenversuche (LSV) standen 2026 in Burkersdorf und Heßberg.

Sorten mit besonderer Eignung für Thüringen auf einen Blick:

Lombardo (stärkere Krankheitsanfälligkeit beachten), **Tributo** (auch für den Anbau mit reduziertem PSM-Einsatz), **Fantastico** (starke Mehltau- und stärkere Gelbrostanfälligkeit beachten)
für den gezielten Anbau langstrohiger Sorten: **Lumaco** (Schwächen in der Winter- und Standfestigkeit beachten), **Bicross** (Schwächen in der Winterfestigkeit beachten)

Beschreibung der Sorten mit besonderer Eignung für Thüringen:

Lombardo: war 2026 insgesamt die ertragsstärkste Sorte und mehrjährig bei ortsüblicher Intensivierung mittlere bis leicht überdurchschnittliche Kornerträge; sehr winterfest; mittlere Standfestigkeit; für Gelbrost stärker sowie für Braunrost stark anfällig, auch Befall mit Mehltau kann auftreten (deshalb Intensivierungsmaßnahmen einplanen; mittleres bis geringeres Hektolitergewicht; im Sortenvergleich mittlere Auswuchsfestigkeit

Tributo: hob sich in der extensiven Prüfstufe erneut mit überdurchschnittlich hohen Kornerträgen ab, bei ortsüblicher Behandlung mittlere Kornerträge; spätes Ährenschieben und mittelspäte Reife; sehr winterhart; großkörnig; Absicherung der Standfestigkeit bei mittlerer Neigung zu Lager ratsam; überdurchschnittliche Blattgesundheit; vergleichsweise geringes Hektolitergewicht; mittlere bis geringe Auswuchsfestigkeit

Fantastico: mittlere Kornerträge; zeichnet sich durch gute Winter- und Standfestigkeit aus; für Gelbrost stärker und für Mehltau stark anfällig, aber widerstandsfähig gegen Braunrost und vor allem Rhynchosporium; hohes Hektolitergewicht; mittlere bis geringe Auswuchsfestigkeit

Lumaco: langstrohige Sorte; leicht unterdurchschnittliche Kornerträge in beiden Intensitätsstufen; etwas früher im Ährenschieben bei mittlerer Reife; geringere Winterfestigkeit; wegen stärkerer Neigung zu Lager auf ausreichende Absicherung der Standfestigkeit achten; mittlere bis gute Blattgesundheit; mittleres bis hohes Hektolitergewicht; mittlere Auswuchsfestigkeit

Bicross: langstrohige Sorte; bei ortsüblichem Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz leicht unterdurchschnittliche und bei reduziertem Pflanzenschutzmitteleinsatz mittlere Kornerträge; im Ährenschieben früh und in der Reife mittelfrüh; geringere Winterfestigkeit; knapp mittlere Standfestigkeit; stärker anfällig für Mehltau bei ansonsten guter bis sehr guter Blattgesundheit und geringer Anfälligkeit für Ährenfusarium; mittleres bis hohes Hektolitergewicht; mittlere bis geringe Auswuchsfestigkeit

Weitere Informationen sind über die Internetseite des TLLLR unter <https://tlllr.thueringen.de/wir/publikationen/landessortenversuche/lsv> verfügbar.