

## Gemüsebau 42/2026

Frankfurt (Oder), den 20.08.2026

### Zulassungsinformationen

#### Notfallzulassung nach Art. 53 Verordnung (EG) Nr. 1107/ 2009

**SIVANTO prime** (*Flupyradifurone*) Zulassungsnummer: 008264-00 Zulassung bis 09.12.2026

Notfallzulassung für 120 Tage gilt vom 13. August 2026 bis zum 10. Dezember 2026

| <i>Kultur(en)</i>                                                                                                                                                                                                          | <i>Aufwandmenge<br/>Anwendungshäufigkeit</i>                                           | <i>Wartezeit<br/>(Tage)</i> | <i>Anwendungsgebiet/<br/>Bemerkungen</i>                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spinat und verwandte Arten</b><br>(NNNSA)                                                                                                                                                                               | Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,625 l/ ha in 300 - 600 l/ha Wasser | 3                           | <b>Blattläuse, Weiße Fliege</b><br>BBCH 12-41,<br>nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf         |
| <b>Salate</b> (LACSS),<br><b>Rucola-Arten</b><br>(NNNRA),<br><br>Nutzung als Baby-<br>Leaf-Salat:<br><b>Wurzel- und Knollengemüse</b><br>(NNNVW), <b>Blatt- und Stielgemüse</b> (NNNVL),<br><b>Hülsengemüse</b><br>(NNNLG) | Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,625 l/ ha in 300 - 600 l/ha Wasser | 3                           | BBCH 12-41<br><br><b>Blattläuse</b><br>bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome,<br><br>BBCH 12-18 |
| <b>Rhabarber</b> (RHERH)                                                                                                                                                                                                   | Freiland, Spritzen, max. 1x pro Jahr/ Kultur, AWM 0,625 l/ ha in 300 - 600 l/ha Wasser | F                           | <b>Zikaden</b><br>nach Befallsbeginn bzw. nach Warndienstaufruf, nach der Ernte                                         |

| Fortsetzung SIVANTO prime                                                                         |                                                                                               |                                                           |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kultur(en)                                                                                        | Aufwandmenge<br>Anwendungshäufigkeit                                                          | Wartezeit<br>(Tage)                                       | Anwendungsgebiet/<br>Bemerkungen                                                                                      |
| <b>Blattkohle</b> (NNNKB)<br>(ausgenommen<br>Barbarakraut) (BARVE)<br>und Sareptasenf<br>(BRSJU)) | Freiland, Spritzen, max. 1x pro<br>Jahr/ Kultur, AWM 0,625 l/ ha<br>in 200 - 1000 l/ha Wasser | 3                                                         | <b>Blattläuse, Weiße Fliege</b><br>BBCH 41-49,<br>nach Erreichen von<br>Schwellenwerten oder<br>nach Warndienstaufruf |
| <b>Kohlrabi</b> (BRSOG)                                                                           |                                                                                               |                                                           | <b>Blattläuse</b><br>BBCH 41-49,<br>nach Erreichen von<br>Schwellenwerten oder<br>nach Warndienstaufruf               |
| <b>Frische Kräuter</b><br>(NNNKF)<br>ausgenommen<br>Borretsch                                     | Freiland, Spritzen, max. 1x pro<br>Jahr/ Kultur, AWM 0,625 l/ ha<br>in 300 - 600 l/ha Wasser  | 3<br>Liebstöckel,<br>Große und<br>Kleine<br>Brennessel: 7 | <b>Blattläuse, Weiße Fliege</b><br>BBCH 12-49,<br>bei Befallsbeginn bzw.<br>Sichtbarwerden der<br>ersten Symptome     |

**Anwendungsbestimmungen und Auflagen:** NB6612 (B1), NW470, NG371.1189, NT101-1, NW609-2, (NG372.1189 ab Kulturstadium BBCH 12), NW705, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

**ORONDIS Vip** (Metalaxyl-M + Oxathiapiprolin)

Zulassungsnummer: 00B074-00

Zulassung bis 03.03.2028

Notfallzulassung für 120 Tage gilt vom 13. August 2026 bis zum 10. Dezember 2026

| Kultur(en)                                           | Aufwandmenge<br>Anwendungshäufigkeit                                                       | Wartezeit<br>(Tage)               | Anwendungsgebiet/<br>Bemerkungen                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Radieschen</b> (RAPSR),<br><b>Rettich</b> (RAPSN) | Freiland, Spritzen, max. 1x pro<br>Jahr/ Kultur, AWM 0,5 l/ ha<br>in 400 - 600 l/ha Wasser | Radieschen:<br>14,<br>Rettich: 21 | <b>Weißer Rost</b> ( <i>Albugo candida</i> )<br>ab BBCH 41<br>bei Infektionsgefahr bzw.<br>ab Warndiensthinweis |

**Anwendungsbestimmungen und Auflagen:** NB6641 (B4), NW470, NW642-1, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!

## Zulassungserweiterung nach Art. 51 Verordnung (EG) Nr. 1107/ 2009

**MOSPILAN SG (Acetamiprid)** Zulassungsnummer: 035655-00

Zulassung bis 28.02.2034

| Kultur(en)                      | Aufwandmenge<br>Anwendungshäufigkeit                                                                                            | Wartezeit<br>(Tage) | Anwendungsgebiet/<br>Bemerkungen                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /02-006<br><b>Gurke</b> (CUMSA) | Freiland, Spritzen, max. 2x<br>pro Jahr/ Kultur, AWM 0,15<br>kg/ha in 600-1200 l/ha<br>Wasser, im Abstand von 7 bis<br>14 Tagen | 3                   | <b>Blattläuse</b> ,<br>BBCH 51-89, bei Befallsbeginn<br>bzw. bei Sichtbarwerden der<br>ersten Symptome |

**Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4), NW605-2, NW606, NT102-1, SS230** weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

**Belanty (Mefentrifluconazole)** Zulassungsnummer: 00A480-00

Zulassung bis 20.03.2030

| Kultur(en)                                                                                            | Aufwandmenge<br>Anwendungshäufigkeit                                                                                         | Wartezeit<br>(Tage) | Anwendungsgebiet/ Bemerkungen                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /04-032<br>/04-033<br><b>Aubergine</b> (SOLME),<br><b>Tomate</b> (LYPES)                              | Freiland, Spritzen, max. 1x<br>pro Jahr/ Kultur, AWM 1,5<br>l/ha in 400-1000 l/ha<br>Wasser                                  | 3                   | <b>Alternaria-Arten, Echte<br/>Mehltaupilze</b><br>BBCH 14-89, bei Infektionsgefahr<br>bzw. ab Warndiensthinweis                                                                        |
| /04-022<br>/04-023<br>/04-024<br><b>Blumenkohl</b><br>(BRSOB), <b>Brokkoli</b><br>(BRSOK)             | Freiland, Spritzen, max. 2x<br>pro Jahr/ Kultur, AWM 1,5<br>l/ha in 200-1000 l/ha<br>Wasser, im Abstand von<br>min. 7 Tagen  | 14                  | <b>Alternaria-Arten,<br/>Ringfleckkrankheit</b><br>( <i>Mycosphaerella brassicola</i> ), <b>Echte<br/>Mehltaupilze</b><br>BBCH 14-49, bei Infektionsgefahr<br>bzw. ab Warndiensthinweis |
| /04-037<br>/04-039<br>/04-040<br><b>Gurke</b> (CUMSA),<br><b>Zucchini</b> (CUUPG)                     | Freiland, Spritzen, max. 1x<br>pro Jahr/ Kultur, AWM 1,5<br>l/ha in 400-1000 l/ha<br>Wasser                                  | 3                   | <b>Echte Mehltäupilze, Stängelbrand</b><br>( <i>Didymella bryoniae</i> ), <b>Alternaria-<br/>Arten</b><br>BBCH 14-89, bei Infektionsgefahr<br>bzw. ab Warndiensthinweis                 |
| /04-001<br><b>Kichererbse</b> (CIEAR),<br><b>Speiselinsen</b><br>(LENCU),<br>Hülsenfrüchte<br>trocken | Freiland, Spritzen, max. 2x<br>pro Jahr/ Kultur, AWM 1,3<br>l/ha in 100-400 l/ha Wasser,<br>im Abstand von min. 10<br>Tagen  | F                   | <b>Ascochyta-Arten</b><br>BBCH 51-72, bei Infektionsgefahr<br>bzw. ab Warndiensthinweis,<br><b>NT140</b>                                                                                |
| /04-011<br>/04-012<br>/04-013<br><b>Rosenkohl</b> (BRSOB)                                             | Freiland, Spritzen, max. 2x<br>pro Jahr/ Kultur, AWM 1,5<br>l/ha in 200-1000 l/ha<br>Wasser, im Abstand von<br>min. 10 Tagen | 14                  | <b>Alternaria-Arten,<br/>Ringfleckkrankheit</b><br>( <i>Mycosphaerella brassicola</i> ),<br><b>Echter Mehltau</b><br>BBCH 14-49, bei Infektionsgefahr<br>bzw. ab Warndiensthinweis      |

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!

| Fortsetzung Belanty                                                                      |                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kultur(en)                                                                               | Aufwandmenge<br>Anwendungshäufigkeit                                                                                        | Wartezeit<br>(Tage) | Anwendungsgebiet/ Bemerkungen                                                                                                                                           |
| /04-014<br>/04-016<br>/04-017<br><b>Spargel</b> (ASPOF),                                 | Freiland, Spritzen, max. 3x<br>pro Jahr/ Kultur, AWM 1,5<br>l/ha in 200-800 l/ha Wasser,<br>im Abstand von min. 14<br>Tagen | F                   | <b>Stemphylium-Arten, Botrytis-Arten, Spargelrost</b> ( <i>Puccinia asparagi</i> )<br>BBCH 51-89, bei Infektionsgefahr<br>bzw. ab Warndiensthinweis,<br><b>NW 609-2</b> |
| /04-006<br>/04-007<br>/04-008<br>/04-010<br><b>Wurzel- und Knollengemüse</b><br>(NNNVW), | Freiland, Spritzen, max. 3x<br>pro Jahr/ Kultur, AWM 1,5<br>l/ha in 200-1000 l/ha<br>Wasser, im Abstand von<br>min. 7 Tagen | 3                   | <b>Cercospora-Arten, Alternaria-Arten, Echte Mehltupilze, Ramularia-Arten</b><br>BBCH 12-49, bei Infektionsgefahr<br>bzw. ab Warndiensthinweis                          |

**Anwendungsbestimmungen und Auflagen:** NB6641 (B4), SF275-EEGE, SF282 NW470, (NW609-2 bei ausgewählten Indikationen), NW262, NW264, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

**ENERVIN Pro** (Ametoctradin + Kaliumphosphonat)

Zulassungsnummer: 00A695-00

Zulassung bis 31.12.2026

| Kultur(en)                                                                    | Aufwandmenge<br>Anwendungshäufigkeit                                                                                        | Wartezeit<br>(Tage) | Anwendungsgebiet/ Bemerkungen                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| /06-002<br><b>Salat-Arten</b><br>(NNNSS),<br>/06-003<br><b>Spinat</b> (SPQOL) | Freiland, Spritzen, max. 2x<br>pro Jahr/ Kultur, AWM 3,2<br>l/ha in 400-1000 l/ha<br>Wasser, im Abstand von<br>7 – 10 Tagen | 7                   | <b>Falsche Mehltupilze</b><br>BBCH 41-49, bei Infektionsgefahr<br>bzw. ab Warndiensthinweis |

**Anwendungsbestimmungen und Auflagen:** NB6641 (B4), NW470, NG338-1, NW 609-2, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!

| Kultur(en)                                             | Aufwandmenge<br>Anwendungshäufigkeit                                                       | Wartezeit<br>(Tage) | Anwendungsgebiet/ Bemerkungen                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /14-001<br><b>Spargel</b><br>(ASPOF)<br>Ertragsanlagen | Freiland, Spritzen, max.<br>1x pro Jahr/ Kultur,<br>AWM 0,5 l/ha in 200-400<br>l/ha Wasser | F                   | <b>Einjährige zweikeimblättrige<br/>Unkräuter</b><br>nach der Ernte, vor dem Auflaufen der<br>Unkräuter, Anwendungstechnik mit<br>Reihenbehandlung/<br>Unterblattbehandlung/ Abschirmung |

**Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4), NG403, NW605-2, NW606, NW706, NW468, NW264, NW265, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.**

| Kultur(en)                                                                                  | Aufwandmenge<br>Anwendungshäufigkeit                                                                                                                        | Wartezeit<br>(Tage) | Anwendungsgebiet/ Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /16-001<br><b>Grünspargel</b><br>(ASPOG)                                                    | Freiland, Spritzen, max.<br>1x pro Jahr/ Kultur, 0,7<br>l/ha in 200-400 l/ha<br>Wasser                                                                      | 21                  | <b>Amarant-Arten (Amaranthus), Kamille-<br/>Arten (Matricaria), Schadhirsen</b><br>vor dem Durchstoßen,<br><b>NT102-1, NW705,</b>                                                                                                            |
| /16-002<br><b>Spargel</b><br>(ASPOF)<br>/16-003<br><b>Spargel</b><br>(ASPOF)<br>Junganlagen | Freiland, Spritzen, max.<br>2x pro Jahr/ Kultur,<br>AWM 0,7 l/ha in 200-400<br>l/ha Wasser und 0,5 l/ha<br>in 200-400 l/ha Wasser<br>im Abstand von 7 Tagen | F                   | <b>Amarant-Arten (Amaranthus), Kamille-<br/>Arten (Matricaria), Schadhirsen</b><br>nach dem Stechen, im Splittingverfahren<br>/ Bandbehandlung,<br><b>NT103-1, NW706</b><br>ab Pflanzjahr bis einschl. 3. Standjahr,<br>nach dem Durchstoßen |

**Anwendungsbestimmungen und Auflagen: NB6641 (B4), NW609-2, NW800, SF274-1, SF555-1, VA271, NW470, SF275-2GE, VA263-1, weitere Anwendungsbestimmungen und Auflagen beachten.**

## Zulassungsverlängerungen (nur Hauptzulassungen)

| Pflanzenschutzmittel | Wirkstoff          | Zulassungsnr. | verlängert bis |
|----------------------|--------------------|---------------|----------------|
| <b>Insektizide</b>   |                    |               |                |
| TARAK                | lambda-Cyhalothrin | 007213-00     | 30.06.2027     |

Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitung sowie die Auflagen zum Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutz einzuhalten!