

Landessortenversuche

Ackerbau / Information vom 21.08.2026

Vorläufige Ergebnisse der Landessortenversuche mit Winterweizen 2024-2026

Relativer Ertrag: Korn (%), mit ortsüblichem Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz

Sorte	Qual. Gr.	Lössböden				Verwitterungsböden			
		(B)	2024 n = 8	2025 n = 9	2026 n = 6	(B)	2024 n = 5	2025 n = 4	2026 n = 5
KWS Emerick	E	x	97	95	96	x	95	100	98
Moschus	E	x	91	88	93	x	92	96	97
Ponticus	E	x	89	91	98				
Exsal	E	x	97	97	97	x	99	99	94
Emmert	E			98	101			104	102
Absolut	A	x	95	99	101				
Adrenalin	A	x	101	102	103	x	104	102	103
Ambientus	A	x	97	100	102	x	94	97	100
LG Kermit	A	x	106	106	102	x	104	102	105
LG Optimist	A	x	103	105	107		100	106	104 ¹⁾
Polarkap	A	x	103	98	99				
RGT Kreation	A	x	102	103	102	x	101	100	102
SU Jonte	A	x	103	99	95	x	101	97	99
SU Magnetron	A	x	99	104	102	x	94	103	96
SU Tarroca	(A)	x	103	105	103	x	103	101	102
Filius	A			100	101				
Intensity	A			106	105			102	100
Karouke	(A)				108				98
Pondor	(A)								103
Pontiform	(A)				100				103
KWS Lonnie	A				101				94
SU Horizon	A								107
Informer	B	x	106	102	98	x	106	99	102
Spectral	B	x	108	105	101	x	108	104	103
RGT Kreuzer	B				103				104
Eriksen	B _K								105
LG Resonanz	B								100
Balzac	(C)			103	104				
SY Transition	(C)								97
Mittel (B) dt/ha			98,4	102,9	87,1		91,0	80,2	88,0

(B) = Sorten der Bezugsbasis

¹⁾ = Sorte LG Optimist 2026 mit geringerer Anzahl Orte (n = 4)

Winterweizen wird in den ostdeutschen Bundesländern länderübergreifend für die Anbauggebiete der Löss- (Lö) und der Verwitterungsböden (V) ausgewertet. An der Prüfung von Winterweizen beteiligten sich Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Thüringer Landessortenversuche (LSV) standen in Dornburg, Friemar und Kirchengel (Lö) sowie Burkersdorf und Heßberg (V). Die Erträge des Standortes Dornburg 2026 wurden nicht in die Mittelwertbildung einbezogen.

Sorten mit besonderer Eignung für die Aussaat 2026 in Thüringen:

Sorte	Eignung im An- baue- biet		RP-Gehalt	Fallzahlsicherheit	Hektolitergewicht	Stickstoffeffizienz	Reifezeit	Winterfestigkeit	Standfestigkeit	stärkere oder starke Anfälligkeit für:
	Lössböden	Verwitterungs- böden								
E-Weizen										
Sorten mit hohem bis sehr hohem RP-Gehalt										
Moschus ¹⁾	X	X	++	++	+	0	m	+	0/+	
Ponticus ¹⁾	X		++	++	+	0/+	m	+	+	Septoria
Sorten mit mittlerem bis hohem RP-Gehalt (auch zur gezielten A-Weizenproduktion)										
KWS Emerick	X	X	+	0/+	+	0/+	m	++	0/+	Braunrost
Exsal ²⁾	X	X	0/+	+	0/+	0/+	m	0/- ²⁾	+	Gelbrost, DTR
Emmert	(X)	(X)	+	(++)	0	#	m	(+)	0/+	Braunrost, (Gelbrost)
A-Weizen										
Sorten mit mittlerem bis hohem RP-Gehalt										
Ambientus ³⁾	X	X	0/+	+	0/+	0/+	m	+	0/- ³⁾	Mehltau, (Gelbrost)
Absolut ²⁾	X		0/+	+	+	0/+	mfr	0/- ²⁾	0/+	Gelbrost
SU Magnetron ²⁾	X	X	0/+	0/- ²⁾	0	+	mfr	0/- ²⁾	+	Gelbrost, DTR
Sorten mit mittlerem RP-Gehalt										
Polarkap ³⁾	X		0	0	0/+	0/+	m	++	0/- ³⁾	Gelbrost, Braunrost
SU Jonte	X	X	0	+	0	0	m	+	0/+	Mehltau, Braunrost
Sorten mit geringerem RP-Gehalt										
RGT Kreation ³⁾	X	X	0/-	+	0	0	msp	0	0/- ³⁾	Gelbrost
Adrenalin ^{2), 3)}	X	X	0/-	0/- ²⁾	0/+	0/+	m	+	0/- ³⁾	Septoria, Braunrost
Intensity ²⁾	(X)	(X)	0/-	+	0	#	mfr	(0/- ²⁾)	+	
Sorten mit geringem RP-Gehalt										
LG Optimist ³⁾	X	X	-	+	0	0	m	++	- ³⁾	Mehltau
B-Weizen										
Spectral	X	X	--	0/+	0	0/-	msp	0	0/+	(Gelbrost)

(X) = Eignung vorläufig / Probeanbau

0 = mittel; + = überdurchschnittlich; - = unterdurchschnittlich; (...) = vorläufig; # = derzeit ohne Einschätzung

¹⁾ Vertragsanbau anstreben

²⁾ bei Winterfestigkeit Anbauumfang begrenzen bzw. bei Fallzahlsicherheit Anbauumfang und Druschfolge anpassen

³⁾ Wachstumsreglereinsatz ist der insgesamt stärkeren oder starken Lagerneigung anzupassen

Weitere Informationen sind über die Internetseite des TLLLR unter <https://tlllr.thueringen.de/wir/publikationen/landessortenversuche/lsv> verfügbar.

Copyright: Diese Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe oder der Weitergabe an Dritte sind dem Herausgeber vorbehalten.