# Zulassungsstand Spargel

| Mittel<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | Schadorganismus/Zweck<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte) |
|---|---|---|
| **1a. Jungpflanzen (Freiland)** | | |
| Akarizide und Insektizide | | |
| **Spruzit Neu**<br>*Pyrethrine*<br>*Rapsöl*<br>*IRAC-Code 3A*<br>*IRAC-Code UNE*<br>024780-60<br>31.03.2027<br>B4, NB6641, NN410 | **Beißende Insekten**<br>6 l/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 5 Tage<br>Stellflächen (Freiland), Jungpflanzen in Anzuchtgefäßen; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen; Das eingesetzte Rapsöl muss Lebensmittelqualität haben (VH319); Schäden bei Sonneneinstrahlung nach Anwendung möglich (WP732)<br>*NW607-1 (75% 15m, 90% 10m)*<br>*SF245-02* | F |
| **Raptol HP**<br>*Pyrethrine*<br>*IRAC-Code 3A*<br>00A122-60<br>30.04.2029<br>B2, NB6621 | **Blattläuse**<br>0,6 l/ha; max. 2/2; Abstand: 5 Tage<br>Jungpflanzenanzucht auf Stellflächen (FX); spritzen; Stadium Kultur: BBCH 11-16; Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen<br>*NW605-1 (50% 5m, 75% *, 90% *); NW606 (5m); NW701*<br>*SF245-02* | F |
| **Raptol HP**<br>*Pyrethrine*<br>*IRAC-Code 3A*<br>00A122-60<br>30.04.2029<br>B2, NB6621 | **Freifressende Schmetterlingsraupen**<br>0,6 l/ha; max. 2/2; Abstand: 5 Tage<br>Jungpflanzenanzucht auf Stellflächen (FX); spritzen; Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen; Stadium, Kultur: BBCH 11-16<br>*NW605-1 (50% 5m, 75% *, 90% *); NW606 (5m); NW701*<br>*SF245-02* | F |
| **Spruzit Neu**<br>*Pyrethrine*<br>*Rapsöl*<br>*IRAC-Code 3A*<br>*IRAC-Code UNE*<br>024780-60<br>31.03.2027<br>B4, NB6641, NN410 | **Saugende Insekten**<br>6 l/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 7 Tage<br>Jungpflanzen; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen; Das eingesetzte Rapsöl muss Lebensmittelqualität haben (VH319); Schäden bei Sonneneinstrahlung nach Anwendung möglich (WP732)<br>*NW607-1 (75% 15m, 90% 10m)*<br>*SF245-02* | F |

# Zulassungsstand Spargel

| **Mittel**<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | **Schadorganismus/Zweck**<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | **Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)** |
|---|---|---|
| **1a. Jungpflanzen (Freiland)** | | |
| Akarizide und Insektizide | | |
| **Raptol HP**<br>*Pyrethrine*<br>*IRAC-Code 3A*<br><br>00A122-60<br>30.04.2029<br>B2, NB6621 | **Thripse**<br>0,6 l/ha; max. 2/2; Abstand: 5 Tage<br>Jungpflanzenanzucht auf Stellflächen (FX); spritzen; Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen; Stadium Kultur: BBCH 11-16<br>*NW605-1 (50% 5m, 75% *, 90% *); NW606 (5m); NW701*<br>*SF245-02* | **F** |

# Zulassungsstand Spargel

| Mittel<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | Schadorganismus/Zweck<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte) |
|---|---|---|
| **1b. Jungpflanzen (Gewächshaus)** | | |
| Akarizide und Insektizide | | |
| **Spruzit Neu**<br>*Pyrethrine*<br>*Rapsöl*<br>*IRAC-Code 3A*<br>*IRAC-Code UNE*<br>024780-60<br>31.03.2027<br>B4, NB6641, NN410 | **Beißende Insekten, Saugende Insekten**<br>6 l/ha; max. 4/4; Abstand: mind. 7 Tage<br>Gewächshaus; Jungpflanzen; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen; Das eingesetzte Rapsöl muss Lebensmittelqualität haben (VH319); Schäden bei Sonneneinstrahlung nach Anwendung möglich (WP732)<br>*SF245-02* | **F** |
| **Neudosan Neu**<br>*Fettsäure-Kaliumsalze (Kali-Seife)*<br>*IRAC-Code UN*<br>034207-60<br>01.12.2027<br>B4, NB6641, NN410 | **Blattläuse**<br>Pflanzengröße bis 50cm: 18 l/ha; max. 5/5; Abstand: 5-7 Tage<br>Jungpflanzenanzucht (Gewächshaus); spritzen; behandeln bis zur sichtbaren Benetzung; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen; Bei Sonneneinstrahlung nach Anwendung Schäden an Kulturpflanzen möglich (WP732)<br>*SF245-02* | **F** |
| **Raptol HP**<br>*Pyrethrine*<br>*IRAC-Code 3A*<br>00A122-60<br>30.04.2029<br>B2, NB6621 | **Blattläuse**<br>0,6 l/ha; max. 2/2; Abstand: 7 Tage<br>Jungpflanzenanzucht; spritzen; Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen; Stadium Kultur: BBCH 11-16; Anwendung nur in Gewächshäusern bzw. Folientunneln, alle Seitenwände müssen während Anwendung geschlossen sein (NZ115)<br>*SF245-02* | **F** |
| **Raptol HP**<br>*Pyrethrine*<br>*IRAC-Code 3A*<br>00A122-60<br>30.04.2029<br>B2, NB6621 | **Freifressende Schmetterlingsraupen**<br>0,6 l/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 7 Tage<br>Jungpflanzenanzucht; spritzen; Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen; Stadium Kultur: BBCH 11-16; Anwendung nur in Gewächshäusern bzw. Folientunneln, alle Seitenwände müssen während Anwendung geschlossen sein (NZ115)<br>*SF245-02* | **F** |

# Zulassungsstand Spargel

| Mittel<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | Schadorganismus/Zweck<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte) |
|---|---|---|
| **1b. Jungpflanzen (Gewächshaus)** | | |
| Akarizide und Insektizide | | |
| **Raptol HP**<br>*Pyrethrine*<br>*IRAC-Code 3A*<br>00A122-60<br>30.04.2029<br>B2, NB6621 | **Thripse**<br>0,6 l/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 7 Tage<br>Jungpflanzenanzucht; spritzen; Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen; Stadium Kultur: BBCH 11-16; Anwendung nur in Gewächshäusern bzw. Folientunneln, alle Seitenwände müssen während Anwendung geschlossen sein (NZ115)<br>*SF245-02* | **F** |
| **Gnatrol SC**<br>*Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (Serotyp H-14) AM 65-52*<br>*IRAC-Code 11A*<br>008500-00<br>15.08.2027<br>B4, NB6641 | **Trauermücken**<br>10 ml/m²; max. 3/3; Abstand: 4-7 Tage<br>Jungpflanzenanzucht (Gewächshaus); gießen; vor der Saat und nach dem Auflaufen (2. + 3. Behandlung); Stadium Kultur: bis BBCH 14; Stadium Schadorg.: ab Larve<br>*EO005-2* | **F** |

# Zulassungsstand Spargel

| Mittel<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | Schadorganismus/Zweck<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte) |
|---|---|---|
| **1b. Jungpflanzen (Gewächshaus)** | | |
| Fungizide | | |
| **Serifel**<br>*Bacillus amyloliquefaciens Stamm MBI 600*<br>*FRAC-Code BM02*<br>008934-00<br>16.09.2027<br>B4, NB6641 | **Botrytis cinerea**<br>0,5 kg/ha; max. 3/6; Abstand: 5 Tage<br>Jungpflanzenanzucht (Gewächshaus); bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: BBCH 10-16; nur zur Befallsminderung und bei schwachem Befallsdruck<br>*SF245-02* | **F** |
| **Previcur Energy**<br>*Fosetyl*<br>*Propamocarb*<br>*FRAC-Code P07*<br>*FRAC-Code 28*<br>006219-00<br>31.10.2027<br>B4, NB6641 | **Pythium-Arten (Pythium spp.)**<br>3 ml/m²; max. 2/2; Abstand: 7-10 Tage<br>Jungpflanzenanzucht (Gewächshaus); gießen; nach der Saat<br>*EO005-1* | **F** |
| **Serifel**<br>*Bacillus amyloliquefaciens Stamm MBI 600*<br>*FRAC-Code BM02*<br>008934-00<br>16.09.2027<br>B4, NB6641 | **Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.)**<br>0,5 kg/ha; max. 3/6; Abstand: 5 Tage<br>Jungpflanzenanzucht (Gewächshaus); bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: BBCH 10-16; nur zur Befallsminderung und bei schwachem Befallsdruck<br>*SF245-02* | **F** |

# Zulassungsstand Spargel

| Mittel<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | Schadorganismus/Zweck<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte) |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Akarizide und Insektizide | | |
| **Karate Zeon**<br>*lambda-Cyhalothrin*<br>*IRAC-Code 3A*<br>024675-00<br>30.09.2026<br>B4, NB6641, NB6623, NN410 | **Beißende Insekten**<br>0,075 l/ha; max. 2/2; Abstand: 10-14 Tage<br>(Ertragsanlagen); bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen; Stadium Kultur: nach der Ernte<br>*NW607 (50% 10m, 75% 5m, 90% 5m), NT108*<br>*SF1891* | **F** |
| **Karate Zeon**<br>*lambda-Cyhalothrin*<br>*IRAC-Code 3A*<br>024675-00<br>30.09.2026<br>B4, NB6641, NB6623, NN410 | **Beißende Insekten**<br>0,075 l/ha; max. 2/2; Abstand: 10-14 Tage<br>(Junganlagen); bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen; Erntegut nicht verzehren (VV600)<br>*NW607 (50% 10m, 75% 5m, 90% 5m), NT108*<br>*SF1891* | **F** |
| **Spruzit Neu**<br>*Pyrethrine*<br>*Rapsöl*<br>*IRAC-Code 3A*<br>*IRAC-Code UNE*<br>024780-60<br>31.03.2027<br>B4, NB6641, NN410 | **Beißende Insekten**<br>Pflanzengröße bis 50cm: 6 l/ha, 50-125cm: 9 l/ha, über 125cm: 12 l/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 7 Tage<br>spritzen; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen; Das eingesetzte Rapsöl muss Lebensmittelqualität haben (VH319); Schäden bei Sonneneinstrahlung nach Anwendung möglich (WP732)<br>*NW607-1 (90% 20m), NT101*<br>*SF245-02* | **F** |
| **Spruzit Neu**<br>*Pyrethrine*<br>*Rapsöl*<br>*IRAC-Code 3A*<br>*IRAC-Code UNE*<br>024780-60<br>31.03.2027<br>B4, NB6641, NN410 | **Beißende Insekten (ausgenommen: Minierfliegen, verstecktfressende Schmetterlingsraupen)**<br>Pflanzengröße bis 50cm: 6 l/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 7 Tage<br>(Nur in Grünspargel; Jung- und Ertragsanlagen); bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome; Stadium Kultur: ab BBCH 09; Das eingesetzte Rapsöl muss Lebensmittelqualität haben (VH319); Schäden bei Sonneneinstrahlung nach Anwendung möglich (WP732)<br>*NW607-1 (75% 15m, 90% 10m)*<br>*SF245-02* | **3 Tage** |

# Zulassungsstand Spargel

| Mittel<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | Schadorganismus/Zweck<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte) |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Akarizide und Insektizide | | |
| **NeemAzal-T/S**<br>*Azadirachtin*<br>*IRAC-Code UN*<br>024436-00<br>31.01.2028<br>B4, NB6641 | **Beißende Insekten, Saugende Insekten**<br>3 l/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 7 Tage<br>(Ertrags- und Junganlagen); spritzen; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen, nach der Ernte<br>*NW609-1 (5m)*<br>*SF245-01* | **F** |
| **Eradicoat Max**<br>*Maltodextrin*<br>*IRAC-Code UN*<br>00A541-00<br>28.02.2027<br>B2, NB6621, NB506 | **Blattläuse**<br>60 l/ha (max. 20 ml Produkt/L Wasser); max. 20/20; Abstand: 3 Tage; Reduzierter Wasseraufwand führt zur Reduktion der Aufwandmenge u. kann die Wirksamkeit verringern<br>spritzen; nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf oder nach Befallsbeginn<br>*SF245-02* | **1 Tag** |
| **Micula**<br>*Rapsöl*<br>*IRAC-Code UNE*<br>043743-00<br>31.12.2027<br>B4, NB6641 | **Blattläuse**<br>Pflanzengröße bis 50cm: 12 l/ha, 50-125cm: 18 l/ha, über 125cm: 24 l/ha; max. 3/3; Abstand: 7-10 Tage<br>spritzen; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen<br>*NW642-1*<br>*SF245-01* | **F** |
| **Mospilan SG**<br>*Acetamiprid*<br>*IRAC-Code 4A*<br>005655-00<br>28.02.2027<br>B4, NB6641, NB6612, NN410 | **Blattläuse**<br>0,25 kg/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 7 Tage; Keine Anwendung in Kombination mit Netzmitteln (VV553)<br>spritzen; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen<br>*NW605-1 (50% 5m, 75%*, 90%*), NW606 (5m), NW706, NT103*<br>*EO005-1, SF245-01* | **F** |

# Zulassungsstand Spargel

| Mittel<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | Schadorganismus/Zweck<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte) |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Akarizide und Insektizide | | |
| **Neudosan Neu** | **Blattläuse (ausgenommen: Grüne Salatblattlaus/ Große Johannisbeerblattlaus)** | **F** |
| *Fettsäure-Kaliumsalze (Kali-Seife)* | Pflanzengröße bis 50cm: 18 l/ha, 50-125cm: 27 l/ha; max. 5/5; Abstand: 5-7 Tage | |
| *IRAC-Code UN* | spritzen; behandeln bis zur sichtbaren Benetzung; bei Befallsbeginn und bei Befall unter Beachtung der Schadensschwelle; Stadium Kultur: für kopfbildende Salate nur bis BBCH 41 | |
| 034207-60 | *NW605-1 (50% 5m, 75% 5m, 90%*), NW606 (10m), NW706* | |
| 01.12.2027 | *SF245-02* | |
| B4, NN410 | | |
| **Eradicoat/Kantaro** | **Blattläuse, Weiße Fliegen** | **F** |
| *Maltodextrin* | 37,5 l/ha; max. 20/20; Abstand: mind. 3 Tage; max. Anwendungskonz. darf 25 ml/l Wasser nicht überschreiten | |
| *IRAC-Code UN* | spritzen; bei Befallsbeginn; nur zur Befallsminderung; Schäden an Blüten möglich (WP746) | |
| 00A156-00 | *NW642-1* | |
| 28.02.2027 | *SF245-02* | |
| B2, NB6621, NB506 | | |
| **Karate Zeon** | **Erdraupen** | **F** |
| *lambda-Cyhalothrin* | 0,075 l/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 10 Tage | |
| *IRAC-Code 3A* | (Ertragsanlagen); nach der Ernte und bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen | |
| 024675-00 | *NW607-1 (50% 10m, 75% 5m, 90% 5m), NT108* | |
| 30.09.2026 | *SF1891* | |
| B4, NB6641, NB6623, NN410 | | |
| **Karate Zeon** | **Erdraupen** | **F** |
| *lambda-Cyhalothrin* | 0,075 l/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 10 Tage | |
| *IRAC-Code 3A* | (Junganlagen); bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen; Stadium Kultur: ab BBCH 11 | |
| 024675-00 | *NW607-1 (50% 10m, 75% 5m, 90% 5m), NT108* | |
| 30.09.2026 | *SF1891* | |
| B4, NB6641, NB6623, NN410 | | |

# Zulassungsstand Spargel

| Mittel<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | Schadorganismus/Zweck<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte) |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Akarizide und Insektizide | | |
| **XenTari** | **Eulenarten (Noctuidae)** | **9 Tage** |
| *Bacillus thuringiensis subsp. aizawai Stamm ABTS-1857* | 1 kg/ha; max. 5/5; Abstand: 5-7 Tage | |
| *IRAC-Code 11A* | spritzen; nach Befallsbeginn oder ab Warndienstaufruf, ab Schlüpfen der ersten Larven, Stadium Kultur: ab BBCH 11; Stadium Schadorg.: Larvenstadium L1-L2; Nicht mit UV-Stabilisatoren anwenden (VA302) | |
| 024426-00 | *NW642-1* | |
| 30.04.2027 | *SF245-01* | |
| B4, NB6641 | | |
| **DiPel DF** | **Freifressende Schmetterlingsraupen** | **F** |
| *Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Stamm ABTS-351 (Stamm HD-1)* | 1 kg/ha; max. 8/8; Abstand: mind. 7 Tage | |
| *IRAC-Code 11A* | spritzen; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen; Stadium Schadorg.: ab Larvenstadium L1 | |
| 00A304-00 | *NW642-1* | |
| 15.08.2027 | *SF245-02* | |
| B4, NB6641 | | |
| **Raptol HP** | **Freifressende Schmetterlingsraupen** | **Grünspargel: 3 Tage, Spargel: F** |
| *Pyrethrine* | max. 1,2 l/ha (pro Behandl.); max. 2,4 l/ha (pro Jahr); max. 0,6 l/10000 m² LWF; max. 2/2; Abstand: mind. 5 Tage | |
| *IRAC-Code 3A* | spritzen; Stadium Kultur: BBCH 11-34; Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen | |
| 00A122-60 | *NW605-1 (50% 10m, 75% 5m, 90% 5m); NW606 (15m); NW701* | |
| 30.04.2029 | *SF245-02* | |
| B2, NB6621 | | |

# Zulassungsstand Spargel

| **Mittel**<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | **Schadorganismus/Zweck**<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | **Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)** |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Akarizide und Insektizide | | |
| **XenTari** | **Freifressende Schmetterlingsraupen (ausgenommen Eulenarten (Noctuidae))** | **9 Tage** |
| *Bacillus thuringiensis subsp. aizawai Stamm ABTS-1857* | 0,6 kg/ha; max. 5/5; Abstand: 5-7 Tage | |
| *IRAC-Code 11A* | spritzen; nach Befallsbeginn oder ab Warndienstaufruf, ab Schlüpfen der ersten Larven, Stadium Kultur: ab BBCH 11; Stadium Schadorg.: Larvenstadium L1-L2; Nicht mit UV-Stabilisatoren anwenden (VA302) | |
| 024426-00 | *NW642-1* | |
| 30.04.2027 | *SF245-01* | |
| B4, NB6641 | | |
| **Dipel ES** | **Freifressende Schmetterlingsraupen (ausgenommen: Eulenarten (Noctuidae))** | **F** |
| *Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki Stamm ABTS-351 (Stamm HD-1)* | 0,3 l/ha; max. 2/2; Abstand: 5-7 Tage | |
| *IRAC-Code 11A* | spritzen; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen; Stadium Kultur: ab BBCH 11; Nicht mit UV-Stabilisatoren anwenden (VA302) | |
| 024080-00 | *NW642-1* | |
| 15.08.2027 | *SF245-02* | |
| B4, NB6641 | | |
| **Raptol HP** | **Käfer** | **Grünspargel: 3 Tage, Spargel: F** |
| *Pyrethrine* | max. 1,2 l/ha (pro Behandl.); max. 2,4 l/ha (pro Jahr); max. 0,6 l/10000 m² LWF; max. 2/2; Abstand: mind. 5 Tage | |
| *IRAC-Code 3A* | spritzen; Stadium Kultur: BBCH 11-34; Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen | |
| 00A122-60 | *NW605-1 (50% 10m, 75% 5m, 90% 5m); NW606 (15m); NW701* | |
| 30.04.2029 | *SF245-02* | |
| B2, NB6621 | | |

# Zulassungsstand Spargel

| **Mittel**<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | **Schadorganismus/Zweck**<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | **Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)** |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Akarizide und Insektizide | | |
| **Spruzit Neu**<br>*Pyrethrine*<br>*Rapsöl*<br>*IRAC-Code 3A*<br>*IRAC-Code UNE*<br>024780-60<br>31.03.2027<br>B4, NB6641, NN410 | **Saugende Insekten**<br>Pflanzengröße bis 50cm: 6 l/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 7 Tage<br>(Nur in Grünspargel; Jung- und Ertragsanlagen); bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome; Stadium Kultur: ab BBCH 09; Das eingesetzte Rapsöl muss Lebensmittelqualität haben (VH319); Schäden bei Sonneneinstrahlung nach Anwendung möglich (WP732)<br>*NW607-1 (75% 15m, 90% 10m)*<br>*SF245-02* | **3 Tage** |
| **BENEVIA**<br>*Cyantraniliprole*<br>*IRAC-Code 28*<br>00A175-00<br>14.09.2027<br>B1, NB6611 | **Spargelfliege**<br>750 ml/ha; max. 1/1<br>(Junganlagen); spritzen, Bandbehandlung (max. 20% der Fläche behandeln, Mittelaufwand/ha bezieht sich auf die tatsächlich zu behandelnde Fläche in der Reihe o. im Band, NG722); nach dem Austrieb und bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen, späteste Behandl. 3 Wochen vor dem zu erwartenden Blühbeginn; Stadium Kultur: BBCH 09-55; Erntegut nicht verzehren (VV600)<br>*NG372.1182, NW605-2 (50% 5m, 75% 5m, 90% *), NW606 (10m), NT108-1*<br>*SF245-02* | **F** |
| **BENEVIA**<br>*Cyantraniliprole*<br>*IRAC-Code 28*<br>00A175-00<br>14.09.2027<br>B1, NB6611 | **Spargelfliege**<br>750 ml/ha; max. 1/1<br>(Ertragsanlagen); spritzen, Bandbehandlung (max. 20% der Fläche behandeln, Mittelaufwand/ha bezieht sich auf die tatsächlich zu behandelnde Fläche in der Reihe o. im Band, NG722); nach dem Stechen und bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome/Schadorganismen, späteste Behandlung 3 Wochen vor dem zu erwartenden Blühbeginn; Stadium Kultur: BBCH 09-55<br>*NG372.1182, NW605-2 (50% 5m, 75% 5m, 90% *), NW606 (10m), NT108-1*<br>*SF245-02* | **F** |
| **Mospilan SG**<br>*Acetamiprid*<br>*IRAC-Code 4A*<br>005655-00<br>28.02.2027<br>B4, NB6641, NB6612, NN410 | **Spargelhähnchen bzw. Spargelkäfer**<br>0,325 kg/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 7 Tage; Keine Anwendung in Kombination mit Netzmitteln (VV553)<br>spritzen; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen<br>*NW605-1 (50% 5m, 75% 5m, 90%*), NW606 (5m), NW706, NT103*<br>*EO005-1, SF245-01* | **F** |

# Zulassungsstand Spargel

| **Mittel**<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | **Schadorganismus/Zweck**<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | **Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)** |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Akarizide und Insektizide | | |
| **Eradicoat/Kantaro** | **Spinnmilben** | **F** |
| *Maltodextrin* | 37,5 l/ha; max. 20/20; Abstand: mind. 3 Tage; max. Anwendungskonz. darf 25 ml/l Wasser nicht überschreiten | |
| *IRAC-Code UN* | spritzen; bei Befallsbeginn; nur zur Befallsminderung; Schäden an Blüten möglich (WP746) | |
| 00A156-00 | *NW642-1* | |
| 28.02.2027 | *SF245-02* | |
| B2, NB6621, NB506 | | |

# Zulassungsstand Spargel

| Mittel<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | Schadorganismus/Zweck<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte) |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Fungizide | | |
| **Polyversum**<br>*Pythium oligandrum M1*<br>*FRAC-Code NC*<br>008470-00<br>30.04.2025<br>B4, NB6641 | **Auflaufkrankheiten**<br>0,05 kg/ha; max. 1/1<br>Saatgutbehandlung; vor der Saat; nur zur Befallsminderung<br>*SF245-01*<br>**Abverkaufsfrist: 30.10.2025, Aufbrauchfrist: 30.10.2026, Neuzulassung mit Zul.-Nr.: 028470-00** | F |
| **SWITCH**<br>*Cyprodinil*<br>*Fludioxonil*<br>*FRAC-Code 9*<br>*FRAC-Code 12*<br>034419-00<br>31.12.2026<br>B4, NB6641 | **Bodenpilze**<br>15 Minuten tauchen 0,2%; max. 1/1; Anwendungs- u. Restflüssigkeiten über Auffangsysteme fachgerecht gemäß KrWG entsorgen (NZ114)<br>Basispflanzgut; tauchen; vor dem Pflanzen<br>*SF1891* | F |
| **Luna Sensation**<br>*Fluopyram*<br>*Trifloxystrobin*<br>*FRAC-Code 7*<br>*FRAC-Code 11*<br>007214-00<br>30.06.2027<br>B4, NB6641 | **Botrytis cinerea**<br>0,8 l/ha; max. 2/2; Abstand: 10 Tage<br>spritzen; nach der Ernte; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome<br>*NW607-2 (50% 15m, 75% 10m, 90% 5m)*<br>*SF1891, SF245-02* | F |
| **Signum**<br>*Boscalid*<br>*Pyraclostrobin*<br>*FRAC-Code 7*<br>*FRAC-Code 11*<br>025483-00<br>15.12.2027<br>B4, NB6641 | **Botrytis cinerea**<br>1,5 kg/ha; max. 2/2; Abstand: 14-21 Tage<br>(Ertrags- und Junganlagen); spritzen; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome; Stadium Kultur: ab BBCH 69<br>*NW605 (50% 5m, 75% 5m, 90%*), NW606 (5m), NW604*<br>*SF245-02* | F |
| **VitiSan**<br>*Kaliumhydrogencarbonat*<br>*FRAC-Code NC*<br>027593-00<br>31.10.2037<br>B4, NB6641 | **Botrytis cinerea**<br>5 kg/ha; max. 6/6; Abstand: 5-7 Tage<br>(Junganlagen); spritzen; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome; nur zur Befallsminderung; Einstufung des BVL als Mittel mit geringem Risiko<br>*NW642-1*<br>*SF245-02* | F |

# Zulassungsstand Spargel

| **Mittel**<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | **Schadorganismus/Zweck**<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | **Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)** |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Fungizide | | |
| **VitiSan**<br>*Kaliumhydrogencarbonat*<br>*FRAC-Code NC*<br>027593-00<br>31.10.2037<br>B4, NB6641 | **Botrytis cinerea**<br>5 kg/ha; max. 6/6; Abstand: 5-7 Tage<br>(Ertragsanlagen); spritzen; nach der Ernte; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome; nur zur Befallsminderung; Einstufung des BVL als Mittel mit geringem Risiko<br>*NW642-1*<br>*SF245-02* | **F** |
| **Vacciplant**<br>*Laminarin*<br>*FRAC-Code P04*<br>00B457-00<br>28.02.2034<br>B4, NB6641 | **Botrytis cinerea, Echter Mehltau (Podosphaera aphanis)**<br>1,5 l/ha; max. 7/7; Abstand: 7 Tage<br>spritzen; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: BBCH 12-93<br>*NW642-1*<br>*SF245-02* | **1 Tag** |
| **Kenja**<br>*Isofetamid*<br>*FRAC-Code 7*<br>008662-00<br>15.09.2027<br>B4, NB6641 | **Botrytis cinerea, Laubkrankheit (Stemphylium vesicarium)**<br>1 l/ha; max. 2/2; Abstand: 14 Tage<br>spritzen; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: BBCH 35-87; Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen 1. Nov. und 15. Mrz. (NG403)<br>*NW642-1*<br>*SF245-02* | **F** |
| **SWITCH**<br>*Cyprodinil*<br>*Fludioxonil*<br>*FRAC-Code 9*<br>*FRAC-Code 12*<br>034419-00<br>31.12.2026<br>B4, NB6641 | **Botrytis cinerea, Laubkrankheit (Stemphylium vesicarium)**<br>1 kg/ha; max. 1/1<br>spritzen; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome; Stadium Kultur: BBCH 55-81<br>*NW605-1 (50% 10m, 75% 5m, 90% 5m), NW606 (15m), NW706, NT102*<br>*SF1891* | **F** |
| **SWITCH**<br>*Cyprodinil*<br>*Fludioxonil*<br>*FRAC-Code 9*<br>*FRAC-Code 12*<br>034419-00<br>31.12.2026<br>B4, NB6641 | **Botrytis cinerea, Laubkrankheit (Stemphylium vesicarium)**<br>0,7 kg/ha; max. 2/2; Abstand: 10-14 Tage<br>spritzen; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome; Stadium Kultur: BBCH 55-81<br>*NW605-1 (50% 10m, 75% 5m, 90% 5m), NW606 (15m), NW706, NT102*<br>*SF1891* | **F** |

# Zulassungsstand Spargel

| Mittel<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | Schadorganismus/Zweck<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte) |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Fungizide | | |
| **Serenade ASO**<br>*Bacillus amyloliquefaciens Stamm QST 713 (vormals B. subtilis)*<br>*FRAC-Code BM02*<br>007918-00<br>15.08.2027<br>B4, NB6641 | **Botrytis-Arten (Botrytis spp.), Sclerotium spp.**<br>8 l/ha; max. 6/6; Abstand: 5 Tage<br>spritzen; bei Befallsgefahr; nur zur Befallsminderung; Stadium Kultur: BBCH 12-49<br>*NW642-1*<br>*SF245-02* | **1 Tag** |
| **Belanty**<br>*Mefentrifluconazole*<br>*FRAC-Code 3*<br>00A480-00<br>20.03.2030<br>B4, NB6641 | **Botrytis-Arten (Botrytis spp.), Spargelrost (Puccinia asparagi), Stemphylium sp.**<br>1,5 l/ha (max. 4,5 l/ha für Kultur bzw. Jahr); max. 3/3; Abstand: 14 Tage<br>spritzen; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: BBCH 51-89<br>*NW609-2 (5m)*<br>*SF245-02, SF275-EEGE* | **F** |
| **UPSIDE**<br>*ABE-IT 56*<br>*FRAC-Code BM02*<br>00A891-00<br>20.05.2035<br>B4, NB6641 | **Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae)**<br>6 l/ha; max. 8/8; Abstand: 7 Tage<br>spritzen; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: BBCH 13-48<br>*NW642-1*<br>*SF245-02* | **1 Tag** |
| **Previcur Energy**<br>*Fosetyl*<br>*Propamocarb*<br>15.09.2026<br>B4, NB6641 | **Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae)**<br>2,5 l/ha; max. 1/1<br>spritzen; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden erster Symptome; Stadium Kultur: BBCH 12-18<br>*NW642-1*<br>*SF245-02, SF275-EEGE, SF276-42GE*<br>**Zulassung nach Art.53 VO (EG) Nr.1107/2009 vom 19.05.2026-15.09.2026** | **21 Tage** |
| **Previcur Energy**<br>*Fosetyl*<br>*Propamocarb*<br>13.01.2027<br>B4, NB6641 | **Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae)**<br>2,5 l/ha; max. 1/1<br>spritzen; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome; Stadium Kultur: BBCH 12-18<br>*NW642-1*<br>*SF245-02, SF275-EEGE, SF276-42GE*<br>**Zulassung nach Art.53 VO (EG) Nr.1107/2009 vom 16.09.2026-13.01.2027** | **21 Tage** |

# Zulassungsstand Spargel

| Mittel<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | Schadorganismus/Zweck<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte) |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Fungizide | | |
| **AZOFIN**<br>*Azoxystrobin*<br>*FRAC-Code 11*<br>00A065-00<br>31.05.2028<br>B4, NB6641 | **Laubkrankheit (Stemphylium botryosum)**<br>1 l/ha; max. 2/2; Abstand: 8-12 Tage<br>spritzen; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome<br>*NW605-2 (50% 5m, 75%*, 90%*), NW606 (5m), NW706*<br>*SF245-02* | F |
| **Chamane**<br>*Azoxystrobin*<br>*FRAC-Code 11*<br>008316-00<br>31.05.2028<br>B4, NB6641 | **Laubkrankheit (Stemphylium botryosum)**<br>1 l/ha; max. 2/2; Abstand: 8-12 Tage<br>spritzen; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome; Stadium Kultur: BBCH 51-91; Keine Anwendung auf drainierten Flächen (NG405)<br>*NW605-1 (50% 5m, 75% 5m, 90%*), NW606 (5m), NW706*<br>*SF245-02* | F |
| **Cuprozin progress**<br>*Kupferhydroxid*<br>*FRAC-Code M01*<br>006895-00<br>30.09.2027<br>B4, NB6641 | **Laubkrankheit (Stemphylium botryosum)**<br>2 l/ha; max. 6/6; Abstand: 7-14 Tage; bei niedrigerer Dosierung kann max. Behandlungsanzahl erhöht werden, sofern Gesamtmittelaufwand eingehalten wird; max. 3.000g Reinkupfer/ha/Jahr (NT620-1)<br>spritzen; nach der Ernte; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: BBCH 31-93<br>*NW605-1 (50% 5m, 75% 5m, 90%*), NW606 (10m)*<br>*SF245-02* | F |
| **Delan WG**<br>*Dithianon*<br>*FRAC-Code M09*<br>004424-00<br>31.08.2025<br>B4, NB6641 | **Laubkrankheit (Stemphylium botryosum)**<br>0,8 kg/ha; max. 3/3; Abstand: 7-10 Tage<br>(Ertrags- und Junganlagen); spritzen; bei Befallsgefahr bzw. nach Warndiensthinweis; Stadium Kultur: ab BBCH 51<br>*NW604, NW605 (50% 5m, 75% 5m, 90%*), NW606 (10m)*<br>*SF1891*<br>**Abverkaufsfrist: 28.02.2026, Aufbrauchfrist: 28.02.2027, Neuzulassung mit Zul.-Nr.: 024424-00** | F |
| **Delan WG**<br>*Dithianon*<br>*FRAC-Code M09*<br>024424-00<br>31.01.2028<br>B4, NB6641 | **Laubkrankheit (Stemphylium botryosum)**<br>0,75 kg/ha; max. 3/3; Abstand: 7-10 Tage<br>(Ertrags- und Junganlagen); spritzen; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: ab BBCH 51; Keine Anwendung mit handgeführten Geräten im Freiland (VA263-1)<br>*NW605-2 (50% 10m, 75% 5m, 90% 5m), NW606 (15m), NW706*<br>*SF245-02, SF275-EV* | F |

# Zulassungsstand Spargel

| **Mittel**<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | **Schadorganismus/Zweck**<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | **Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)** |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Fungizide | | |
| **Kumar**<br>*Kaliumhydrogencarbonat*<br>*FRAC-Code NC*<br>007547-00<br>31.08.2026<br>B4, NB6641 | **Laubkrankheit (Stemphylium botryosum)**<br>3 kg/ha; max. 6/6; Abstand: 7-10 Tage<br>spritzen; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: BBCH 39-93<br>*NW642-1*<br>*SF245-01*<br>**Abverkaufsfrist: 29.02.2027, Aufbrauchfrist: 29.02.2028, Neuzulassung mit Zul.-Nr.: 027547-00** | **F** |
| **Kumar**<br>*Kaliumhydrogencarbonat*<br>*FRAC-Code NC*<br>027547-00<br>31.10.2037<br>B4, NB6641 | **Laubkrankheit (Stemphylium botryosum)**<br>3 kg/ha; max. 6/6; Abstand: 7-10 Tage<br>spritzen; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: BBCH 39-93; Einstufung des BVL als Mittel mit geringem Risiko<br>*NW642-1*<br>*SF245-02* | **F** |
| **Kumulus WG**<br>*Schwefel*<br>*FRAC-Code M02*<br>052273-00<br>31.07.2028<br>B4, NB6641 | **Laubkrankheit (Stemphylium botryosum)**<br>3,2 kg/ha; max. 8/8; Abstand: 7-10 Tage<br>(Ertrags- und Junganlagen); spritzen; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: ab BBCH 51<br>*NW609-1 (5m)*<br>*SF245-01* | **F** |
| **ORTIVA**<br>*Azoxystrobin*<br>*FRAC-Code 11*<br>034560-00<br>31.05.2028<br>B4, NB6641 | **Laubkrankheit (Stemphylium botryosum)**<br>1 l/ha; max. 2/2; Abstand: 12 Tage<br>spritzen; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome; Stadium Kultur: BBCH 55-89; Keine Anwendung auf drainierten Flächen (NG405); Ausreichende Bekämpfung nicht in allen Fällen zu erwarten ggf. anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden (WW750, WW764)<br>*NW605-2 (50% 5m, 75% 5m, 90% *), NW606 (10m), NW706*<br>*SF245-02* | **F** |
| **SCORE**<br>*Difenoconazol*<br>*FRAC-Code 3*<br>024353-00<br>15.03.2027<br>B4, NB6641 | **Laubkrankheit (Stemphylium botryosum)**<br>0,4 l/ha; max. 1/1<br>spritzen; nach der Ernte, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis<br>*NW604, NW605 (50% 5m, 75%*, 90%*), NW606 (5m)*<br>*SF245-02* | **F** |

# Zulassungsstand Spargel

| **Mittel**<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | **Schadorganismus/Zweck**<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | **Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)** |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Fungizide | | |
| **Pablo**<br>*Azoxystrobin*<br>*FRAC-Code 11*<br>00B003-00<br>31.05.2028<br>B4, NB6641 | **Laubkrankheit (Stemphylium botryosum)**<br>**Spargelrost (Puccinia asparagi)**<br>1 l/ha; max. 2/2; Abstand: 10 Tage<br>spritzen, bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome; Stadium Kultur: BBCH 41-89<br>*NW605-1 (50% 5m, 75% 5m, 90% *), NW606 (5m), NW706*<br>*SF245-02* | **F** |
| **AZOSHY**<br>*Azoxystrobin*<br>*FRAC-Code 11*<br>00A150-00<br>31.05.2028<br>B4, NB6641 | **Laubkrankheit (Stemphylium botryosum), Spargelrost (Puccinia asparagi)**<br>1 l/ha; max. 2/2; Abstand: 10 Tage<br>spritzen; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome; Stadium Kultur: BBCH 51-89; keine Anwendung mit handgeführten Geräten (VA263)<br>*NW605-1 (50% 5m, 75% 5m, 90%*), NW606 (5m), NW706*<br>*SF245-02* | **F** |
| **CLAYTON AUGUSTA**<br>*Azoxystrobin*<br>*FRAC-Code 11*<br>00A894-00<br>31.05.2028<br>B4, NB6641 | **Laubkrankheit (Stemphylium botryosum), Spargelrost (Puccinia asparagi)**<br>1 l/ha; max. 2/2; Abstand: 10 Tage<br>spritzen, bei Befallsbeginn oder Sichtbarwerden erster Symptome; Stadium Kultur: BBCH 41-89<br>*NW605-01 (50% 5m, 75% 5m, 90%*), NW606 (5m), NW706*<br>*SF245-02* | **F** |
| **DITTO 25 EC**<br>*Difenoconazol*<br>*FRAC-Code 3*<br>00A317-00<br>15.03.2027<br>B4, NB6641 | **Laubkrankheit (Stemphylium botryosum), Spargelrost (Puccinia asparagi)**<br>0,4 l/ha; max. 1/1<br>spritzen; nach der Ernte, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis<br>*NW605-1 (50% 5m, 75% 5m, 90%*), NW606 (10m), NW705*<br>*SF245-02* | **F** |
| **HILL-STAR**<br>*Azoxystrobin*<br>*FRAC-Code 11*<br>00A584-00<br>31.05.2028<br>B4, NB6641 | **Laubkrankheit (Stemphylium botryosum), Spargelrost (Puccinia asparagi)**<br>1 l/ha; max. 2/2; Abstand: 10 Tage<br>spritzen; nach der Ernte; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome; max. Anwendungsanzahl ist eingeschränkt (WW750); im Wechsel mit anderen Wirkstoffgruppen verwenden (WW764)<br>*NW605-1 (50% 5m, 75%*, 90%*), NW606 (5m), NW706*<br>*SF245-02* | **F** |

# Zulassungsstand Spargel

| Mittel<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | Schadorganismus/Zweck<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte) |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Fungizide | | |
| **LS AZOXY**<br>*Azoxystrobin*<br>*FRAC-Code 11*<br>007180-00<br>31.05.2028<br>B4, NB6641 | **Laubkrankheit (Stemphylium botryosum), Spargelrost (Puccinia asparagi)**<br>1 l/ha; max. 2/2; Abstand: 10 Tage<br>spritzen; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome; nur zur Befallsminderung; Stadium Kultur: BBCH 41-89<br>*NW605-1 (50% 5m, 75% 5m, 90%*), NW606 (5m), NW706*<br>*SF245-01* | F |
| **PANTHA**<br>*Azoxystrobin*<br>*FRAC-Code 11*<br>00B242-00<br>31.05.2028<br>B4, NB6641 | **Laubkrankheit (Stemphylium botryosum), Spargelrost (Puccinia asparagi)**<br>1 l/ha; max. 2/2; Abstand: 10 Tage<br>spritzen; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome; Stadium Kultur: BBCH 41-89; Keine Anw. auf drainierten Flächen (NG405); Ausreichende Bekämpfung nicht in allen Fällen zu erwarten ggf. deshalb anschließend oder im Wechsel Mittel mit anderen Wirkstoffen verwenden (WW750, WW764)<br>*NW605-2 (50% 5m, 75% *, 90% *), NW606 (5m), NW706*<br>*SF245-02* | F |
| **ROUBAIX**<br>*Azoxystrobin*<br>*FRAC-Code 11*<br>00B023-00<br>31.05.2028<br>B4, NB6641 | **Laubkrankheit (Stemphylium botryosum), Spargelrost (Puccinia asparagi)**<br>1 l/ha; max. 2/2; Abstand: 10 Tage<br>spritzen; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: BBCH 41-89; Ausreichende Bekämpfung nicht in allen Fällen zu erwarten ggf. anschließend oder im Wechsel mit anderen Wirkstoffen verwenden (WW750)<br>*NW605-1 (50% 5m, 75% 5m, 90% *), NW606 (5m), NW706*<br>*SF245-02* | F |
| **FOLPAN 500 SC**<br>*Folpet*<br>*FRAC-Code M04*<br>024256-00<br>15.02.2028<br>B4, NB6641 | **Laubkrankheit (Stemphylium botryosum, Stemphylium vesicarium)**<br>1,5 l/ha; max. 2/2; Abstand: 7-10 Tage<br>spritzen; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome; Stadium Kultur: BBCH 60-81<br>*NW607-2 (75% 15m, 90% 5m), NW706*<br>*SF276-EVGE* | F |

# Zulassungsstand Spargel

| **Mittel**<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | **Schadorganismus/Zweck**<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | **Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)** |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Fungizide | | |
| **Revytrex**<br>*Fluxapyroxad*<br>*Mefentrifluconazole*<br>*FRAC-Code 7*<br>*FRAC-Code 3*<br>00A272-00<br>31.10.2028<br>B4, NB6641 | **Laubkrankheit (Stemphylium botryosum, Stemphylium vesicarium)**<br>1 l/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 14 Tage<br>spritzen; nach der Ernte, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: BBCH 51-81<br>*NW605-1 (50% 5m, 75% 5m, 90%*), NW606 (10m)*<br>*SF245-02, SF276-EEGE* | **F** |
| **ZOXIS SUPER**<br>*Azoxystrobin*<br>*FRAC-Code 11*<br>00A124-00<br>31.05.2028<br>B4, NB6641 | **Laubkrankheit (Stemphylium vesicarium), Spargelrost (Puccinia asparagi)**<br>1 l/ha; max. 2/2; Abstand: 14 Tage; Behälter vor Gebrauch schütteln (VA800)<br>spritzen; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: BBCH 51-93; Keine Anwendung auf drainierten Flächen (NG405)<br>*NW605-1 (50% 5m, 75% 5m, 90%*), NW606 (5m), NW706*<br>*SF245-02* | **F** |
| **Flowbrix**<br>*Kupferoxychlorid*<br>*FRAC-Code M01*<br>008886-00<br>30.06.2027<br>B4, NB6641 | **Pilzliche Schaderreger**<br>3,3 l/ha; max. 2/2; Abstand: 7 Tage; max. 3.000g Reinkupfer/ha/Jahr auf derselben Fläche (NT620-2)<br>spritzen; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis<br>*NW605-1 (50% 10m, 75% 5m, 90% 5m), NW606 (15m)*<br>*SF245-02, SF275-2GE, SF276-EEGE* | **F** |
| **Polyversum OD**<br>*Pythium oligandrum M1 (1.0E+09 Sporen je l)*<br>*FRAC-Code NC*<br>00B479-00<br>28.02.2039<br>B4, NB6641 | **Pilzliche Schaderreger**<br>0,05%; max. 1/1<br>tauchen des Wurzelballens - durchdringend; Vor dem Pflanzen; nur zur Befallsminderung; Mittel nicht über 20 °C lagern<br>*NW642-1*<br>*SF245-02* | **F** |
| **PROBLAD**<br>*Lupinus albus L. Samen Extrakt*<br>*FRAC-Code BM01*<br>00A852-00<br>27.04.2037<br>B4, NB6641 | **Puccinia-Arten**<br>3,2 l/ha; max. 3/3; Abstand: 8 Tage<br>spritzen; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: BBCH 21-89<br>*NW642-1*<br>*SF245-02* | **1 Tag** |

# Zulassungsstand Spargel

| Mittel<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | Schadorganismus/Zweck<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte) |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Fungizide | | |
| **LALSTOP CONTANS WG**<br>*Coniothyrium minitans Stamm CON/M/91-08*<br>*FRAC-Code BM02*<br>034346-00<br>31.07.2033<br>B3, NB663 | **Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.), Verminderung der Bodenverseuchung**<br>2 kg/ha; max. 1/2<br>spritzen; nach der Ernte; Ernterückstände müssen nach Behandlung in den Boden eingearbeitet werden; Einstufung des BVL als Mittel mit geringem Risiko<br>*NW642-1*<br>*SF184*<br>**ehemaliger Mittelname Contans WG** | **F** |
| **LALSTOP CONTANS WG**<br>*Coniothyrium minitans Stamm CON/M/91-08*<br>*FRAC-Code BM02*<br>034346-00<br>31.07.2033<br>B3, NB663 | **Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.), Verminderung der Bodenverseuchung**<br>4 kg/ha (Einarbeitungstiefe bis 10cm) , 8 kg/ha (Einarbeitungstiefe bis 20cm); max. 1/2<br>spritzen, anschl. Einarbeiten in den Boden; bei Befallsgefahr, vor der Pflanzung bzw. Saat, jedoch mind. 2 Monate vor einer möglichen Sclerotinia-Infektion; vor der Pflanzung bzw. Saat keine wendende Bodenbearbeitung durchführen, die über die Einarbeitungstiefe des Mittels hinausgeht; Einstufung des BVL als Mittel mit geringem Risiko<br>*NW642-1*<br>*SF184*<br>**ehemaliger Mittelname Contans WG** | **F** |
| **ASKON**<br>*Azoxystrobin*<br>*Difenoconazol*<br>*FRAC-Code 11*<br>*FRAC-Code 3*<br>006902-00<br>15.03.2027<br>B4, NB6641 | **Spargelrost (Puccinia asparagi)**<br>1 l/ha; max. 1/1<br>spritzen; nach der Ernte; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis<br>*NW605-1 (50% 10m, 75% 10m, 90%*), NW606 (15m), NW701*<br>*SF245-02* | **F** |
| **AZOFIN**<br>*Azoxystrobin*<br>*FRAC-Code 11*<br>00A065-00<br>31.05.2028<br>B4, NB6641 | **Spargelrost (Puccinia asparagi)**<br>1 l/ha; max. 2/2; Abstand: 8-12 Tage<br>spritzen; bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome<br>*NW605-2 (50% 5m, 75%*, 90%*), NW606 (5m), NW706*<br>*SF245-02* | **F** |

# Zulassungsstand Spargel

| **Mittel**<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | **Schadorganismus/Zweck**<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | **Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)** |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Fungizide | | |
| **Elatus Plus / Hypontus**<br>*Benzovindiflupyr*<br><br><br>*FRAC-Code 7*<br>008405-00<br>02.03.2027<br>B4, NB6641 | **Spargelrost (Puccinia asparagi)**<br>0,5 l/ha; max. 1/1; max. Aufwandmenge u. max. Anzahl der Behandlungen von Benzovindiflupyr pro ha/Fläche nicht überschreiten (NG371.1200); Anw. nur, wenn im Vorjahr kein Benzovindiflupyr-haltiges Mittel auf derselben Fläche eingesetzt wurde (NG372.1200)<br>spritzen; nach der Ernte bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome<br>*NW605-2 (50% 5m, 75% 5m, 90% *), NW606 (15m)*<br>*SF245-02* | **F** |
| **ORTIVA**<br>*Azoxystrobin*<br>*FRAC-Code 11*<br><br>034560-00<br>31.05.2028<br>B4, NB6641 | **Spargelrost (Puccinia asparagi)**<br>1 l/ha; max. 2/2; Abstand: 12 Tage<br>spritzen; bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden erster Symptome; Stadium Kultur: BBCH 55-89; Keine Anwendung auf drainierten Flächen (NG405)<br>*NW605-2 (50% 5m, 75% 5m, 90% *), NW606 (10m), NW706*<br>*SF245-02* | **F** |
| **Revytrex**<br>*Fluxapyroxad*<br>*Mefentrifluconazole*<br>*FRAC-Code 7*<br>*FRAC-Code 3*<br>00A272-00<br>31.10.2028<br>B4, NB6641 | **Spargelrost (Puccinia asparagi)**<br>1 l/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 14 Tage<br>spritzen; nach der Ernte, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: BBCH 51-81<br>*NW605-1 (50% 5m, 75% 5m, 90%*), NW606 (10m)*<br>*SF245-02, SF276-EEGE* | **F** |
| **SCORE**<br>*Difenoconazol*<br>*FRAC-Code 3*<br>024353-00<br>15.03.2027<br>B4, NB6641 | **Spargelrost (Puccinia asparagi)**<br>0,4 l/ha; max. 1/1<br>spritzen; nach der Ernte, bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis<br>*NW604, NW605 (50% 5m, 75%*, 90%*), NW606 (5m)*<br>*SF245-02* | **F** |
| **Funguran progress**<br>*Kupferhydroxid*<br><br>*FRAC-Code M01*<br>006896-00<br>30.09.2026<br>B4, NB6641 | **Spargelrost (Puccinia aspraragi)**<br>1,4 kg/ha; max. 2/2; Abstand: 7-14 Tage; max. 3.000g Reinkupfer/ha/Jahr auf derselben Fläche (NT620)<br>spritzen; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis; Stadium Kultur: BBCH 12-95<br>*NW605-1 (50% 5m, 75% 5m, 90%*), NW606 (10m)*<br>*SF245-02* | **F** |

# Zulassungsstand Spargel

| Mittel<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | Schadorganismus/Zweck<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte) |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Herbizide | | |
| **LONTREL 720 SG**<br>*Clopyralid*<br>*HRAC/WSSA-Code 4*<br>006851-00<br>31.12.2026<br>B4, NB6641 | **Acker-Kratzdistel**<br>0,167 kg/ha; max. 1/1<br>(Junganlagen); spritzen mit Abschirmung; nach dem Durchstoßen; Stadium Schadorg.: BBCH 31-33<br>*NW642-1, NT101*<br>*SF245-01* | F |
| **LONTREL 720 SG**<br>*Clopyralid*<br>*HRAC/WSSA-Code 4*<br>006851-00<br>31.12.2026<br>B4, NB6641 | **Acker-Kratzdistel**<br>0,167 kg/ha; max. 1/1<br>spritzen mit Abschirmung; nach dem Stechen; Stadium Schadorg.: BBCH 31-33<br>*NW642-1, NT101*<br>*SF245-01* | F |
| **LONTREL 720 SG**<br>*Clopyralid*<br>*HRAC/WSSA-Code 4*<br>036851-00<br>30.09.2037<br>B4, NB6641 | **Acker-Kratzdistel**<br>167 g/ha; max. 1/1<br>spritzen mit Abschirmung; nach dem Stechen; Stadium Kultur: BBCH 99; Stadium Schadorg.: BBCH 31-33<br>*NW642-1, VN290*<br>*SF245-02* | F |
| **FLEXIDOR**<br>*Isoxaben*<br>*HRAC/WSSA-Code 29*<br>043673-00<br>31.12.2027<br>B4, NB6641 | **Acker-Senf, Gemeines Hirtentäschel, Gemeines Kreuzkraut, Vogel-Sternmiere**<br>0,4 l/ha; max. 1/1<br>(Junganlagen mit Sämlingspflanzen); spritzen; im Pflanzjahr, nach dem Pflanzen, vor dem Auflaufen der Unkräuter; Stadium Kultur: ab BBCH 11; Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen 1. Nov. und 15. Mrz. (NG403)<br>*NW609-1 (5m), NW706, NT102*<br>*SF245-02* | F |
| **Spectrum**<br>*Dimethenamid-P*<br>*HRAC/WSSA-Code 15*<br>024803-00<br>30.04.2026<br>B4, NB6641 | **Amarant-, Kamille-Arten, Schadhirsen**<br>1,4 l/ha; max. 1/1<br>(Junganlagen); spritzen, im Pflanzjahr bis nach den Durchstoßen, vor Ausbildung der Phyllokladien am 1.Trieb; Stadium Schadorg.: BBCH 00-12; Bei Anwendung zu angrenzenden Flächen ein Abstand von mind. 5m einhalten alternativ kann Anwendung mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen (VA271)<br>*NW605 (50% 10m, 75% 5m, 90% 5m), NW606 (20m), NT101*<br>*SF143*<br>**Abverkaufsfrist: 30.10.2026, Aufbrauchfrist: 30.10.2027, Neuzulassung mit Zul.-Nr.: 044803-00 (Achtung: Nicht alle Indikationen verfügbar)** | F |

# Zulassungsstand Spargel

| Mittel<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | Schadorganismus/Zweck<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte) |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Herbizide | | |
| **Spectrum**<br>*Dimethenamid-P*<br>*HRAC/WSSA-Code 15*<br><br><br><br>024803-00<br>30.04.2026<br>B4, NB6641 | **Amarant-, Kamille-Arten, Schadhirsen**<br>1,4 l/ha; max. 1/1<br>(Ertragsanlagen); nach dem Stechen bis nach dem Durchstoßen, vor Ausbildung der Phyllokladien am 1.Trieb; Stadium Schadorg.: BBCH 00-12; Bei Anwendung zu angrenzenden Flächen Abstand von mind. 5m einhalten alternativ kann die Anwendung mit verlustmindernden Gerät erfolgen (mind. Abdriftminderungsklasse 50%, VA271)<br>*NW605 (50% 10m, 75% 5m, 90% 5m), NW606 (20m), NT101*<br>*SF143*<br>**Abverkaufsfrist: 30.10.2026, Aufbrauchfrist: 30.10.2027, Neuzulassung mit Zul.-Nr.: 044803-00 (Achtung: Nicht alle Indikationen verfügbar)** | **F** |
| **Spectrum**<br>*Dimethenamid-P*<br>*HRAC/WSSA-Code 15*<br><br><br><br>044803-00<br>31.08.2035<br>B4, NB6641 | **Amarant-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen**<br>max. 0,7 l/ha, 0,5 l/ha pro Behandlung; max. in Kultur oder im Jahr: 1,2 l/ha; max. 2/2; Abstand: 7 Tage; im Splittingverfahren / Bandbehandlung<br>(Ertragsanlagen); spritzen; Nach dem Stechen; Keine Anwendung mit handgeführten Geräten (VA263-1); Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen 01. Nov. und 15. Mrz. (NW800); Zu angrenzenden Flächen ein Abstand von mind. 5m einhalten alternativ kann die Anwendung mit verlustmindernden Gerät erfolgen (mind. Abdriftminderungsklasse 50%, Bundesanzeigerveröffentlichung des BVL, VA271)<br>*NW609-2 (5m), NW706, NT103-1*<br>*SF275-2GE, SF274-1, SF555-1* | **F** |
| **Spectrum**<br>*Dimethenamid-P*<br>*HRAC/WSSA-Code 15*<br><br><br><br>044803-00<br>31.08.2035<br>B4, NB6641 | **Amarant-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen**<br>0,7 l/ha; max. 1/1<br>(Nur in Grünspargel); spritzen; Vor dem Durchstoßen; Keine Anwendung mit handgeführten Geräten (VA263-1); Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen 01. Nov. und 15. Mrz. (NW800); Zu angrenzenden Flächen ein Abstand von mind. 5m einhalten alternativ kann die Anwendung mit verlustmindernden Gerät erfolgen (mind. Abdriftminderungsklasse 50%, Bundesanzeigerveröffentlichung des BVL, VA271)<br>*NW609-2 (5m), NW705, NT102-1*<br>*SF275-2GE, SF274-1, SF555-1* | **21 Tage** |
| **Spectrum**<br>*Dimethenamid-P*<br>*HRAC/WSSA-Code 15*<br><br><br><br>044803-00<br>31.08.2035<br>B4, NB6641 | **Amarant-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen**<br>max. 0,7 l/ha, 0,5 l/ha pro Behandlung; max. in Kultur oder im Jahr: 1,2 l/ha; max. 2/2; Abstand: 7 Tage; im Splittingverfahren<br>(Junganlagen); spritzen; Ab Pflanzjahr, bis einschließlich 3. Standjahr, nach dem Durchstoßen; Keine Anwendung mit handgeführten Geräten (VA263-1); Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen 01. Nov. und 15. Mrz. (NW800); Zu angrenzenden Flächen ein Abstand von mind. 5m einhalten alternativ kann die Anwendung mit verlustmindernden Gerät erfolgen (mind. Abdriftminderungsklasse 50%, Bundesanzeigerveröffentlichung des BVL, VA271)<br>*NW609-2 (5m), NW706, NT103-1*<br>*SF275-2GE, SF274-1, SF555-1* | **F** |

# Zulassungsstand Spargel

| **Mittel**<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | **Schadorganismus/Zweck**<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | **Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)** |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Herbizide | | |
| **Spectrum**<br>*Dimethenamid-P*<br>*HRAC/WSSA-Code 15*<br>044803-00<br>31.08.2035<br>B4, NB6641 | **Amarant-Arten, Kamille-Arten, Schadhirsen**<br>1,2 l/ha; max. 1/1<br>(Junganlagen); spritzen; im Pflanzjahr nach dem Durchstoßen vor Ausbildung der Phyllokladien am 1. Trieb; Stadium Schadorg.: bis BBCH 12; Pflanzenverträglichkeit prüfen (WP747); Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen 01. Nov. und 15. Mrz. (NW800); Keine Anwendung mit handgeführten Geräten (VA263-1); Bei Anwendung ein Abstand von mind. 5m zu angrenzenden Flächen einhalten, alternativ kann die Anwendung mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen (Abdriftminderungsklasse 50%, VA271)<br>*NW609-2 (5m), NW706, NT103-1*<br>*SF274-1, SF275-2GE, SF555-1* | **F** |
| **ARRODIM**<br>*Clethodim*<br>*HRAC/WSSA-Code 1*<br>00B059-00<br>31.05.2027<br>B4, NB6641 | **Einjährige einkeimblättrige Unkräuter**<br>0,75 l/ha; max. 1/1; vorgeschriebene Mischung mit ARROACTIVE (00B251-00) 1 l/ha<br>spritzen als Unterblattbehandlung; ab Pflanzjahr, nach der Ernte; Stadium Schadorg.: BBCH 12-29<br>*NW642-1, NT108-1*<br>*SF245-02, SF275-EEGE* | **F** |
| **Select 240 EC**<br>*Clethodim*<br>*HRAC/WSSA-Code 1*<br>024366-00<br>31.08.2027<br>B4, NB6641 | **Einjährige einkeimblättrige Unkräuter**<br>0,75 l/ha; max. 1/1; Mischung mit RADIAMIX (00A791-00) 1 l/ha<br>spritzen als Unterblattbehandlung; ab Pflanzjahr, nach der Stechperiode; Stadium Kultur: BBCH 12-29; Stadium Schadorg.: BBCH 12-29<br>*NW642-1, NT108*<br>*SF245-01* | **F** |
| **Focus Ultra**<br>*Cycloxydim*<br>*HRAC/WSSA-Code 1*<br>033964-00<br>31.08.2027<br>B4, NB6641 | **Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Einjähriges Rispengras)**<br>2,5 l/ha; max. 1/1<br>(Junganlagen); spritzen; im Pflanzjahr, nach dem Durchstoßen; Stadium Schadorg.: BBCH 12-29<br>*NW642-1, NT101*<br>*SF245-02* | **F** |

# Zulassungsstand Spargel

| Mittel<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | Schadorganismus/Zweck<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte) |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Herbizide | | |
| **Focus Ultra**<br>*Cycloxydim*<br>*HRAC/WSSA-Code 1*<br>033964-00<br>31.08.2027<br>B4, NB6641 | **Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Einjähriges Rispengras)**<br>2,5 l/ha; max. 1/1<br>(Ertragsanlagen); spritzen; nach der Ernte, nach dem Stechen; Stadium Schadorg.: BBCH 12-29<br>*NW642-1, NT101*<br>*SF245-02* | **F** |
| **Focus Ultra**<br>*Cycloxydim*<br>*HRAC/WSSA-Code 1*<br>033964-00<br>31.08.2027<br>B4, NB6641 | **Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Einjähriges Rispengras)**<br>2,5 l/ha; max. 1/1<br>(Junganlagen mit Sämlingspflanzen); spritzen; im Pflanzjahr, nach dem Pflanzen; Stadium Schadorg.: BBCH 12-29<br>*NW642-1, NT101*<br>*SF245-02* | **F** |
| **Fusilade MAX**<br>*Fluazifop-P*<br>*HRAC/WSSA-Code 1*<br>024847-00<br>31.05.2027<br>B4, NB6641 | **Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Einjähriges Rispengras)**<br>1 l/ha; max. 1/1<br>(Junganlagen); spritzen; nach dem Auflaufen; Stadium Kultur: ab BBCH 09; Stadium Schadorg.: BBCH 12-21; Erntegut nicht verzehren (VV600)<br>*NW642-1, NT102*<br>*SF245-02* | **F** |
| **Fusilade MAX**<br>*Fluazifop-P*<br>*HRAC/WSSA-Code 1*<br>024847-00<br>31.05.2027<br>B4, NB6641 | **Einjährige einkeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Einjähriges Rispengras)**<br>1 l/ha; max. 1/1<br>(Ertragsanlagen); spritzen; nach der Ernte, nach dem Stechen; Stadium Schadorg.: BBCH 12-21<br>*NW642-1, NT102*<br>*SF245-02* | **F** |

# Zulassungsstand Spargel

| Mittel<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | Schadorganismus/Zweck<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte) |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Herbizide | | |
| **BELOUKHA** | **Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter** | **F** |
| *Pelargonsäure* | 16 l/ha; max. 2/2; Abstand: mind. 7 Tage; Spritzflüssigkeit unter ständigem Rühren ausbringen (VA551) | |
| *HRAC/WSSA-Code Ø* | spritzen, Zwischenreihenbehandlung mit Spritzschirm; nach dem Auflaufen bzw. Pflanzen | |
| 008528-00 | *NW642-1* | |
| 01.12.2027 | *SF245-02* | |
| B4, NB6641 | | |
| **Centium 36 CS** | **Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter** | **F** |
| *Clomazone* | 0,25 l/ha; max. 1/1 | |
| *HRAC/WSSA-Code 13* | (Ertragsanlagen); nach der Stechperiode oder nach Einebnen der Dämme, vor dem Durchstoßen; Stadium Schadorg.: BBCH 00-09 | |
| 024798-00 | *NW642-1, NT102-1, NT127, NT149* | |
| 30.09.2027 | *SF245-02* | |
| B4, NB6641 | | |
| **Centium 36 CS** | **Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter** | **F** |
| *Clomazone* | 0,25 l/ha; max. 1/1 | |
| *HRAC/WSSA-Code 13* | (Junganlagen); im Pflanzjahr, vor dem Durchstoßen; Stadium Schadorg.: BBCH00-09 | |
| 024798-00 | *NW642-1, NT102-1, NT127, NT149* | |
| 30.09.2027 | *SF245-02* | |
| B4, NB6641 | | |
| **Centium 36 CS** | **Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter** | **21 Tage** |
| *Clomazone* | 0,15 l/ha; max. 1/1 | |
| *HRAC/WSSA-Code 13* | (Nur in Grünspargel); vor dem Austrieb; Stadium Kultur: BBCH 00-08; Stadium Schadorg.: BBCH 05-09 | |
| 024798-00 | *NW642-1, NT101, NT127, NT149* | |
| 30.09.2027 | *SF245-02* | |
| B4, NB6641 | | |
| **Cresendo** | **Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter** | **F** |
| *Clomazone* | 0,25 l/ha; max. 1/1 | |
| *HRAC/WSSA-Code 13* | (Junganlagen); spritzen; im Pflanzjahr 7-10 Tage nach dem Pflanzen bis kurz vor dem Durchstoßen; Erntegut nicht verzehren (VV600); Schäden an Kulturpflanze, benachbart wachsenden Kulturpflanzen und Gehölzen möglich (WP734, WP740, WP744) | |
| 00B264-00 | *NW642-1, NT102-1, NT127, NT149* | |
| 30.09.2027 | *SF245-02* | |
| B4, NB6641 | | |

# Zulassungsstand Spargel

| Mittel<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | Schadorganismus/Zweck<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte) |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Herbizide | | |
| **Cresendo**<br>*Clomazone*<br>*HRAC/WSSA-Code 13*<br><br>00B264-00<br>30.09.2027<br>B4, NB6641 | **Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter**<br>0,25 l/ha; max. 1/1<br>(Ertragsanlagen); spritzen; nach dem Stechen bis vor dem Austrieb; Schäden an Kulturpflanze, benachbart wachsenden Kulturpflanzen und Gehölzen möglich (WP734, WP740, WP744)<br>*NW642-1, NT102-1, NT127, NT149*<br>*SF245-02* | F |
| **FLEXIDOR**<br>*Isoxaben*<br>*HRAC/WSSA-Code 29*<br><br>043673-00<br>31.12.2027<br>B4, NB6641 | **Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter**<br>0,5 l/ha; max. 1/1<br>(Ertragsanlagen); spritzen, Reihenbehandlung mit Abschirmung, Unterblattbehandlung; auf unkrautfreien Boden; nach der Ernte, vor dem Auflaufen der Unkräuter; Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen 1. Nov. und 15. Mrz. (NG403)<br>*NW605-2 (50% 5m, 75% *, 90% *), NW606 (5m), NW706, NT103-1*<br>*SF245-02* | F |
| **Lentagran WP**<br>*Pyridat*<br>*HRAC/WSSA-Code 6*<br><br>043231-00<br>31.12.2031<br>B4, NB6641 | **Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter**<br>1 kg/ha (max. 2 kg/ha in der Kultur oder im Jahr); max. 2/2; Abstand: 7-14 Tage; Splittingverfahren (2 Behandlungen)<br>(Junganlagen); spritzen als Unterblattbehandlung; Nach dem Auflaufen, ab Frühjahr; Stadium Kultur: ab BBCH 21; Verfallsdatum darf 12 Monaten nach Produktion nicht überschreiten (VH301-3); Anwendung muss in einer Breite von mind. 20m zu angrenzenden Flächen mit abdriftmindernden Geräten erfolgen (mind. Abdriftminderungsklasse 90%, VA320)<br>*NW605-2 (50% 5m, 75% 5m, 90% *), NW606 (5m), NT101-1*<br>*SF245-02, SF275-35GE* | F |
| **Lentagran WP**<br>*Pyridat*<br>*HRAC/WSSA-Code 6*<br><br>043231-00<br>31.12.2031<br>B4, NB6641 | **Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter**<br>2 kg/ha; max. 1/1<br>(Ertragsanlagen); spritzen; Unterblattbehandlung / Reihenbehandlung; Nach der Stechperiode; Verfallsdatum darf 12 Monaten nach Produktion nicht überschreiten (VH301-3); Anwendung muss in einer Breite von mind. 20m zu angrenzenden Flächen mit abdriftmindernden Geräten erfolgen (mind. Abdriftminderungsklasse 90%, VA320)<br>*NW605-2 (50% 5m, 75% 5m, 90% *), NW606 (10m), NT102-1*<br>*SF245-02, SF275-35GE* | F |

# Zulassungsstand Spargel

| **Mittel**<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | **Schadorganismus/Zweck**<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | **Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)** |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Herbizide | | |
| **Lentagran WP**<br>*Pyridat*<br>*HRAC/WSSA-Code 6*<br>033231-00<br>28.02.2026<br>B4, NB6641 | **Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter**<br>2 kg/ha; max. 1/1<br>spritzen; vor der Stechperiode<br>*NW642, NT103*<br>*SF1891*<br>**Abverkaufsfrist: 28.08.2026, Aufbrauchfrist: 28.08.2027, Neuzulassung mit Zul.-Nr.: 043231-00 (Achtung: Nicht alle Indikationen verfügbar)** | **F** |
| **Lentagran WP**<br>*Pyridat*<br>*HRAC/WSSA-Code 6*<br>033231-00<br>28.02.2026<br>B4, NB6641 | **Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter**<br>2 kg/ha; max. 1/1<br>spritzen; nach der Stechperiode als Unterblattbehandlung<br>*NW642, NT103*<br>*SF1891*<br>**Abverkaufsfrist: 28.08.2026, Aufbrauchfrist: 28.08.2027, Neuzulassung mit Zul.-Nr.: 043231-00 (Achtung: Nicht alle Indikationen verfügbar)** | **F** |
| **Stomp Aqua**<br>*Pendimethalin*<br>*HRAC/WSSA-Code 3*<br>035958-00<br>15.01.2028<br>B4, NB6641 | **Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Kletten-Labkraut<br>Acker-Hundskamille<br>Kamille-Arten<br>Gemeines Kreuzkraut<br>Franzosenkraut-Arten)**<br>2,6 l/ha; max. 1/1<br>Nur in Grünspargel; (Junganlagen); spritzen; vor der Stechperiode; Stadium Kultur: bis BBCH 08; Stadium Schadorg.: bis BBCH 11; Pflanzenverträglichkeit prüfen (WP747); Ausbringen mit Wasseraufwand von mind. 300 l/ha auszubringen und verlustmindernden Gerät (mind. Abdriftminderungsklasse 90%, NT145-1); bei der Ausbringung Fahrgeschwindigkeit 7,5 km/h und Windgeschwindigkeit 3 m/s nicht überschreiten (NT146, NT170)<br>*NW607-2 (90% 5m), NW706*<br>*SF245-02, SF275-EEGE* | **F** |

# Zulassungsstand Spargel

| **Mittel**<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | **Schadorganismus/Zweck**<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | **Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)** |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Herbizide | | |
| **Stomp Aqua** | **Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Kletten-Labkraut<br>Acker-Hundskamille<br>Kamille-Arten<br>Gemeines Kreuzkraut<br>Franzosenkraut-Arten)** | **F** |
| *Pendimethalin* | 1. Zeitpunkt: 1,3 l/ha, 2. Zeitp.: 1,3 l/ha; max. 2/2; Abstand: 9-28 Tage; Splittingverfahren (2 Behandlungen) | |
| *HRAC/WSSA-Code 3* | (Junganlagen mit Sämlingspflanzen); spritzen; im Pflanzjahr, bis 2 Tage vor dem Pflanzen und nach dem Anwachsen, 7-10 Tage nach dem Pflanzen; Stadium Schadorg.: bis BBCH 11; Pflanzenverträglichkeit prüfen (WP747); Ausbringen mit Wasseraufwand von mind. 300 l/ha auszubringen und verlustmindernden Gerät (mind. Abdriftminderungsklasse 90%, NT145-1); bei der Ausbringung Fahrgeschwindigkeit 7,5 km/h und Windgeschwindigkeit 3 m/s nicht überschreiten (NT146, NT170) | |
| 035958-00<br>15.01.2028<br>B4, NB6641 | *NW607-2 (90% 5m), NW706*<br>*SF245-02, SF275-EEGE* | |
| **Stomp Aqua** | **Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Acker-Hundskamille, Franzosenkraut-, Kamille-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Kletten-Labkraut)** | **F** |
| *Pendimethalin* | 1,75 l/ha (1.Behandlung), 1,75 l/ha (2.Behandl); max. 2/2; Abstand: 9-28 Tage; Splittingverfahren (2 Behandlungen) | |
| *HRAC/WSSA-Code 3* | (Junganlagen mit Sämlingspflanzen); spritzen; im Pflanzjahr, bis 2 Tage vor dem Pflanzen und nach dem Anwachsen 7-10 Tage nach dem Pflanzen; Stadium Schadorg.: bis BBCH 11; Bei Ausbringung darf Fahrgeschwindigkeit 7,5 km/h und Windgeschwindigkeit 3 m/s nicht überschritten werden (NT146, NT170); Mit verlustminderndem Gerät (mind. Abdriftminderungsklasse 90%) und mit Wasseraufwand von mind. 300 l/ha ausbringen (NT145) | |
| 005958-00<br>30.06.2026<br>B4, NB6641 | *NT145, NW605-1 (90% 5m), NW705, NT112*<br>*SF245-02*<br>**Abverkaufsfrist: 30.12.2026, Aufbrauchfrist: 30.12.2027, Neuzulassung mit Zul.-Nr.: 035958-00** | |

# Zulassungsstand Spargel

| **Mittel**<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | **Schadorganismus/Zweck**<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | **Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)** |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Herbizide | | |
| **Stomp Aqua** | **Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter (ausgenommen: Acker-Hundskamille, Franzosenkraut-, Kamille-Arten, Gemeines Kreuzkraut, Kletten-Labkraut)** | **F** |
| *Pendimethalin* | 3,5 l/ha; max. 1/1 | |
| *HRAC/WSSA-Code 3* | (Ertrags- und Junganlagen); vor der Stechperiode; Stadium Kultur: bis BBCH 08, Stadium Schadorg.: bis BBCH 11; Bei Ausbringung darf Fahrgeschwindigkeit 7,5 km/h und Windgeschwindigkeit 3 m/s nicht überschritten werden (NT146, NT170); Mittel mit verlustminderndem Gerät (mind. Abdriftminderungsklasse 90%) und mit Wasseraufwand von mind. 300 l/ha ausbringen (NT145) | |
| 005958-00 | *NT145, NW605-1 (90% 5m), NW705, NT112* | |
| 30.06.2026 | *SF245-02* | |
| B4, NB6641 | **Abverkaufsfrist: 30.12.2026, Aufbrauchfrist: 30.12.2027, Neuzulassung mit Zul.-Nr.: 035958-00** | |
| **Quickdown** | **Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter** | **F** |
| *Pyraflufen* | 0,4 l/ha (max. Mittelaufwand 0,8 l/ha); max. 2/2; Abstand: 7 Tage; empfohlene Mischung mit Toil (025380-00) 1 l/ha | |
| *HRAC/WSSA-Code 14* | spritzen; Einzelpflanzenbehandlung mit optischer Unkrauterkennung; nach dem Auflaufen der Unkräuter, während der Vegetationsperiode; nur als Zwischenreihenbehandlung zulässig, wobei max. 50% der Fläche behandelt werden dürfen, Mittelaufwand/ha bezieht sich auf die tätsächlich behandelte Zwischenreihenfläche (NG721) | |
| 005693-00 | *NW605-2 (50% 10m, 75% 5m, 90% 5m), NW606 (20m), NW706, NT108-1* | |
| 31.01.2027 | *SF245-02* | |
| B4, NB6641 | | |
| **Quickdown** | **Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter** | **F** |
| *Pyraflufen* | 0,4 l/ha (max. Mittelaufwand 0,8 l/ha); max. 2/2; Abstand: 7 Tage; empfohlene Mischung mit Toil (025380-00) 1 l/ha | |
| *HRAC/WSSA-Code 14* | spritzen; Zwischenreihenbehandlung / mit Abschirmung; nach dem Auflaufen der Unkräuter, während der Vegetationsperiode; nur als Zwischenreihenbehandlung zulässig, wobei max. 50% der Fläche behandelt werden dürfen, Mittelaufwand/ha bezieht sich auf die tätsächlich behandelte Zwischenreihenfläche (NG721) | |
| 005693-00 | *NW605-2 (50% 10m, 75% 5m, 90% 5m), NW606 (20m), NW706, NT108-1* | |
| 31.01.2027 | *SF245-02* | |
| B4, NB6641 | | |

# Zulassungsstand Spargel

| **Mittel**<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | **Schadorganismus/Zweck**<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | **Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)** |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Herbizide | | |
| **Stomp Aqua** | **Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse** | **F** |
| *Pendimethalin* | 3,5 l/ha; max. 1/1 | |
| *HRAC/WSSA-Code 3* | (Ertragsanlagen); nach der Stechperiode, nach Einebnen der Dämme; Bei Ausbringung darf Fahrgeschwindigkeit 7,5 km/h und Windgeschwindigkeit 3 m/s nicht überschritten werden (NT146, NT170); Mittel mit verlustminderndem Gerät (mind. Abdriftminderungsklasse 90%) und mit Wasseraufwand von mind. 300 l/ha ausbringen (NT145) | |
| 005958-00 | *NT145, NW605-1 (90% 5m), NW705, NT112* | |
| 30.06.2026 | *SF245-02* | |
| B4, NB6641 | **Abverkaufsfrist: 30.12.2026, Aufbrauchfrist: 30.12.2027, Neuzulassung mit Zul.-Nr.: 035958-00** | |
| **Stomp Aqua** | **Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse** | **F** |
| *Pendimethalin* | 3,5 l/ha; max. 1/1 | |
| *HRAC/WSSA-Code 3* | (Junganlagen); im Pflanzjahr, 7-10 Tage nach dem Pflanzen, vor dem Austrieb; Bei Ausbringung darf Fahrgeschwindigkeit 7,5 km/h und Windgeschwindigkeit 3 m/s nicht überschritten werden (NT146, NT170); Mittel mit verlustminderndem Gerät (mind. Abdriftminderungsklasse 90%) und mit Wasseraufwand von mind. 300 l/ha ausbringen (NT145) | |
| 005958-00 | *NT145, NW605-1 (90% 5m), NW705, NT112* | |
| 30.06.2026 | *SF245-02* | |
| B4, NB6641 | **Abverkaufsfrist: 30.12.2026, Aufbrauchfrist: 30.12.2027, Neuzulassung mit Zul.-Nr.: 035958-00** | |
| **Stomp Aqua** | **Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse** | **F** |
| *Pendimethalin* | 3,5 l/ha; max. 1/1 | |
| *HRAC/WSSA-Code 3* | (Ertragsanlagen); vor dem Austrieb, nach Aufrichten der Dämme; Bei Ausbringung darf Fahrgeschwindigkeit 7,5 km/h und Windgeschwindigkeit 3 m/s nicht überschritten werden (NT146, NT170); Mittel mit verlustminderndem Gerät (mind. Abdriftminderungsklasse 90%) und mit Wasseraufwand von mind. 300 l/ha ausbringen (NT145) | |
| 005958-00 | *NT145, NW605-1 (90% 5m), NW705, NT112* | |
| 30.06.2026 | *SF245-02* | |
| B4, NB6641 | **Abverkaufsfrist: 30.12.2026, Aufbrauchfrist: 30.12.2027, Neuzulassung mit Zul.-Nr.: 035958-00** | |

# Zulassungsstand Spargel

| Mittel<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | Schadorganismus/Zweck<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte) |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Herbizide | | |
| **Saracen**<br>*Florasulam*<br>*HRAC/WSSA-Code 2*<br>027767-00<br>31.12.2031<br>B4, NB6641 | **Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Knöterich-Arten, Kamille-Arten**<br>0,15 l/ha; max. 1/1<br>(Junganlagen); spritzen als Unterblattbehandlung; Ab 1. Standjahr und bis einschließlich 3. Standjahr; Stadium Kultur: BBCH 51-89; Erntegut nicht verzehren (VV600)<br>*NW642-1, NT109-1*<br>*SF245-02* | **F** |
| **Saracen**<br>*Florasulam*<br>*HRAC/WSSA-Code 2*<br>027767-00<br>31.12.2031<br>B4, NB6641 | **Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Knöterich-Arten, Kamille-Arten**<br>0,15 l/ha; max. 1/1<br>(Nur in Grünspargel); spritzen als Unterblattbehandlung; nach der Ernte; Stadium Kultur: BBCH 51-89<br>*NW642-1, NT109-1*<br>*SF245-02* | **F** |
| **Stomp Aqua**<br>*Pendimethalin*<br>*HRAC/WSSA-Code 3*<br>035958-00<br>15.01.2028<br>B4, NB6641 | **Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras**<br>2,6 l/ha; max. 1/1<br>(Junganlagen); spritzen; im Pflanzjahr 7-10 Tage nach dem Pflanzen, vor dem Austrieb; Erntegut nicht verzehren (VV600)<br>*NW607-2 (90% 5m), NW706, NT103-1*<br>*SF245-02, SF275-EEGE* | **F** |
| **Stomp Aqua**<br>*Pendimethalin*<br>*HRAC/WSSA-Code 3*<br>035958-00<br>15.01.2028<br>B4, NB6641 | **Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras**<br>2,6 l/ha; max. 1/1<br>(Ertragsanlagen); spritzen; nach der Stechperiode und nach Einebnen der Dämme<br>*NW607-2 (90% 5m), NW706, NT103-1*<br>*SF245-02, SF275-EEGE* | **F** |
| **FRESCO**<br>*Metobromuron*<br>*HRAC/WSSA-Code 5*<br>008443-00<br>31.05.2028<br>B4, NB6641 | **Einjähriges Rispengras, Franzosenkraut-Arten, Vogel-Sternmiere**<br>3,75 l/ha; max. 1/1<br>spritzen; nach der Ernte, Juli bis August; kein Nachbau von zweikeimblättrigen Zwischenfrüchten sowie Winterraps (WP720), Schäden an Kulturpflanze möglich (WP734)<br>*NG412; NW642-1, NT101*<br>*SF245-02* | **F** |

# Zulassungsstand Spargel

| Mittel<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | Schadorganismus/Zweck<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte) |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Herbizide | | |
| **Proman**<br>*Metobromuron*<br><br><br><br><br><br><br><br><br>28.10.2026<br>B4, NB6641 | **Einjähriges Rispengras, Franzosenkraut-Arten, Vogel-Sternmiere**<br>1,5 l/ha (in Ausnahmefällen bis zu 3 l/ha); max. 1<br>spritzen; nach der Ernte, Juli bis August; Schäden an der Kultur nicht auszuschließen daher Pflanzenverträglichkeit prüfen; Keine Anwendung mit handgeführten Geräten (VA263-1); Anwendung muss mit verlustmindernden Gerät erfolgen (mind. Abdriftminderungsklasse 75%, VA269); Blattgemüse, Getreide und Beten frühestens 4 Monate nach Anwendung anbauen. Wurzel- und Knollengemüse (außer Beten) gelten keine Restriktionen. Alle anderen Kulturen frühestens 12 Monaten nach Anwendung anbauen (VN288)<br>*NG404, NW609-2 (5m), NT102-1*<br>*SF245-02*<br>**Zulassung nach Art.53 VO (EG) Nr.1107/2009 vom 01.07.2026-28.10.2026** | F |
| **Roundup REKORD**<br>*Glyphosat*<br>*HRAC/WSSA-Code 9*<br>007525-60<br>15.12.2026<br>B4, NB6641 | **Einkeimblättrige Unkräuter, schwer bekämpfbare Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter**<br>33% (max. Mittelaufwand 5 kg/ha); max. 1/1; 40 Tage Abstand zwischen Spritzungen einhalten, wenn der Gesamtaufwand 2,9 kg Glyphosat/ha überschreitet (NG352)<br>streichen; zur gezielten Einzelpflanzenbehandlung; während der Vegetationsperiode<br>*NW642-1*<br>*SF245-01* | F |
| **Credit Xtreme**<br>*Glyphosat*<br><br><br>*HRAC/WSSA-Code 9*<br>00A370-00<br>15.12.2026<br>B4, NB6641 | **Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter**<br>2 l/ha; max. 1/1; 75 Tage zwischen Spritzanwendungen einhalten, wenn Gesamtaufwand von zwei aufeinanderfolgenden Spritzanwendungen Summe von 2,4 kg Glyphosat/ha überschreitet (NG352-1)<br>spritzen; nach der Saat vor dem Auflaufen<br>*NW642-1, NT140*<br>*SF245-02* | F |
| **Finalsan Unkrautfrei**<br>*Pelargonsäure*<br><br>*HRAC/WSSA-Code Ø*<br><br>024645-00<br>01.12.2027<br>B4, NB6641 | **Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter**<br>62,5 l/ha; max. 6/6; Abstand: 3-10 Tage; Mittelaufwand bezieht sich auf die zu behandelnde Fläche<br>spritzen als Einzelpflanzenbehandlung mit optischer Unkrauterkennung; nach Vegetationsbeginn<br>*NW642-1*<br>*SF245-02* | F |

# Zulassungsstand Spargel

| Mittel<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | Schadorganismus/Zweck<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte) |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Herbizide | | |
| **Roundup Future**<br>*Glyphosat*<br><br>*HRAC/WSSA-Code 9*<br>00A042-00<br>15.12.2026<br>B4, NB6641 | **Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter**<br>2,16 l/ha; max. 1/1; 75 Tage zwischen Spritzanwendungen einhalten, wenn Gesamtaufwand von zwei aufeinanderfolgenden Spritzanwendungen die Summe von 2,4 kg Glyphosat/ha überschreitet (NG352-1)<br>spritzen mit Abschirmung; nach dem Stechen<br>*NW642-1, NT140*<br>*SF245-02* | F |
| **Focus Ultra**<br>*Cycloxydim*<br>*HRAC/WSSA-Code 1*<br><br>033964-00<br>31.08.2027<br>B4, NB6641 | **Gemeine Quecke**<br>5 l/ha; max. 1/1<br>(Ertragsanlagen); spritzen; nach der Ernte, nach dem Stechen, bei Unkrauthöhe bis ca. 25 cm<br>*NW642-1, NT102*<br>*SF245-02* | F |
| **Focus Ultra**<br>*Cycloxydim*<br>*HRAC/WSSA-Code 1*<br><br>033964-00<br>31.08.2027<br>B4, NB6641 | **Gemeine Quecke**<br>5 l/ha; max. 1/1<br>(Junganlagen mit Sämlingspflanzen); spritzen; im Pflanzjahr, nach dem Pflanzen, bei Unkrauthöhe bis ca. 25 cm<br>*NW642-1, NT102*<br>*SF245-02* | F |
| **Focus Ultra**<br>*Cycloxydim*<br>*HRAC/WSSA-Code 1*<br><br>033964-00<br>31.08.2027<br>B4, NB6641 | **Gemeine Quecke**<br>5 l/ha; max. 1/1<br>(Junganlagen); spritzen; im Pflanzjahr, nach dem Durchstoßen, bei Unkrauthöhe bis ca. 25 cm<br>*NW642-1, NT102*<br>*SF245-02* | F |
| **Fusilade MAX**<br>*Fluazifop-P*<br>*HRAC/WSSA-Code 1*<br><br>024847-00<br>31.05.2027<br>B4, NB6641 | **Gemeine Quecke**<br>2 l/ha; max. 1/1<br>(Ertragsanlagen); spritzen; nach der Ernte, nach dem Stechen; Stadium Schadorg.: BBCH 12-14<br>*NW609-1 (5m), NT103*<br>*SF245-02* | F |

# Zulassungsstand Spargel

| **Mittel**<br>*Wirkstoff(e)*<br>*Wirkungsmechanismen*<br>Zulassungs-Nr.<br>Zulassungsende<br>Bienenschutz | **Schadorganismus/Zweck**<br>Aufwandmenge, Anwendungshäufigkeit<br>(in dieser Anwendung / für die Kultur bzw. je Jahr)<br>Anwendungstechnik, -zeitpunkt, Bemerkungen<br>*Gewässerschutzauflagen, Saumstrukturen*<br>*Wiederbetretungsauflagen* | **Wartezeit (Zeit zwischen letzter Behandlung und Ernte)** |
|---|---|---|
| **Freiland** | | |
| Herbizide | | |
| **Fusilade MAX**<br>*Fluazifop-P*<br>*HRAC/WSSA-Code 1*<br>024847-00<br>31.05.2027<br>B4, NB6641 | **Gemeine Quecke**<br>2 l/ha; max. 1/1<br>(Junganlagen); spritzen; nach dem Auflaufen; Stadium Kultur: ab BBCH 09; Stadium Schadorg.: BBCH 12-14; Erntegut nicht verzehren (VV600)<br>*NW609-1 (5m), NT103*<br>*SF245-02* | **F** |
| **Vorox F**<br>*Flumioxazin*<br>*HRAC/WSSA-Code 14*<br>024895-60<br>30.06.2025<br>B4, NB6641 | **Schwarzer Nachtschatten**<br>0,3 kg/ha (auf unkrautfreien Boden); max. 1/1<br>(Ertragsanlagen); spritzen als Unterblattbehandlung mit Abschirmung; nach der Ernte; Stadium Kultur: ab BBCH 67<br>*NW609-1 (5m)*<br>*SF245-02*<br>**Abverkaufsfrist: 30.12.2025, Aufbrauchfrist: 30.12.2026** | **F** |
| **U 46 D Fluid**<br>*2,4-D*<br>*HRAC/WSSA-Code 4*<br>034066-00<br>31.12.2031<br>B4, NB6641 | **Zweikeimblättrige Unkräuter**<br>0,015 l/100 m²; max. 1/1<br>spritzen mit Rückenspritze, mit Abschirmung, Einzelpflanzenbehandlung, nach dem Stechen, nach der Ernte<br>*NW706*<br>*SF245-02* | **F** |

**Nicht aufgeführt sind Totalherbizide, Molluskizide, Rodentizide und Repellents, sowie Desinfektions- und Bodenentseuchungsmittel.**
**Für diese Anwendungen gibt es jeweils separate Listen.**

Bitte die "Erläuterungen zu den Zulassungslisten" beachten!